

101 D2/61-g-14

61



K1 follows 14

collated 8.3.62

C.E.N.















*Thos. Dale M.D. 1780*  
SYNOPSIS

NOSOLOGIÆ METHODICÆ,

EXHIBENS

CLARISS. VIRORUM

SAUVAGESII, LINNÆI, VOGELII, ET SAGARI,  
SYSTEMATA NOSOLOGICA.

EDIDIT

SUUMQUE PROPRIUM SYSTEMA NOSOLOGICUM

ADJECIT

GULIELMUS CULLEN,

MED. D. ET IN ACAD. EDINB. MED. PRACT. PROF.

MEDICUS REGIUS APUD SCOTOS PRIMARIUS,

ET COLL. REG. MED. EDINB. SOCIUS,

NEC NON SOCIETATUM REG. LOND. PHILOS. EDINB.

PHILOS. PHILADELPH. MED. REG. PARIS.

MED. HAUNIENS. ET MED. EDINB.

SODALIS.

EDITIO TERTIA,

EMENDATA ET PLURIMUM AUCTA,

DUOBUS TOMIS.

T O M. I.

EDINBURGI:

Prostant venales, apud GULIELMUM CREECH;  
et LONDINI, apud THOMAM CADELL,  
et JOANNEM MURRAY, Bibliopolas.

M, DCC, LXXX.



ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS  
LIBRARY

CLASS	61
ACCN.	13739
SOURCE	
DATE	

# LECTORI S.

**P**RODIT jam tertia vice multum, ni nos fallunt amici, expetita Synopsis haec nosologiae methodicae. Quam, ut expectationi eruditorum pro virili satisfacerem, plurimum auctam, ubique emendatam, et usibus, ut spero, medicorum accommodatiorem, exhibui.

UT omnia fere, ad rem nosologicam spectantia jam edita, sub uno conspectu hic ponerem, ex systemate symptomatico Clar. MICH. SAGARI, Anno 1776 Viennae edito, quae ad genera morborum definienda pertinent excerpta, hic primum addidi.

QUÆ porro in re nosologica ipse conatus sum, emendatiora, et adeo ampliora, dedi, ut opus fere prorsus novum videatur. Generum characteres omnes, pleniores atque accuratiores reddidi; et Species eo, quo mihi recte dari viderentur, numero, sub appellationibus tum characteristicis,

rificis, tum *trivialibus*, ut vocant, quas ipse maxime idoneas putaverim, nunc recensui : Additis tamen adhuc speciebus fere omnibus a SAUVAGESIO recensitis.

QUÆ denique ulterius hic dicenda essent, in Prolegomenis, initio tomi hujus operis alterius praefixis, inveniri possunt ; atque illuc Lectorem ablegamus.

P A R S   P R I M A .

G E N E R A

M O R B O R U M

D E F I N I T A

Ab Eruditissimo

FRANCISCO BOISSIER DE SAUVAGES.

Ex NOSOLOGIA METHODICA, 2 tom. 4to.

Amstel. 1768.

THE

NEW

AND

THE

THE

THE

THE

THE



SERIES

CLASSIUM ET ORDINUM.

CLASSIS I. VITIA.

ORDO I. MACULÆ.

O. II. EFFLORESCENTIÆ.

O. III. PHYMATA.

O. IV. EXCRESCENTIÆ.

O. V. CYSTIDES.

O. VI. ECTOPIÆ.

O. VII. PLAGÆ.

CL. II. FEBRES.

O. I. CONTINUÆ.

O. II. REMITTENTES.

O. III. INTERMITTENTES.

CL. III. PHLEGMASIAE.

- O. I. EXANTHEMATICAÆ.
- O. II. MEMBRANACEÆ.
- O. III. PARENCHYMATOSÆ.

CL. IV. SPASMI.

- O. I. TONICI-PARTIALES.
- O. II. TONICI GENERALES.
- O. III. CLONICI PARTIALES.
- O. IV. CLONICI GENERALES.

CL. V. ANHELATIONES.

- O. I. SPASMODICÆ.
- O. II. OPPRESSIVÆ.

CL. VI. DEBILITATES.

- O. I. DYSÆSTHESIAÆ.
- O. II. ANEPITHYMIÆ.
- O. III. DYSCINESIAÆ.
- O. IV. LEIPOPSYCHIAÆ.
- O. V. COMATA.

CL. VII. D O L O R E S.

- O. I. V A G I.
- O. II. D O L O R E S C A P I T I S.
- O. III. D O L O R E S P E C T O R I S.
- O. IV. D O L O R E S A B D O M I N A -  
L E S I N T E R N I.
- O. V. D O L O R E S E X T E R N I E T  
A R T U U M.

CL. VIII. V E S A N I Æ.

- O. I. H A L L U C I N A T I O N E S.
- O. II. M O R O S I T A T E S.
- O. III. D E L I R I A.
- O. IV. V E S A N I Æ A N O M A L Æ.

CL. IX. F L U X U S.

- O. I. S A N G U I F L U X U S.
- O. II. A L V I F L U X U S.
  - 1. *Sanguinolenti.*
  - 2. *Non Sanguinolenti.*
- O. III. S E R I F L U X U S.
- O. IV. A E R I F L U X U S.

CL. X. CACHEXIÆ.

- O. I. MACIES.
- O. II. INTUMESCENTIÆ.
- O. III. HYDROGES PARTIALES.
- O. IV. TUBERA.
- O. V. IMPETIGINES.
- O. VI. ICTERITIÆ.
- O. VII. CACHEXIÆ ANOMALÆ.

# GENERA

## MORBORUM

### CLASSIS I. VITIA.

CHARACTER. Symptomata cutanea levissima, vel mechanicis chirurgiae auxiliis curanda.

#### ORDO I. MACULÆ.

Coloris nativi mutationes.

GENUS I. LEUCOMA.

1

Macula opacans corneam.

G. II. VITILIGO.

2

Macula corymbosa, seu ex minoribus maculis composita, cum depreffione cutis.

G. III. EPHELIS.

3

Maculae acquiritae, umbrinae, glabrae, corymbosae, faciem vel tibias, rarius partes tectas, afficientes.



## 8 GENERA MORBORUM

### 4 G. IV. GUTTA ROSEA.

Maculae faciei rubrae, guttatae, parum prominentes, aut asperae, et diu permanentes.

### 5 G. V. NÆVUS.

Macula congenita, quae vulgo tribuitur vehementi cupiditati, quia mater initio graviditatis exagitata fuit, quandoque cum partis eminentia.

### 6 G. VI. ECCHYMOA.

Macula nigricans, vel atro-rubra, aut livescens, successu temporis flavescens, non congenita, nec aspera, sed plana, aut parum prominens, et subsolitaria.

## O. II. EFFLORESCENTIÆ

Tumores humorales exigui gregales, vel cutis elevatio per pustulas, papulas, phlyctænas, varos, simileve asperitates.

a. Pustula. Phyma parvulum apice ruptum.

b. Papula. Phyma parvulum desquamari solitum.

c. Phlyctaena. Vesicula fluido seroso plena.

d. Varus. Tuberculum durum constans.

G. VII. HERPES. 7

Efflorescentia ex tumoribus exiguis, rubris, aggregatis, pruriginosis, in squamas furfuraceas, raro crustaceas, abeuntibus.

G. VIII. EPINYCTIS. 8

Phlyctaenae atro-rubrae, aggregatae, trium vel quatuor linearum in diametro, tibias ut plurimum afficientes, et noctu potissimum acriter pungentes.

G. IX. PSYDRACIA. 9

Phymata erysipelatosa.

G. X. HIDROA. 10

Exanthemata miliaria phlyctaenoidea.

### O. III. PHYMATA.

Tumores humorales, notabiles, solitarii.

G. XI. ERYTHEMA. 11

Tumor sine febre, superficialis, solitarius, diffusus, rubro roseus, pressione evanescens.

10 GENERA MORBORUM

12 G. XII. OEDEMA.

Tumor diffusus, frigidus, pallidus, laxus, doloris expers.

13 G. XIII. EMPHYSEMA.

Tumor diffusus, elasticus, pressione crepitans, cuti concolor.

14 G. XIV. SCIRRHUS.

Phyma durum, indolens, cuti concolor.

15 G. XV. PHLEGMONE.

Tumor spheroides, rubore, calore, tensione, dolore pulsatili insignis, sponte in suppurationem vergens.

16 G. XVI. BUBO.

Tumor partim scirrhosus, partim inflammatorius, glandulae unius aut alterius inguinalis.

17 G. XVII. PAROTIS.

Tumor scirrhoso-phlegmonodeus glandulae parotidis dictae in suppuratum lentissime vergens.

18 G. XVIII. FURUNCULUS.

Tumor inflammatorius, cutaneus, prominens, durus, et atro-ruber, cujus centrum, cum

suppuratus est, occupant fibrae crassae, quae in pus non colliqueſcunt.

G. XIX.      A N T H R A X. 19

Phyma apice gangraenolum, ambitu inflammatum.

G. XX.      C A N C E R. 20

Tumor durus, tuberosus, lancinans, pertinacissimus.

G. XXI.      P A R O N Y C H I A. 21

Phlegmone extremi digiti cum dolore perrebrante.

G. XXII.      P H I M O S I S. 22

Phlegmone praeputii, cum hujus adducendi vel reducendi difficultate.

O. IV.      E X C R E S C E N T I Æ.

Tumores a solidis adauctis, indolentes, lente crescentes, in suppurationem sponte non abeuntes.

G. XXIII.      S A R C O M A. 23

Excreſcentia carnis consistentiam circiter obtinens.

## 24 G. XXIV. CONDYLOMA.

Excrefcentia firma carnibus durior, offibus mollior.

## 25 G. XXV. VERRUCA.

Excrefcentia cutanea prominens, condylomate minor, fenfu deftituta, indolens.

## 26 G. XXVI. PTERYGIUM.

Excrefcentia carnea, vel membranaceo-vaſculofa ad oculi canthum exorta, alam expandam referens, et verſus corneam ſe extendens.

## 27 G. XXVII. HORDEOLUM.

Tumor durus vix fenſu gaudens, cuti concolor, raro rubens, in palpebrarum limbo enaſcens, ſphaericus, piſo ut plurimum minor.

## 28 G. XXVIII. BRONCHOCELE.

Excrefcentia vel tumor ſcirrhofus anticae partis colli.

## 29 G. XXIX. EXOSTOSIS.

Tumor offis vel totalis vel partialis.

## 30 G. XXX. GIBBOSITAS.

Offium peſtoris indecora prominentia a tu-



more, luxatione, distortionē, aut alio principio oriunda.

G. XXXI. LORDOSIS. 31

Ossium distortio, unde hinc protuberant, inde vero excavantur artus, ac incurvantur ossa, vel a situ deflectunt.

O. V. CYSTIDES.

Protuberantiae factae a fluidis intra membranas proprias vel alienas maxime dilatatas contentis, vel receptacula quaevis distendentibus.

G. XXXII. ANEURISMA. 32

Cystis arteriosa.

G. XXXIII. VARIX. 33

Cystis venosa.

G. XXXIV. HYDATIS. 34

Cystis lymphæductuum.

G. XXXV. MARISCA. 35

Tumores in ani margine enati, rubri, saepe dolentes, et cruorem saepe fundentes, sponte dein recedere soliti.

## 14 GENERA MORBORUM

### 36 G. XXXVI. STAPHYLOMA.

Cystis aquosa a corneae proptosi, et dilatatione, vel ab uveae hernia trans foramen corneae elapsa.

### 37 G. XXXVII. LUPIA.

Cystis vel folliculus materiem pultaceam non purulentam continens.

### 38 G. XXXVIII. HYDARTHROS.

Cystis articuli aquosa.

### 39 G. XXXIX. APOSTEMA.

Cystis purulenta.

### 40 G. XL. EXOMPHALUS.

Cystis umbilicalis saepius aquosa.

### 41 G. XLI. OSCHEOCELE.

Cystis in scroto.

## O. VI. ECTOPIÆ.

Ptofes, Celes, Pararthremata, *Graec.*

Prolapsus, Herniae, Aberrationes, Luxationes, *Lat.*

Partium solidarum e sua sede dimotio sensibus obvia.

## G. XLII. EXOPHTHALMIA. 42

Magnitudo nimia, Prolapsus, Expressio oculi, *Lat.*

Hygrophthalmia, Elephantiasis oculi, *Boerh. de Morb. Ocul. pars II. cap. 5.*

Exophthalmia, Hydrophthalmia, Buphthalmus seu Buphthalmia, Ophthalmoptosis, Ectropismus *Graecorum. Mauchart*, diff. de Hydrophthalmia, et oculi Paracentesi inter *Haller. disput. Chir. T. I.*

Grosſeur contre Nature, Hydropisie, Cancer, Chute de l'oeil. *Maitre-Jan*, part. II. chap. 6.; *Saint Yves*, Part. II. chap. 1.

Bulbi oculi procidentia, aucta, vel non mutata sensibilibiter nativa ipsius magnitudine.

G. XLIII. BLEPHAROPTOSIS *Mauchartii*. 43

Blepharoptosis, Lagophthalmus, Ectropium, Entropium, *Gr.*

Palpebrae superioris casus, Retractio, Palpebrarum introversio, extroversio, *Lat.*

Chute, relaxation de la paupiere superieure, eraillement des paupieres, trichiaise avec introversion des tarſes. Vide *Platner. Instit. Chirurg. § 577. § 584.*; *Maitre-Jan*, part. III. chap. 18. 19. 20. 21.; *Saint Yves*, part. I. chap. 8. 9. 10.; *Dionis, Dem. 6.*; *Boerh. de Morb. ocul. part. I. cap. 5.*; *Heister. Chir. T. I. part. II. § 2. cap. 45. 46. 48.*; *Gorter. Chir. repurg. lib. 5. cap. 10.*

Palpebrae utriusque vel alterutrius elongatae, retractae, introversae, vel extroversae ectopia.

44 G. XLIV.    H Y P O S T A P H Y L E.

Staphyle, Kion, Imantium, Craspedon, Columella bicornis, *Aretaci*, Acut. lib. I. cap. 8. de affectibus columellae.

Uvulae prolapsus, *Nenter*. tab. 25. cap. 8.

Uvula nimium producta, *Heister*, Chir. T. 2. p. 659.

Uvulae inflammatio, catarrhus, paralyxis, casus, *Gorter*, Praxis Med. Syft. pag. 165.

Relachement de la luvette, *Dionis*, Dem. V.

Gurgulionis seu uvulae laxatae, inflammatae, ulceratae, incrassatae, attenuatae, bicornis, procidentia.

45 G. XLV.    P A R A G L O S S E.

Linguae extumescencia, magnitudo, inflatio, *Galen*. Method. med. libr. XIV. *Valesci de Taranta* Philon. lib. 2. cap. 59.; *Marc. Donat*. Med. Histor. mirab. lib. 3. cap. 4.

Linguae retractio exertio, *Gorteri*.

Glossoccele *Gaubii Pathol.* § 242.; Linguae extrusio, Idem, § 254.

Renversement de la langue dans le gosier, *Petit*. Mem. de l'Acad. des Sc. 1742.

Linguae motu deglutitorio in fauces revo-

lutae vel ore extrusae, exundantis, exercitae ectopia.

G. XLVI. PROPTOMA. 46

Partis externae, etiam ante lapsum conspicuae, et a palpebris, bulbo oculi, lingua, ac gurgulione diversae procidentia.

G. XLVII. EXANIA. 47

Proctocele *Pathol. Meth.* edit. 3.

Morbus poenalis Gerhamensium, lib. Regum I. cap. 5.

Prolapsus ani *Auſtorum*, ut *Plateri*, Prax. lib. II. cap. 2. *Nenteri*, tab. 126. &c.

Chute du fondement *Dionis*, Dem. IV. pag. 392.; *Arnaud* des Hernies, tom. I. chap. 28.; *Leuret* obs. sur les polypes, sect. 3. pag. 165.

Sphincteris ani, et intestini recti inversi, procidentia.

G. XLVIII. EXOCYSTE. 48

Prolapsus, inversio vesicae urinae *Auſtorum*; *Salzmanni* diss. de Hern. vesicae inter *Halleri* Disp. Sel. tom. III.; *Solingen* de mulierum et infant. morb. chir. pag. 741.

Renversement de la vessie urinaire. *Noel*. obs.; Recherches sur la Hernie de la vessie par *Verdier*; Mem. de l'Acad. R. de Chir. tom. 2.

Membranae tum vesicae corpus, tum ipsius

## 18 GENERA MORBORUM

collum, interne obvestientis procidentia  
per meatum urinarium facta.

### 49 G. XLIX. HYSTEROPTOSIS.

Hysteroceles nudaе *Pathol. Method.* Edit. 3.

Relaxatio, prolapsus, procidentia, inversio uteri vel  
vaginae *Auſtorum*, ut *Heisteri* *Inst. chir.* tom. II.;  
*Gunzii* de Herniis, &c.

Relachement, chute, descente, renversement de la ma-  
trice ou du vagin. *Arnaud*, tom. 1. chap. 24. &c.;  
*Puzos* sur les maladies de la matrice; *Sabatier*, Mem.  
de l'Acad. R. de Chir. tom. 3.

Uteri vel vaginae procidentia.

### 50 G. L. ENTEROCELE.

Hernia intestini.

### 51 G. LI. EPIPLOCELE.

Hernia Omenti.

### 52 G. LII. GASTROCELE. *Ign. la Chauffe.*

Hernia ventriculi, *Fabr. Hildani* resp. ad *Doring.* pag.  
915.; *Blegney* *Zod. med.* Gall. ann. I. Febr. Obs. 2.  
pag. 44.; *Gunzii* libell. de hern. cap. 20. *Ign. La*  
*Chausse* *Diff. de hernia ventrali*, et *Kirschbaum* *Diff. de*  
*hern. ventriculi in disp. Chir.* Haller. tom. 3. *Diff.*  
68. 69.

Hernie de l'estomac, *La Faye* sur *Dionis*, pag. 121.;  
*Arnaud* *Tr. des hernies*, preface, p. 81.; *Sharp* *Rech.*

Crit. chap. I.; *Garengeot*, Mem. de l'Acad. R. de Chir. T. 1. p. 703.

Ventriculi trans laxatos, diductos, regionis epigastricae parietes, imo et per umbilici annulum elapsi ectopia herniosa.

G. LIII. HEPATOCELE, *Gunzii* Li- 53  
bell. de hern. p. 4.

Hernia hepatis, E. N. C. Dec. I. Ann. II. et Dec. II. Ann. VII ; *Bohnii* Chir. rational. pag. 230.

Hernie du foye, *Arnaud* des hern. tom. 1.

Hepatis trans laxatos, diductos in umbilici vicinia abdominis parietes, vel per ipsum umbilicum ectopia herniosa.

G. LIV. SPLENOCELE, *Gunzii* Li- 54  
bell. de hern. p. 4.

Hernia lienis, *Fabr. Hildani*, epist. LV. pag. 999 ; *Spigelii* de corp. hum. fabric. lib. 8. cap. 14. ; *Ruyfchii* Advers. Anat. Dec. II. pag. 23.

Hernie de la Rate, *Arnaud* des hern. tom. 1. pag. 29.

Lienis trans laxatos, diductos abdominis in latere sinistro parietes, vel per inguinalem ejusdem lateris annulum elapsi ectopia herniosa.



## 55 G. LV. HYSTEROCELE.

Hernia uteri *Sennert.* Lib. 4. Med. Pract. part. II. sect. II. cap. 17.; *Doringii* Epist. ad G. Fabi. Hildanum de hernia uterina, p. 893.; *Graaf.* de mulier. organ. cap. 8.; *Ruysch.* Adv. Dec. II. pag. 23.

Hernie de la Matrice, *Arnaud* des hernies. T. I. pag. 29.; *Sabatier* Mem. de l'Acad. R. de Chir. T. III.

Uteri trans annulos inguinales, aut laxatos, diductos inferne abdominis medietatis parietes elapsi ectopia herniosa.

56 G. LVI. CYSTOCELE, *Platner.* Inst. Chir. Ign. *La Chauffe* de hern. ventrali.

Hernia cystica *quorundam.*

Hernia vesicae urinariae *Salzmanni* Diff. inter *Halleri* Disp. Chir. T. III. Diff. 72.; *Gunzii* Libell. de Hern., &c.

Hernie de la vessie urinaire *Mery.* Mem. de l'Acad. R. des Sc. 1713; *Carengéot* Oper. de Chir.; *Leuret* Obs. sur les polypes; *Sharp* Rech. Crit.; *Verdier* Mem. de l'Acad. R. de Chir. T. II.

Vesicae urinariae trans annulos inguinales, sub arcubus cruralibus, et per laxatos, diductos perinaei, hypogastrii, necnon vaginae parietes elapsae ectopia herniosa.



G. LVII. ENCEPHALOCLE, *Corvini* 57

Diff. de hern. Cerebri inter *Halleri* Disp.

Chir. T. 2. Diff. XLVI.

Hernia cerebri, *Reiseli* Eph. N. C. Dec. II. Ann. II.

Obf. 115.; *Lecheli* ibid. Obf. 158.; *Treu* Comm. Litt.

1738, Hebd. 52. n. 3.; *Taconi* Diff. de humano monstro Bononiae nato; *Corvini*, ibidem.

Hernie du Cerveau, *Le Dran* Obf. de Chir. Obf. I.

Cerebri, cerebelli, aut utriusque, verbo Encephali, per ossum cranii non penitus officiatorum hiatus prorumpentis, eclopiæ herniosa.

## G. LVIII. HYSTEROLOXIA. 58

Obliquitas uteri *Roedereri*, Elem. art. obstetric. § 449.

—507.; *Levret* Observ. sur les accouch.

Inclinatio, reclinatio, obliquitas uteri *Deventer*, cap.

46. 47. 48.; *Ruyfchii*, Observ. XCVIII.

Inclinaison, obliquité de la matrice, *Sabatier*, Mem. de l'Acad. de Chir. tom III. &c.

Uteri, saepius gravidi, et contra quam in hysterocle fit, abdominis claustris contenti situs in obliquum errans.

## G. LIX. PARORCHIDIUM. 59

Testiculorum serior descensus, vel retractio, *Felic. Plateri* Mantiff. Observ.; *Ambr. Paraceli* Lib. vii.; *Thom.*

*Bartholini* Hist. Anat.; *Morgagn.* Advers. IV.; *Dionis* Oper. de Chir. Dem. IV.; *Quelmalzii* inter Hal-  
leri Disput. Anatom. T. V. Dissert. I.; *Verdier* sur la  
Hernie de la Vessie, Mem. de l'Acad. R. de Chir.  
tom. II.

Testiculi unius, vel utriusque, cujus post na-  
tivitatem sedes naturalior scrotum est, si-  
tus in alienum aberrans.

60 G. LX. EXARTHREMA, *Graec.*

Exarthrosis, Parathrema *eorund.*

Luxatio, subluxatio, distortio, *Heister.* Inst. Chir. T. I.;  
*Boerb.* Aph. comment. T. I.; *Gorter.* Chir. repurgat.  
cap. VI. *Platner.* Instit. Chir. § 1090—1213.

Luxation, entorse, *Petit* Malad. des os, T. II.; *Coll de*  
*Villars* Chir. T. V.; *de la Faye* Princ. de Chir.; *Du-*  
*verney* Malad. des Os, tom. II.

Separatio contigui in ossium articulis diar-  
throsice, non vero immobiliter combinatis.

61 G. LXI. DIASTASIS, *Graecorum.*

Ossium recessus, *Latin.*; *Petit* T. II. chap. 8. et 13.;  
*La Faye* Princ. de Chir. pag. 474. *Duverney* T. II.  
ch. 1. et 5.

Ossium, cartilaginum, immobiliter combina-  
torum, separatio, seu recessus ab invicem  
partialis vel totalis.

## G. LXII. LOXARTHROS.

Perversio capitis ossium ac musculorum appensorum,  
*Duverney*, T. II. cap. II.

Artis vari *Duverney*, T. II. cap. II.

Gibbositas scapularis *Auclorum*.

Ossium cum motu sensibili articulatorum situs relativus in alienum constanter mutatus, aut obliquitas respectiva persistens citra exarthrema et spasmus.

## O. VII. PLAGÆ.

Solutiones continui.

## G. LXIII. VULNUS.

63

Solutio mechanica continui in carnibus cum labiorum hiatu, initio cruenta, dein ad inflammationem suppurationemque tendens.

## G. LXIV. PUNCTURA.

64

Continui solutio intus tantum extensa.

## G. LXV. EXCORIATIO.

65

Cuticulæ vel cutis a carnibus subjectis separatio.

## 24 GENERA MORBORUM

### 66 G. LXVI. CONTUSIO.

Textus carnosus, potissimum infra cutem, ruptio per minima puncta et vasorum contusio, ecchymomá saepius inferens.

### 67 G. LXVII. FRACTURA.

Separatio violenta et mechanica ossis in fragmenta invicem non cohaerentia.

### 68 G. LXVIII. FISSURA.

Separatio ossis in duas partes rima tantum diffitas, et alterutro saltem extremo cohaerentes.

### 69 G. LXIX. RUPTURA.

Tendinum vel ligamentorum aut cartilaginum solutio, vel vehemens distractio, cum vel sine exarthremate.

### 70 G. LXX. AMPUTATURA. *Ill. Linn.* G. 241.

Solutio continui in partibus tum mollibus, tum ossibus, cum artus, articuli, vel partis totali separatione a residuo trunco.

### 71 G. LXXI. ULCUS.

Partium mollium erosio purulenta, cute profundior, cum pure ichoroso vel utrumque vitioso.

G. LXXII. EXULCERATIO. 72

Excoriatio ulcerosa suppurans.

G. LXXIII. SINUS. 73

Cavitas ulcerosa, cujus fundus amplius, saepe multiplex definit in angustum orificium.

G. LXXIV. FISTULA. 74

Cavitas ulcerosa, sinuosa, cujus parietes callosi sunt ut plurimum, aut fundus ad os cariosum, arthrocace corruptum, pertingit.

G. LXXV. RHAGAS. 75

Solutio continui sicca in partium marginibus.

G. LXXVI. ESCHARA. 76

Crusta sicca, mortua, fluidis solidisque corporis humani coagmentata.

G. LXXVII. CARIES 77

Offis suo periosteo denudati decoloratio, asperitas, exfoliatio et subsequens fragilitas ac erosio.

G. LXXVIII. ARTHROCACE. 78

Ulcus medullae ossium, saepius in epiphysebus, cum carie, exostosi, et dolore.

## CL. II. FEBRES.

Pulsus magnitudo et frequentia cum frigore in insultu, fervore in decursu, madore in declinatione, et semper virium prostratione majori quam a virium vitalium gradu foret expectandum.

## ORDO I. CONTINUÆ.

Impetus febrilis a frigore saepius exordiens, sine exacerbatione partiali, et sine accessu, non pluries quam semel vel bis in mense reverrens, ad usque finem aegritudinis perseverat.

## 79 G. I.      EPHEMERA.

Decursus aegritudinis intra dimidiam septimanam absolvitur. Vigor morbi subito accedit.

## 80 G. II.      SYNOCHA.

Decursus intra septimanam, incrementum successivum.



G. III. SYNOCHUS *Galen.* 81

Decursus ad duas tresve septimanas, cum pul-  
sus robore sanum, in morbi statu saltem,  
notabiliter superante.

G. IV. TYPHUS *Hippocratis* 1. et 2. de 82  
intern. affect. *Foesii* 553.

Decursus ultra duas septimanas, saepius tres,  
cum calore et urina sanorum similibus,  
pulsuque quoad frequentiam sano fere si-  
mili, et quoad robur non majori, artubus  
interea maxime prostratis.

G. V. HECTICA *Galen.* et *ejus Sequa-* 83  
*cium*; *Sydenhami*, p. 524.

Decursus ultra mensem, debilitas parva, py-  
rexia exigua, cum pulsu post paſtum fre-  
quentiori.

## O. II. REMITTENTES.

Pyrexia pluries in decursu morbi crescit et  
decreſcit, non omnino recedit, typus ſae-  
pe confuſus.

## 28 GENERA MORBORUM

### 84 G. VI. AMPHIMERINA.

Remissio quotidianae typum servat. Exacerbationes cum horrore.

### 85 G. VII. TRITÆOPHYA.

Remissionis typus tertianarius, frigus fere nullum.

### 86 G. VIII. TETARTOPHYA.

Remissio quartanae typum servans.

## O. III. INTERMITTENTES.

Pyrexia plures in decursu aegritudinis deserit et recurrit, cum intervallis lucidis.

### 87 G. IX. QUOTIDIANA.

Accessus similes quolibet die accidunt.

### 88 G. X. TERTIANA.

Accessus similes alternis diebus revertuntur.

### 89 G. XI. QUARTANA.

Accessus similes duobus interpositis diebus redeunt,

### 90 G. XII. ERRATICA.

Accessus similes distantes ab invicem pluribus quam quatuor diebus, aut typi omnino incerti.



CL. III. PHLEGMASIÆ *Galen.*

Pyrexia continua vel remittens cum interna inflammatione, vel cum exanthematis.

## O. I. EXANTHEMATICÆ.

Eruptiones cutaneae cum pyrexia saepius maligna, quandoque lenta.

G. I. PESTIS. 91

Eruptio bubonum, anthracum, pyrexia typhodes.

G. II. VARIOLA, *Haly Abbatis, Fouberti, et antiquorum.* 92

Eruptio pustularum phlegmonodearum in suppurationem tendentium.

G. III. PEMPHIGUS. 93

Eruptio phlyctænarum avellanae circiter magnitudine sero dilute flavo turgidarum.

G. IV. RUBEOLA, sic primitus nominata a traductoribus *Haly Abbatis Practicae*, lib. 3. cap. I. de Variolae et Rubeolae Medela. 94

### 30 GENERA MORBORUM

Eruptio papularum in squamulas furfuraceas  
abeuntium. Praecedunt tussis sicca, ster-  
nutatio, lachrymatio, et febris catarrhalis.

#### 95 G. V. MILIARIS.

Eruptio phlyctaenarum milii femini non ma-  
jorum.

#### 96 G. VI. PURPURA.

Eruptio maculosa purpurea, livida, vel atra,  
indolens, cum typho vel remittente febre.

#### 97 G. VII. ERYSIPELAS.

Eruptio erythematis cum synocha febre.

#### 98 G. VIII. SCARLATINA.

Eruptio maculosa, rubra, pruriens, papulosa,  
lata, parum uniformis, in squamulas fur-  
furaceas abiens, sed sine praeludio catar-  
rhali, et saepe ad secundam tertiamve vicem  
se prodens ac recondens vicissim.

#### 99 G. IX. ESSERA.

Eruptio ut plurimum apyreta, suberysipe-  
latosa, subito accedens per vices et rece-  
dens.

## G. X.      A P H T H A. 100

Eruptio pustulosa, phlyctænodes, et ulcerosa,  
in ore aut pudendis.

## O. II. MEMBRANACEÆ.

Pyrexia magna typo synochæ vel synochi  
cum dolore visceris cujusdam.

## G. XI.      P H R E N I T I S. 101

Dolor capitis, delirium audax, vis artuum,  
pulsusque major, pyrexia acuta.

## G. XII.      P A R A P H R E N E S I S. 102

Symptomata phrenitidis et peripneumoni-  
ac.

## G. XIII.      P L E U R I T I S. 103

Dolor lateris, respiratio et pulsus frequens,  
tussis.

## G. XIV.      G A S T R I T I S. 104

Dolor epigastrii, nausea, vomituriatio, febris  
typhodes, vel remittens maligna.

## G. XV.      E N T E R I T I S. 105

Dolor circa umbilicum vehemens, cum me-

## 32 GENERA MORBORUM

teorismo, pyrexia acuta, ileo, vel dysenteria.

### 106 G. XVI. EPIPLOITIS.

Dolor circa hypogastrium, et umbilicum juxta epiploi extensionem.

### 107 G. XVII. METRITIS.

Dolor et tumor in regione et extensione uteri ac lumbis et inguinibus cum febre.

### 108 G. XVIII. CYSTITIS.

Dolor, tumor, tensio, hypogastrii, cum dysuria vel ischuria.

## O. III. PARENCHYMATOSÆ.

Dolor obtusus, calor et tumor in visceribus farctis, non sacciformibus, cum pyrexia acuta, suppurationis apparatu.

### 109 G. XIX. CEPHALITIS.

Febris acuta cum delirio somnolento, et cephalologia.

### 110 G. XX. CYNANCHE.

Dolor gutturis cum dyspnœa strangulante, dysphagia, et pyrexia acuta.

## G. XXI. CARDITIS. 111

Dolor sub sternō, pulsus inaequalis, frequens, palpitatio, et cardialgia, cordis anxietas.

## G. XXII. PERIPNEUMONIA. 112

Pyrexia acuta, dyspnoea gravis, gravativus pectoris dolor, tussis cruenta, pulsus mollis.

G. XXIII. HEPATITIS, *Galenī* I. Epid. 113  
, Comm. 3.

Dolor, tensio, calor in regione hepatis, cum pondere, tussi sicca, respiratione difficili.

## G. XXIV. SPLENITIS. 114

Dolor, tumor in regione lienis, tactum vix tolerans, cum febre ut plurimum remittente.

## G. XXV. NEPHRITIS. 115

Dolor acutus in regione renū juxta ureteres in vesicam directus, cum febre acuta, dysuria, ischuria, &c.

## CL. IV. SPASMI.

Contractio invita, constans vel interpolata, musculorum organis locomotivus, non vitalibus inservientium.

## O. I. TONICI PARTIALES.

Rigiditas et immobilitas artus vel organi determinati.

## 116 G. I. STRABISMUS.

Oculi spasmus axium opticorum divergentiam inferens.

## 117 G. II. TRISMUS.

Maxillae inferioris spasmus tonicus, vel clonicus.

## 118 G. III. OBSTIPITAS.

Colli spasmus tonicus, capitis nativam mobilitatem et directionem mutans.

## 119 G. IV. CONTRACTURA.

Artus cujusdam, ut brachii, vel cruris, constans, diuturna, rigiditas sensim exorta.



G. V. CRAMPUS. 120

Subitanea, fugax, dolorifica musculi rigiditas.

G. VI. PRIAPISMUS. 121

Penis injucunda rigiditas.

## O. II. TONICI GENERALES.

Rigiditas totius fere corporis.

G. VII. TETANUS. 122

Spasmus generalis subito ortus cum dyspnoea.

G. VIII. CATOCHUS. 123

Spasmus generalis sensim factus sine dyspnoea.

## O. III. CLONICI PARTIALES.

Agitatio invita et coacta cujusdam organi, vel artus, cujus motivum non percipitur.

G. IX. NYSTAGMUS. 124

Spasmus clonicus oculi, palpebraeve.

G. X. CARPHOLOGIA. 125

Motus velut convulsivus manuum, quo ac-

## 36 GENERA MORBORUM

gri floccos e vestibis evellere, paleas colligere, muscas venari, &c. videntur.

### 126 G. XI. PANDICULATIO.

Distensio semivoluntaria plurium vel omnium successive membrorum, ut plurimum cum oscitatione.

### 127 G. XII. APOMYTOSIS.

Succussio cutis et capitis tremula, violenta, cum expiratione sonora, quasi stertorosa.

### 128 G. XIII. CONVULSIO.

Agitatio invita artus vel musculi brevis et superflua in paroxysmis animae functionum exercitio.

### 129 G. XIV. TREMOR.

Artus alterna per itus et reditus frequentes motitatio cum movendi facultate concurrens.

### 130 G. XV. PALPITATIO.

Pulsatio in regione cordis pulsui arteriarum numero, minime vero intensitate, respondens.



## G. XVI. CLAUDICATIO. 131

Inter gradiendum cruris motus, quo centrum gravitatis trunci sensibilibiter, dextrorsum vel sinistrorsum transfertur.

## O. IV. CLONICI GENERALES.

Spasmi clonici vel totius corporis, vel ad plures partes extensi.

## G. XVII. RIGOR. 132

Totius cutis succussio frigorigera.

## G. XVIII. ECLAMPSIA. 133

Artuum vel musculorum plurimorum spasmus clonicus acutus, cum sensuum obscuratione.

## G. XIX. EPILEPSIA. 134

Spasmus clonicus, periodicus, chronicus artuum, cum sensuum obscuratione.

## G. XX. HYSTERIA. 135

Artuum, organorumque etiam internorum spasmus clonicus, tonicusve, paroxysmis fugacibus leviter variantibus, cum mortis formidine intensissima.

## 136 G. XXI. SCELOTYRBE.

Motus semivoluntarius vel unius lateris, vel totius corporis, inter gradiendum, gesticulationem, aut ridiculam histrionis festinationem referens.

## 137 G. XXII. BERIBERIA.

Motus gradientium genua retrahens cum tremore, fornicationis sensu, vocis raucedine, Indis familiaris.

## CL. V. ANHELATIONES.

Agitatio invita, defatigans, musculorum pectoris, unde respiratio difficilis, frequens, sine febre acuta.

## O. I. SPASMODICÆ.

Insultus fugaces, sed sæpius iterati spasmodicorum motuum pectoris cum expiratione sonora.

## G. I. EPHIALTES.

138

Anhelatio difficilis, querula, cum insomnio terrifico.

## G. II. STERNUTATIO.

139

Concussio violenta pectoris, cum expiratione veloci narium interiora everrente et sonora.

## G. III. OSCEDO.

140

Diutina lenta profunda inspiratio, ore hiantē, sæpius cum pandiculatione.

## G. IV. SINGULTUS.

141

Concussio diaphragmatis cum inspiratione subito interrupta, sonora.

## 40 GENERA MORBORUM

### 142 G. V. TUSSIS.

Concussio sonora, violenta pectoris cum expiratione ad pulmonem a quodam obice liberandum.

## O. II. OPPRESSIVÆ.

Non fugaces, sed constantes respirandi difficultates, cum pectoris non raro oppressione, frequenti anhelitu, difficultate illius suspendendi, sine metu suffocationis.

### 143 G. VI. STERTOR.

Respiratio inter inspirandum, sonum gravem tremulum, in gutture edens, saepe cum alterno sibilo.

### 144 G. VII. DYSPNOE A.

Difficultas respirandi chronica, non intermit tens, sine signis hydrothoracis vel empyematis.

### 145 G. VIII. ASTHMA.

Difficultas respirandi periodice recurrens chronica.

### 146 G. IX. ORTHOPNOE A.

Praeceptum ut plurimum et acuta respirandi difficultas.

## G. X. ANGINA. 147

Difficultas respirandi, cum sensu obicis in gutture, et saepe deglutitione difficili, sine phlegmasia.

## G. XI. PLEURODYNE. 148

Pectoris, laterisve dolor pungitivus cum respirandi difficultate citra phlegmasiam acutam.

## G. XII. RHEUMA. 149

Difficultas respirandi cum sensu gravitatis in pectore, quam comitantur vel praecedunt coryza, sternutatio, rauco, &c.

## G. XIII. HYDROTHORAX. 150

Difficultas respirandi decubitu horizontali aucta, cum faciei pallore, manuum et pedum oedemate, symptomatis ephialticis, alterutrius brachii stupore et aegritudine chronica non remittente.

## G. XIV. EMPYEMA. 151

Symptomata hydrothoracis, praegressa pulmonis inflammatione suppurata et comitante febre hectica.

## CL. VI. DEBILITATES.

Impotentia clare et distincte sentiendi, appetendi, consueta vi artus organave movendi, necnon imaginandi, vigilandi, &c.

## O. I. DYSÆSTHESIÆ.

Impotentia clare ac distincte sentiendi sine sopore.

## 152 G. I. CATARACTA.

Vifus debilitas ob maculam opacam pone pupillam.

## 153 G. II. CALIGO.

Vifus debilitas obicibus opacis citra pupillam positis.

## 154 G. III. AMBLYOPIA.

Vifus debilitas respectu ad situm, gradum lucis, distantiam objecti, oculis pellucidis.

## 155 G. IV. AMAUROSIS.

Vifus debilitas absoluta sine ulla organorum opacitate inassueta.



G. V. ANOSMIA. 156

Odoratus debilitas aut olfaciendi impotentia.

G. VI. AGHEUSTIA. 157

Gustus debilitas aut gustandi impotentia.

G. VII. DYSECÆA. 158

Auditus debilitas obicibus extra labyrinthum  
positis.

G. VIII. PARACUSIS. 159

Voces articulatas distincte audiendi difficul-  
tas vel impotentia.

G. IX. COPHOSIS. 160

Sonos etiam simplices percipiendi vel audi-  
endi difficultas vel impotentia, obice intra  
vel ultra labyrinthum posito.

G. X. ANÆSTHESIA. 161

Tactus in toto corpore debilitas vel obscuritas  
sine stupore et sopore.

O. II. ANEPITHYMIÆ.

Appetituum sensitivorum debilitas notabilis,  
vel suppressio insolita sine sopore.

## 44 GENERA MORBORUM

### 162 G. XI. ANOREXIA.

Appetitus esculentorum suppressio seu famis  
feriatio.

### 163 G. XII. ADIPSIA.

Appetitus potulentorum suppressio seu sitis  
feriatio.

### 164 G. XIII. ANAPHRODISIA.

Appetitus venereorum, seu libidinis suppres-  
sio.

## O. III. DYSCINESIÆ.

Impotentia motus ac saepe sensus in organis  
libertati subditis, ut lingua, larynge, artu-  
bus.

### 165 G. XIV. MUTITAS.

Voces articulatas edendi impotentia.

### 166 G. XV. APHONIA.

Plenaria vocis suppressio, citra stuporem et  
syncopem.

### 167 G. XVI. PSELLISMUS.

Quasdam syllabas literasve pronunciandi im-  
potentia.



G. XVII. PARAPHONIA. 168

Vocem solitam edendi impotentia.

G. XVIII. PARALYSIS. 169

Motus aut tactus, vel utriusque in uno tantum artu debilitas.

G. XIX. HEMIPLEGIA. 170

Debilitas motus aut tactus vel utriusque in alterutro corporis latere.

G. XX. PARAPLEXIA. 171

Debilitas sensus et motus in dimidio corporis transversim sumpti.

## O. IV. LEIPOPSYCHIAE.

Motuum, viriumque vitalium debilitas.

G. XXI. ASTHENIA. 172

Totius corporis gradaria seu successiva debilitas, sensibus integris.

G. XXII. LEIPOTHYMIA. 173

Virium muscularium totius corporis subitanea imminutio, pulsu superstita.

## 46 GENERA MORBORUM

### 174 G. XXIII. SYNCOPE.

Motuum vitalium subitanea debilitas cum frigore, pallore, sensuumque obscuratione.

### 175 G. XXIV. ASPHYXIA.

Omnium motuum et sensuum apparens cessatio mortem fere referens.

## O. V. COMATA.

Sensus omnis, appetitus, motus liberi, phantasiae, memoriaeque feriaciones.

### 176 G. XXV. CATALEPSIS.

Status soporofus cum artuum flexilitate et ad quosvis novos situs retinendos aptitudine.

### 177 G. XXVI. ECSTASIS.

Status soporofus a gravi pathemate subito ortus, aegrum in eodem situ quo prehensus est retinens, sine aptitudine cataleptica.

### 178 G. XXVII. TYPHOMANIA.

Apparens sopor cum pervigilio reali, vel sopor levis e quo aegri facile excitantur cum delirio comitante.

G. XXVIII. LETHARGUS. 179

Status soporofus facile excitabilis cum fumo imaginationis et memoriae torpore ac febre.

G. XXIX. CATAPHORA. 180

Status somnolentus facile excitabilis sine febre, delirio, et oblivione.

G. XXX. CARUS. 181

Sopor profundus sine stertore.

G. XXXI. APOPLEXIA. 182

Sopor profundissimus cum stertore vel sonora respiratione.

## CL. VII. D O L O R E S.

Cujusvis experientia cognoscendi, nulla definitione distincte explicabiles sunt.

## O. I. V A G I.

Dolores et molestiae vagae saepius universales aut cutaneae ad phlegmasias non referendae.

## 183 G. I. A R T H R I T I S.

Articulorum dolor spontaneus periodicus.

184 G. II. O S T O C O P U S, *Gorraei* definit

Offium dolor non erraticus et internus in artubus.

## 185 G. III. R H E U M A T I S M U S.

Dolor diuturnus in parte carnosâ artuum.

## 186 G. IV. C A T A R R H U S.

Collo vicinarum partium dolor a frigore suscepto, cum tussi, coryza, &c.

G. V. ANXIETAS. 187

Molestia quae ad continuam loci mutationem cogit.

G. VI. LASSITUDO. 188

Molestia cum debilitate quae ad quietem invit.

G. VII. STUPOR. 189

Molestia quae sensum tactus obscurat.

G. VIII. PRURITUS. 190

Molestia quae ad scalpendum nos cogit.

G. IX. ALGOR. 191

Molestia qualis a summo aëris frigore excitatur.

G. X. ARDOR. 192

Molestia qualis a summo aëris calore produ-  
citur.

## O. II. DOLORES CAPITIS.

Scilicet vel capillitii vel faciei.

G. XI. CEPHALALGIA. 193

Gravativus capitis dolor.

## 50 GENERA MORBORUM

### 194 G. XII. CEPHALÆA.

Periodicus, diuturnus tenfivus capitis dolor.

### 195 G. XIII. HEMICRANIA.

Dolor alterutrius lateris frontis.

### 196 G. XIV. OPHTHALMIA.

Dolor oculi cum rubore, lucis intolerantia  
et lachrymatione.

### 197 G. XV. OTALGIA.

Dolor aurium.

### 198 G. XVI. ODONTALGIA.

Dolor maxillarum dentiumve.

## O. III. DOLORES PECTORIS.

Dolores cordis et oesophagi, anhelationis ex-  
pertes.

### 199 G. XVII. DYSPHAGIA.

Molestia deglutionem impediens sine nota-  
bili respirationis læsione.

### 200 G. XVIII. PYROSIS.

Sensus ardoris in ventriculo et oesophago si-  
ne febre acuta.

## G. XIX. CARDIOGMUS. 201

Gravis pertinaxque molestia in praecordiis,  
cum sensu ponderis et magnae molis pul-  
santis a minimo motu increfcens.

O. IV. DOLORES Abdominales  
Interni.

## G. XX. CARDIALGIA. 202

Molestia in stomacho syncopem minitans.

## G. XXI. GASTRODYNIA. 203

Quicumque dolor notabilis et constans in re-  
gione stomachi, qui continua animi defec-  
tione non stipatur ut cardialgia, nec pyrexia  
ut gastritis.

## G. XXII. COLICA. 204

Dolor intestinorum.

## G. XXIII. HEPATALGIA. 205

Molesta sensatio, gravativa, tensiva, aut alia  
quaevis in regione hepatis, sine pyrexia a-  
cuta.



## 52 GENERA MORBORUM

### 206 G. XXIV. SPLENALGIA.

Dolor aut molestia in regione lienis sine pyrexia acuta.

### 207 G. XXV. NEPHRALGIA *Zwingeri*.

Dolor lumbi alterutrius ureteris ductum sequens, cum nausea, testis retractione in viris, cruris stupore in foeminis, &c.

### 208 G. XXVI. DYSTOCIA.

Dolor uterinus in gravidis cum conatibus parturitionis.

### 209 G. XXVII. HYSTERALGIA *Montalti*.

Dolor uteri sine nisu parturitionis.

## O. V. DOLORES Externi et Artuum.

### 210 G. XXVIII. MASTODYNIA.

Dolor mammarum.

### 211 G. XXIX. RACHIALGIA *Astrucii*.

Dolor abdominis et spinæ dorsi in brachiorum paralyfin aut convulsiones desinens.

### 212 G. XXX. LUMBAGO.

Dolor lumborum corporis erectionem impediens.



G. XXXI. ISCHIAS. 213

Pelvis et coxendicis dolor claudicationem fac-  
pius inducens.

G. XXXII. PROCTALGIA. 214

Dolor podicis citra tenesmum.

G. XXXIII. PUDENDAGRA. 215

Dolor genitalium citra dyfuriam.

## CL. VIII. V E S A N I Æ.

Error in imaginatione, appetitu, vel iudicio

## O. I. HALLUCINATIONES.

Errores imaginationis salvo intellectu ab objectis  
ganorum externorum vitio.

## 216 G. I. V E R T I G O.

Objecta licet quiescentia e loco moveri videntur  
in gyrum versari nobis videntur. Ipse  
aeger sibi quandoque nutare videtur.

## 217 G. II. S U F F U S I O.

Objectorum, quae non sunt, imaginaria visio

## 218 G. III. D I P L O P I A.

Objectum duplicatum vel multiplicatum apparet.

## 219 G. IV. S Y R I G M O S.

Auditio imaginaria soni, cujus nullum est extra  
aures principium.

## 220 G. V. H Y P O C H O N D R I A S I S.

Morbus diuturnus quo affectus se in mortem

periculo versari ex ructu, palpitatione, aliisque levidensibus malis, imaginatur.

G. VI. SOMNAMBULISMUS. 221

Somniantes e lecto surgunt, vigilantium munia exsequuntur, et se saepe diversis periculis exponunt.

## O. II. MOROSITATES.

Cupiditates aut averfationes depravatae.

G. VII. PICA. 222

Alimentorum consuetorum averfatio, cum inassuetorum, sanisque insalubrium, appetitu.

G. VIII. BULIMIA. 223

Appetitus esculentorum copiae majoris quam quae digeri possit.

G. IX. POLYDIPSIA. 224

Appetitus majoris solito copiae potulentorum.

G. X. ANTIPATHIA. 225

Quorundam objectorum tanta averfatio ut ex

## 56 GENERA MORBORUM

eorum visu, vel olfactu aeger gravia symptomata patiat.ur.

### 226 G. XI. NOSTALGIA.

Parentum patriaeve tanta cupiditas, ut hac non expleta aeger gravi morbo decumbat.

### 227 G. XII. PANOPHOBIA.

Summus pavor inter dormiendum sine causa evidenti.

### 228 G. XIII. SATYRIASIS.

Effraenis, impudensque veneris cupiditas cum libidinosa penis tentigine.

### 229 G. XIV. NYMPHOMANIA.

In foeminis effraene veneris desiderium.

### 230 G. XV. TARANTISMUS.

Effraenis choreas agendi, vel saltandi cupiditas.

### 231 G. XVI. HYDROPHOBIA.

Effraenis potulentorum averfatio, saepius a morfu animalis rabidi.

## O. III. DELIRIA.

Errores mentis judicantis.

G. XVII. PARAPHROSYNE. 232

Delirium fugax, a veneno, aut altero morbo dependens.

G. XVIII. AMENTIA. 233

Delirium universale mite, sine furore et audacia, cum morbo diuturno.

G. XIX. MELANCHOLIA. 234

Delirium particulare mite, cum moerore, ac morbo diuturno.

G. XX. MANIA. 235

Delirium universale cum furore, vel audacia et morbo diuturno.

G. XXI. DÆMONOMANIA. 236

Delirium melancholicum, quod vulgo diaboli potentiae tribuitur.

## O. IV. V. SANIÆ ANOMALÆ.

Morbi prioribus affines.

G. XXII. AMNESIA. 237

Omnis memoriae feratio.

G. XXIII. AGRYPNIA. 238

Pervigilium continuum immodicumve.

## CL. IX. FLUXUS.

Ejectio fluidorum aut contentorum, quae quantitate, qualitate, defuetudine notabilis est.

## O. I. SANGUIFLUXUS.

Sanguinis vel sanguinolentae materiae ejectio sine alvi fluxu.

239 G. I. HÆMORRHAGIA.

Fluxus sanguinis e naribus.

240 G. II. HÆMOPTYSIS.

Sanguinis expectoratio cum tussi sine pyrexia acuta.

241 G. III. STOMACACE.

Fluxus sanguinis e gingivis saepius foetidis, putridisve.

242 G. IV. HÆMATEMESIS.

Sanguinis rejectio ex oesophago cum vomitorio conatu.

## G. V. HÆMATURIA. 243

Sanguinis fluidive rubri per vias urinarias emissio.

## G. VI. MENORRHAGIA. 244

Sanguinis per uterum aut vaginam fluxus vitiosus.

## G. VII. ABORTUS. 245

Fœtus immaturi, sæpius cum menorrhagia ex utero exclusio.

## O. II. ALVIFLUXUS.

Materierum in primis viis contentarum vitiosa per os aut anum rejectio.

I. *Alvifluxus sanguinolenti.*

## G. VIII. HEPATIRRHOEA. 246

Alvifluxus per inferiora ferofo-cruentus nec ater nec torminosus.

## G. IX. HÆMORRHOIS. 247

Fluxus cruentus, ex podice, vel recto mariscis ruptis obfeto.



## 248    G. X.    DYSENTERIA.

Frequens torminosa, sæpe tenesmodes, foecum cruentarum per inferiora dejectio.

## 249    G. XI.    MELÆNA.

Fluidi atrii per superiora, vel inferiora frequens rejectio.

II. *Atvisfluxus non sanguinolenti.*

## 250    G. XII.    NAUSEA.

Inanis vomendi conatus, et flatus tantum per os emissio; affinis est aeri fluxibus.

## 251    G. XIII.    VOMITUS.

Palpabilem materierum, non cruentarum, facta per os, oesophagumque rejectio frequens.

## 252    G. XIV.    ILEUS.

Atrox circa epigastrium dolor, seu gastrodynia, alvi constipatio, et foeculentæ demum materiae vomitio.

## 253    G. XV.    CHOLERA.

Vomitio biliosa aut acris assidua et diarrhoea violenta cum dolore abdominis, virium prostratione et non raro furarum crampis.

## G. XVI. DIARRHOEA. 254

Excrementitiorum humorum frequens, vel  
intempestivo dejectio.

## G. XVII. COELIACA. 255

Albescentium, aut chilacearum materierum  
dejectio.

## G. XVIII. LIENTERIA. 256

Celeris statim a pastu facta ingestorum, vix  
mutatorum dejectio.

## G. XIX. TENESMUS. 257

Muci pauci frequens dejectio cum intensa de-  
jiciendi cupiditate, et assiduo conatu.

## O. III. SERIFLUXUS.

Fluxus quivis nec cruentus nec alvinus.

## G. XX. EPIDROSIS Hippocratis. 258

Sudoris quantitate, qualitate, intempestivi-  
tate peccantis effluxus.

## G. XXI. EPIPHORA. 259

Vitiosus ex oculis humoris lachrymalis, seba-  
cei, vel purulenti effluxus.

## 62 GENERA MORBORUM

260 G. XXII. CORYZA, *Hippocr. Gorraei.*  
Def. Med.

Humoris serosi, mucosive e naribus effluxus  
sine ozæna, sæpius cum gravedine.

261 G. XXIII. PTYALISMUS.

Salivæ vel muci sine expectoratione ac vomitione ex ore effluxus, aut emissio.

262 G. XXIV. ANACATHARSIS, *Hippocr. Galen. in Aph. 8. lib. 5.*

Muci, lymphæ, vel cujuscumque humoris facta cum tussi expectoratio constans et notabilis.

263 G. XXV. DIABETES.

Subito post pastum potulentorum cum magna siti per urinae vias, emissio.

264 G. XXVI. ENURESIS.

Involuntaria, doloris et ardoris expers, mictio.

265 G. XXVII. DYSURIA.

Difficilis et dolorifica, sæpius ardens, urinae immissio.

266 G. XXVIII. PYURIA.

Purulenta, albescentis, aut viscido-mucosae materiei mictio.

G. XXIX. LEUCORRHOEA, *Castell.* 267  
Lex. *Bonet.* Anat. Pr. Lib. 3.

Serofo-flavae, vel puriformis materiae ex utero delapsus.

G. XXX. GONORRHOEA. 268

Stillicidium fluidi feminalis ex urethra, aut ex vagina.

G. XXXI. DYSPERMATISMUS, *D. Cuffon.* 269

Seminis in actu venereo stillatitia, tarda, impedita, et ad generationem insufficiens emissio.

G. XXXII. GALACTIRRHOEA. 270

Stillicidium lactis ex mammis.

G. XXXIII. OTORRHOEA, *Linn.* gen. 271

Fluxus ex auris cavo, ambitu, aut parte postica.

## O. IV. AERIFLUXUS.

Flatus, halitusve vitiosa emissio.

64 GENERA MORBORUM

372 G. XXXIV. FLATULENTIA.

Flatuum ex primis viis per superiora aut inferiora frequens rejectio borborygmis stipata.

273 G. XXXV. ÆDOPSOPHIA.

Flatuum per urethram, vaginam, vel uterum emissio.

274 G. XXXVI. DYSODIA.

Miasmatum foetidorum exhalatio.

## CL. X. CACHEXIÆ.

Coloris, figurae, molis in corporis habitu depravatio.

## O. I. MACIES.

Corporis partium mollium extenuatio.

G. I. TABES. 275

Macies cum amphimerina lenta sine tussi.

G. II. PHTHISIS, *Graec.* 276

Corporis emaciatio cum amphimerina lenta, tussi, dyspnoea, et ut plurimum puris sputo.

G. III. ATROPHIA. 277

Macies sine febre.

G. IV. ARIDURA, *Etmulleri.* 278

Macies unius tantum partis.

## O. II. INTUMESCENTIÆ.

Deformitas a volumine adaucto.

## 66 GENERA MORBORUM

### 279 G. V. POLYSARCIA.

Intumescencia universalis ab adipe molesta et corporis agilitatem minuens.

### 280 G. VI. PNEUMATOSIS.

Elastica et flatulenta cutis intumescencia.

### 281 G. VII. ANASARCA.

Cutis totius intumescencia, mollis, pallida, non elastica.

### 282 G. VIII. PHLEGMATIA.

Artuum inferiorum turgescencia mollis, non elastica, cuti concolor, indolens.

### 283 G. IX. PHYSCONIA.

Intumescencia abdominis a partibus solidis sine gravitate et fluctuatione.

### 284 G. X. GRAVIDITAS.

Intumescencia abdominis ab hypogastrio incipiens, opus generationis subsequens et partu terminanda.

## O. III. HYDROPE PARTIALES.

Tumores majores sed non universales, a flui-



do intra cavum capitis, abdominis, uteri,  
vel vesicae contento.

G. XI. HYDROCEPHALUS. 285

Tumor capitis, facie saepius excepta, mollis  
aut elasticus, a fluidi intra ipsum conge-  
stione.

G. XII. PHYSOCEPHALUS. 286

Tumor totius capitis tensus elasticus sub di-  
gito crepitans.

G. XIII. HYDRORACHITIS, *Morgagni*. 287

Tumor cysticus sero turgidus ex hiatu verte-  
brarum lumbarium in recens natis protu-  
berans cum anaesthesia.

G. XIV. ASCITES. 288

Hydrops totius abdominis a fluido non ela-  
stico, seu gravis et fluctuosus.

G. XV. HYDROMETRA. 289

Hypogastrii in mulieribus successive crescens  
tumor, uteri figuram referens, pressioni ce-  
dens, fluctuansve, ab ischuria et graviditate  
diversus.

## 290 G. XVI.     PHYSOMETRA.

Constans, permanensque tumor levis, elasticus, uteri figuram, et sedem referens in mulierum hypogastrio.

## 291 G. XVII.     TYMPANITES.

Hydrops totius abdominis a flatu, seu elasticus et levis.

## 292 G. XVIII.     METEORISMUS.

Inflatio flatulenta, vel epigastrii, vel in morbo acuto ipsius abdominis.

## 293 G. XIX.     ISCHURIA.

Tumor hypogastrii ex urinae retentione facpius intra vesicam.

Species sunt.

## I. Ischuriae renales.

Ischuria (*Nephritica*) a renum inflammatione, S. sp. 1. *Schacht*. Institut. med. pract. lib. VIII. cap. I. et VIII. *Gort*. Syst. prax. med. de ischur. *Fabric*. *Hildan*. de lithot. cap. IV. *Leal a Fonte*, Conf. 59. *Bonet*. Sepulchr. lib. III. sect. XXIV. obs. IV. § 3. *Schenck*. lib. III. de ischur. fals. cap. IV. et V. *Etmuller* Coll. pract. pag. 994.

Ischuria (*Nephrolithica*) a renum calculo, S. sp.

2. *Schacht*. lib. citat. cap. II. et VIII. *Gort*. lib. citat. de morb. renum. *Car. Pifon*. de morb. a colluv. ferof. *Schenck*. de ifchur. *Bonet*. Sepulchr. de urin. fuppreff. et Medic. feptentrional. de ifchur.

Ifchuria (*Nephroplethorica*) renalis a plethora, S. fp. 3. *River*. Cent. I. obf. 1. et 89. *Etmull*. *Schacht*. loco citat. *Gaub*. Pathol. de vit. mißt. *Ludwig*. Inffit. med. clin. *Seb. Nafii* Specul. method. med. pag. 167.

Ifchuria (*Lunatica*) renalis lunatica, S. fp. 4. *Tulp*. Obf. med. lib. II. cap. 49.

Ifchuria (*Nephrospastica*) renalis fpafmodica, S. fp. 5. *Schacht*. *Gort*. lib. citat. *Sydenh*. Differ. epift. tom. 1. *Raulin* des malad. vapor. Mem. de l'Acad. R. des fc. ann. 1715.

Ifchuria (*Nephrelmintica*) renalis verminofa, S. fp. 6. *Gort*. lib. citat. *Gaub*. Pathol. de vit. mißt.

Ifchuria (*Nephrothromboides*) renalis a fanguine congrumato, S. fp. 7. *Mercat*. de morb. intern. cur. cap. 12. *Etmull*. de laef. urin. fecret. pag. 314. *Fernel*. Pathol. lib. VI cap. 13. *Gort*. *Gaub*. loc. citat.

Ifchuria (*Nephropyica*) a renum purulentia, S. fp. 8. *Schenck*. lib. III. de ren. tumorib. *Gort*. *Gaub*. loc. citat. *Bonet*. Sepulchr. de urin. fuppreff. *Sal. Diverf*. de affect. particularib. cap. 14.

Ischuria (*Nephrophlegmatica*) renalis pituitosa  
 feu mucosa, S. sp. 9. *Sal. Diversf.* loc. citat. *Grafii* Ephem. natur. cur. ann. III. obs. 212.  
*Schacht. Gort, Gaub. Mercat.* loc. citat. *Va-*  
*rand.* de ren. affect. *Bonet.* Sepulchr. de is-  
 chur. obs. IV. V.

Ischuria (*Nephroplegica*) renalis paralytodea, S.  
 sp. 10. *Sal. Diversf. Mercat.* loc. citat. *Horst.*  
 tom. II. lib. IV. obs. 49. *Marcel. Donat.* Hif-  
 tor. med. mirab. lib. IV. cap. 28. *Barthol.*  
 Cent. IV. epist. 18. 38. 39. *Hoechstet.* Obs.  
 Dec. V. cas. 20. *Claud. Chaptal.* pract. Monf-  
 pel.

Ischuria (*Suppleta*) renalis ab alia evacuatione  
 suppleta, S. sp. 11.

a. A diarrhoea et sudore, *Marcell. Donat.*  
 Hist. med. mirab. lib. IV. cap. 27. *Schenck.*  
 lib. III. de diabete, obs. 9.

b. Ab otorrhagia, *Sennert.* ex plat. pract. lib.  
 III. part. VIII. Sect. II. cap. 9.

c. A perspiratione, *Vandermond.* Journ. de med.  
 tom. IV.

d. A sudore, *Vandermond.* Journ. de med.  
 tom. X.

## 2. Ischuriae uretericae.

Ischuria (*Ureteritica*) ureteritica inflammatoria,  
 S. sp. 12. *Sal. Diversf.* loc. citat. *Ludwig.*

Instit. clin. *Gaub.* Pathol. de vit. miēt. *Schacht.*

Instit. pract de ischur. spur.

Ischuria (*Ureterolithica*). Ischuria ureterica calculosa, S. sp. 13. *Tulp.* Obs. med. lib. II. cap. 45. *Monro* Essais d'Edinb. tom. VI. art. 68. *Bonet.* Sepulchr. lib. III. de urin. suppress. *Schenck.* lib. III. de ureterib. *Sal. Diversf.* loc. citat.

Ischuria (*Uretero-thromboides*) Ischuria ureterica, a sanguinis grumo, S. sp. 14. *Sal. Diversf.* *Schacht.* *Gaub.* loc. cit. *Bonet.* Sepulchr. de urin. suppress. obs. I.

Ischuria (*Uretero-phlegmatica*) ureterica a pituita, S. sp. 15. *Gort.* Prax. med. syst. *Schacht.* *Sal. Diversf.* loc. citat. *Bonet.* Sepulchr. de urin. suppress. *Sebast. Nas.* Spec. meth. med. loc. citat. *Epiphan. Ferdinand.* hist. 97.

Ischuria (*Ureteropyica*) ureterica purulenta, S. sp. 16. *Gort.* lib. cit. de ureter. morb. *Schacht.* *Sal.* loc. cit.

Ischuria (*Ureterostomatica*) ab orificii ureterum inferioris clausura, *Theod. Eller.* Miscell. Berolin. Tom. IV. pag. 381. *Verdier* ex noel. Mem. de l'Acad. de chirurg. tom. II. obs. 17. *Lieutaud.* Mem. de l'Acad. R. des sc. ann. 1753. *Franc. Sylv. Deleboe* Prax. med. lib. II. *Saltzman.* Obs. anat. pag. 62.

## 3. Ischuriae vesicales.

Ischuria (*Cystitica*) a vesicae inflammatione, S. sp. 18. *Schacht*. Instit. pract. Mem. de l'Acad. R. des sc. ann. 1704. 1753. *Boneti* Sepulchr. lib. III. de urin. suppress. *Forest*. lib. XXV. observ. 27. 28. *Zacuti Lusitani* ex *Galeno*, Hist. med. princ. lib. II. Hist. 150.

Ischuria (*Cystolithica*) a vesicae calculo, S. sp. 19. *Tulp*. Observ. med. lib. IV. cap. 37. Effais d'Edinburg, tom. IV. *Forest* lib. XXV. obs. 23. *Fabric. Hildani*, Cent. III. observ. 67. *Car. Pisonis* de morb. a colluv. ferof. *Boneti* Sepulchret. de urin. suppress. observ. X. &c.

Ischuria (*Cystospastica*) a sphincteris vesicae spasmus, S. sp. 20. *Mercati* de morb. intern. cur. lib. IV. cap. 22. *Sebas. Nafii* Specul. method. med. part. II. pag. 267. *Nenteri* de ischur. *Schachtii*, *Gorterii*, *Gaubii*, *Varendaei*, loc. citat.

Ischuria (*Cystoplegica*) a vesicae paralyfi, S. sp. 21. *Lieutaud*. Compend. medic. de ischur. *Zacut. Lusitan.* ex *Galeno* Hist. princ. hist. 140. *Mangeti* Biblioth. medic. pract. tom. IV. *Se-rane* Thes. pro Reg. Cathedr. *Hollerii* de morb. intern. cap. 47. *Amat. Lusitan.* Cent. IV. cur. 10. *Pringle* Effais d'Edinburg, tom. artic. 32.

Ischuria (*Polyurica*) a vesica lotio diutius cohibito distenta, S. sp. 22. *Halleri* Praelect. in *Boerhaave*, tom. II. § 384. pag. 336. *Forest.* lib. XXV. observ. 14. *Nenter.* de ischuria. *Paraei* lib. XVI. cap. 48. *Sennert.* Pract. lib. III. part. VIII. sect. 1. cap. 4. *Etmulleri*, *Riverii*, *Varandaei* de ischur. &c.

Ischuria (*Cystopyica*) vesicalis purulenta, *Felic. Plateri Mantif.* Obs. 29. *Camerar.* Ephemer. natur. curios. tom. II. *Zacuti Lusitani* ex *Galeno*, Hist. medic. princip. hist. 148. *Holierii* de morb. intern. cap. 47. *Sebast. Nasii* Specul. method. med. part. 11. pag. 167. *Andrè* des maladies de l'urethre, observ. 16. *Vandermonde* Journ. de med. tom. IX.

Ischuria (*Cystothromboides*) vesicalis a sanguinis grumo, S. sp. 24. *Claudini* consult. 141. *Fabric.* *Hildani* Cent. III. observ. 66. *Foresti* lib. XXV. obs. 20. *Zacuti Lusitani* ex *Galeno* Hist. med. princip. hist. 145. et ejusdem *Prax. med. admirab.* lib. II. cap. 65. *Mercati* de morb. intern. cur. cap. 12.

Ischuria (*Cystophlegmatica*) vesicalis a muco, S. sp. 25. *Mercati* loc. citat. *Schacht.* Instit. medic. pract. lib. VIII. cap. 9. *Etmulleri* de ischur. vesicat. *Amati Lusitani*, Cent. VI. cur. 12. *Zacuti Lusitani*, *Prax. med. admirab.*



lib. II. observ. 64. *Boneti* ex *Thom. Bartholin.* de urin. suppress. observ. 17.

Ischuria (*Ectopocystica*) a vesicae ectopia, S. sp. 26.

a. Herniosa, seu a cystocele, *Verdier* Mem. de l'Acad. de Chirurg. tom. II. observ. 4. 6. 9. 10. 14. *Felic. Plater.* observ. pag. 830.

b. Proptoica, seu ab exocyste, *Verdier* ex *Noel.* lib. citat. obs. 17.

Ischuria (*Cystoproctica*) vesicalis ab intestino recto, scybalis, calculo, flatibus, inflammatione, abscessu, haemorrhoidibus turgente. *Dodonaci* Observ. medic. cap. 47. *Schenck.* lib. III. de ischur. observ. 6. *Wepferi* Dissert. de apopl. pag. 391. *Vandermonde* Journ. de med. tom. IX. pag. 261. *Boneti* Sepulchret. de urin. suppress. observ. 18. § 4. *Schacht. Gaubii*, loc. citat.

Ischuria (*Hysterocystica*) vesicalis ab utero, S. sp. 28.

a. Gravido, *Nordman.* Dissert. de ischur. gravidar. *Mauriceau*, lib. I. cap. XV. *Roderici a castro*, lib. II. cap. XV.

b. Parturiente, *Boneti* ex *Riolani* de urin. suppress. *Vandermonde* ex *Daran.* Journ. de med. tom. V.

c. Hydropico, *Hippocrat.* de morb. mulier. lib. 12. *Sennerti* Pract. lib. IV. part. I. sect. II. cap. X. XI. *Schenck.* lib. IV. de mol. fals. *Schachtii, Gaubii*, loc. citat.

d. Tumoribus distento, *Gaubii*, *Schachtii*, loc. citat. *Sennerti* ibidem, ac supra, cap. XIII. *Knoeffelii*, E. N. C. ann. IV.

e. Prociduo, *Nordmann*. Differt. citata. *Sabatier* Mem. de l'Acad. de Chirurg. tom. III. *Sennerti* ibid. ac supra cap. XVI.

Ischuria (*Atretarum*) urethrocystica a menstribus in vagina retentis, S. sp. 29. *Amyand* Transact. philos. ann. 1732. No 442. art. 8. pag. 45. *Schenck*. lib. IV. de part. genit. mulier. observ. 9. *Heister*. Chirurg. tom. II. pag. 951. *Astruc*. de morb. mulier. tom. I. lib. 1. cap. 5. Ischuria paradoxa, S. sp. 30. *Morgagni* Epistol. *Le Clerc*. Journ. de med. Juill. 1755. p. 11.

#### 4. Ischuriae urethrales.

Ischuria (*Perinaealis*) urethralis a perinaei tumore, S. sp. 31. *Galen*. lib. de affect. loc. et ex eo *Zacuti Lusitan*. Hist. 149. *Vandermond* ex *Daran*. Journ. de med. tom. V. pag. 291. *Tulp*. Observ. med. lib. III. cap. X. *Forest* lib. XXVI. obs. 2.

Ischuria (*Urethrolithica*) a calculo urethrae imposito, S. sp. 32. *Schmid*. Eph. nat. cur. decad. I. ann. VIII. obs. 89. *Winckler*. ibid. tom. VI. obs. 34. *Zacut. Lusitan*. Prax. med. admirab. lib. II. obs. 66. 67. 68. *Tulp*. Obser. med. lib. III. cap. VIII. *Bonet*. Sepulchr. de urin. sup.

preff. obf. 14. *Barthol.* cent. IV. epist. 5. *Heister.* Chirurg. tom. II. pag. 839.

Ischuria (*Urethrophlegmatica*) a muco urethram infarciēte, S. sp. 33. *Bonet.* Sepulchr. et medic. septent. *Manget.* Biblioth. med. pract. *Amat.* *Lusitan.* cent. V. obf. 71. *Forest.* libr. XXV. obf. 25. *Varand.* de ischur. *Lud. Apin.* Eph. nat. cur. decad. III. ann. III. obf. 69.

Ischuria (*Urethrothromboides*) a sanguinis grumo urethram opplente, S. sp. 34. *Bonet.* Med. septentrion. de ischur. et sepulchr. de urin. suppres. obf. XI. *Forest.* lib. 25. obf. 25.

Ischuria (*Urethropyica*) a pure urethram obstruente, S. sp. 35. *Bonet.* Med. septentr. de ischur. *Forest.* Scholio modo citat. *Boerhaave* Praefat.

Ischuria (*Urethrobymenodes*) a membrana in urethram impaēta, S. sp. 36. *Hist. de l'Acad. R. des sc.* ann. 1714, hist. pag. 22.

Ischuria (*Urethrelmintica*) urethralis verminosa, S. sp. 37. *Joan. Petr. Albreicht.* Vid. *Bonet.* Medicinam septentrionalem de urin. cap. 31. et *Manget.* Biblioth. med. pract. tom. IV. de morb. urin. spectant. *Vandermonde* Journ. de med. Septembre 1758, pag. 245. *Joan. Rhodii* Centur. 3. obf. 36. *Collect. Acad.* tom. 3. pag. 497. obf. 77.

Ischuria (*Urethritica*) ab urethrae inflammatione, S. sp. 38. *Hildan.* Cent. IV. obf. 54. *Forest.*

de incert. urin. judiciis, lib. III. cap. 3. versus finem. *Varand.* de affectib. ren. et vesic. cap. VII. *Bonet.* Medic. septentr. de ischuria, cap. 1. No. V. *Goulard.* de malad. de l'urethre. *Heister.* Chirurg. tom. 2. pag. 838.

Ischuria (*Carunculosa*) a morbis, ut vocant, urethrae, S. sp. 39. *Amat. Lusitan.* cent. IV. cur. 19. Cent. V. cur. 48. *Sharp* Recherches critic. cap. IV. *Goulard.* des malad. de l'urethre. *Heister.* Chirurg. tom. II. pag. 834. *Andre* des maladies de l'urethre, passim.

Ischuria (*Hydrocclodes*) ab urethrae ruptura in scrotum hiant, S. sp. 40. *Joan. Lud. Apin.* Miscell. nat. cur. decad. III. ann. III. obs. 68.

Ischuria (*Cryptopyica*) a penis intra corpus retractione, S. sp. 41. *Fred. Hoffm.* Consult. de morb. abdom. cas. 105.

Ischuria (*Peridesmica*) a vinculo strictiori peni injecto, S. sp. 42. *Bonet.* med. septentr. de Ischuria, cap. 1. No. VIII.

Ischuria (*Phimofica*) urethralis a phimosi, S. sp. 43. *Horst.* tom. II. lib. IV. pag. 274.; *Goulard.* de malad. de l'urethre, *Heist.* Chirurg. tom. II. pag. 818. *Bonet.* Sepulchr. de ischur. obs. XV.

Ischuria (*Aspadialis*) ab urethrae clausura, S. sp. 44. *Heister.* Chirurg. tom. II. pag. 818. et 951. *Horst.* tom. II. obs. 55. *Joan. Wieri* obs. pag. 221.; *Bonet.* Sepulchr. de urin. suppress. observ. XV. schol. et med. septentr. de ischur. cap. 2. § VI.

## O. IV. T U B E R A.

Tumores partium solidarum, non hydropici.

## 294 G. XX. RACHITIS.

Deformitas ex articulorum tumore duro, car-  
nium marcore, capitis mole, cum ingenio  
praecoci, in puerulis.

295 G. XXI. SCROPHULA, *J. Allen. Sy-*  
*nopsis.*

Tumor scirrhusus glandularum colli, mesen-  
teriique, cum labiis et naso crassioribus.

## 296 G. XXII. CARCINOMA.

Ulcera cancrofa cum doloribus lancinantibus.

## 297 G. XXIII. LEONTIASIS.

Papillae fetaceae vel corniculatae cutim exa-  
sperantes.

## 298 G. XXIV. MALIS.

Tumores saepius purulenti, vel ulcera, cum  
infectis vermiforibus, passim enata.

## 299 G. XXV. FRAMBÆSIA.

Excrefcentia fungosae, mori instar granulo-  
sae saepius cum ulceribus, &c.

## O. V. IMPETIGINES.

Morbi chronici saepius contagiosi qui cutis excrefcentias, tumores gregales, exulcerationes, crustas, &c. inducunt.

## G. XXVI. SYPHILIS. 300

Post impurum concubitum ulcuscula, porri, bubones, fici primo ut plurimum in genitalibus, praegressa non raro gonorrhoea, dein pustulae crustosae, dolores nocturni, exostoses, caries, &c. in caeteris partibus.

## G. XXVII. SCORBUTUS. 301

Stomacace cum maculis lividis, flavis, purpureo-violaceis potissimum tibiaram.

## G. XXVIII. ELEPHANTIASIS. 302

Facies deformis tuberibus callofis, ozaena, raucedo, cutis elephantina crassa unctuosae, in extremis artubus anaesthesia.

## G. XXIX. LEPROA. 303

Tubercula callosa, scabie majora, vel crustis et squamis diffusa, herpetica, per cutem dispersa, pruriginosa.

304 G. XXX. SCABIES.

Pustulae crustosae, lentis magnitudine, pruriginosae manus potissimum obsidentes.

305 G. XXXI. TINEA.

Crustae flavae vel griseae, ulcerosae, per caput dispersae.

O. VI. ICTERITIÆ.

Totius cutis color inassuetus sine pyrexia a cuta.

306 G. XXXII. AURIGO.

Oculorum et cutis flavedo ad auream vel aurantiam vergens.

307 G. XXXIII. MELASICTERUS.

Cutis color niger, vel atro-lividus, atro-fuliginosus.

308 G. XXXIV. PHOENIGMUS.

Rubor diffusus, vel maculosus sine pyrexia.



G. XXXV. CHLOROSIS, *Sennerti* qui 309  
falso nomen Hippocrati tribuit.

Pallor, vel fuscus color cutis, oculis minime  
flavis, saepius cum pica.

## O. VII. CACHEXIÆ ANOMALÆ.

Signa classeos et affinitas cum prioribus ordi-  
nibus.

G. XXXVI. PHTHIRIASIS. 310

Exortus pediculorum vel insectorum pedicu-  
lis affinium ex diversis corporis partibus,  
quas porrigine, ulcusculisque defoedant,  
aut puncturis, pruritu discruciant.

G. XXXVII. TRICHOMA, *Jachii*. 311

Capilli invicem complicati, agglutinati in  
globos inextricabiles, saepius cum phthi-  
riasi.

G. XXXVIII. ALOPECIA. 312

Capillorum lapsus cum cuticulæ desquauma-  
tione.

## 82 GENERA MORBORUM

### 313 G. XXXIX. EL COSIS.

Numerosa vel. ampla ulcera chronica, cariosa, foetida cum pyrexia lenta.

### 314 G. XL. GANGRÆNA.

Initio mors partis, dein ejus putrida diffolutio.

### 315 G. XLI. NECROSIS.

Partis mors, sine tumore praevio, deinde vero exsiccatio, induratio, nigredo.

P A R S   S E C U N D A

G E N E R A

M O R B O R U M

D E F I N I T A

Ab Illustri

C A R O L O   A .   L I N N E ,

E Q U I T E   A U R A T O ,   A R C H I A T R O ,   & c .   & c .

U p s a l i æ   1763.



# CLAVIS CLASSIUM.

## M O R B I.

Febriles (e sanguine in medullam.)

EXANTHEMATICI I

CRITICI II

PHLOGISTICI III

Temperati

Nervini

Sensationis DOLOROSI IV

Judicii MENTALES V

Motus

QUIETALES VI

MOTORII VII

Fluidi Secretionis

SUPPRESSORII VIII

EVACUATORII IX

Solidi.

Interni DEFORMES X

Externi VITIA XI

EXANTHEMATICI Febris cum efflorescentia cutis maculata.

CRITICI Febris cum Urinae hypostasi lateritia.

PHLOGISTICI Febris cum Pulsu duro, Dolore topico.

DOLOROSI Doloris sensatio.

MENTALES Judicii alienatio.

QUIETALES Motus abolitio.

MOTORII Motus involuntarius.

SUPPRESSORII Meatuum impeditio.

EVACUATORII Fluidorum evacuatio.

DEFORMES Solidorum facies mutata.

VITIA Externa palpabilia.

SYMPTOMATA se habent ad Morbum, ut Folia et Fulcra ad Plantam.

FEBRIS dignoscitur Pulsu citato.

## I. EXANTHEMATICI.

## I. CONTAGIOSI.

## I. MORTA.

*Phlyctænae* (273) aliquot in Abdomine five  
Artubus, magnitudine avellanae.

*Febris* Diaria (11) malignissima, funestissima.

## II. PESTIS.

*Anthraces* (272) seu *Bubones* (271) gran-  
graenosi (233).

*Febris* Synocha (12) acutissima, funestissima,  
Vertigo (74), Anxietas (89), Lipyria.

## III. VARIOLA.

*Pustulae* (274) erysipelaceae, suppurantes, ef-  
charoticae (280), deciduae, cicatrisantes  
(317).

*Febris* Synochus (13), Cephalalgia (40),  
Lumbago (62).

## IV. RUBEOLA.

*Papulae* (275) uniformes, rubrae, evanescenti-furfuraceae.



## 88 GENERA MORBORUM

*Febris Synocha* (12), *Sternutatio* (154), *Epi-  
phora* (172), *Tussis* (155) sicca.

### V. PETECHIA.

*Sudamina* (321) livido-lurida, superficialia,  
insensibilia.

*Febris exacerbans* (23), *Asthenia* (92), *A-  
grypnia* (130).

### VI. SIPHYLIS.

*Nodi* (262), *Ulcuscula*, *Myrmeciae* (279).

*Febris Lenta* (14) nocturna, dolore ostocopo  
(61), *Marcore* (209), *Stranguria* (196),  
*Angina* (46).

## II. SPORADICI.

### VII. MILIARIA.

*Papulae* (275) rotundae, immerfae, diversi-  
colores, confertae, intacta facie, prurigi-  
nosae.

*Febris Synocha* (12), *Sudore* (207) foetido,  
punctorio.

### VIII. UREDO.

*Sudamina* (321) inaequalia, ruberrima, dila-

bilia, pruriginosa, fugacia, recidivantia,  
furfuraceo-evanescentia.

*Febris* Hæctica (24) benigna brevis.

# IX. A P H T A.

*Esfcharae* (280) albidæ, rotundæ, ductibus  
excretoriis internis innatæ.

*Febris* Lenta (14) obscura, cum Somnolentia  
(96).

## III. S O L I T A R I I.

# X. E R Y S I P E L A S.

*Macula* rubens, urens, pressione diffimulan-  
da, tumidiuscula, superficialis, dilatabilis,  
desquamatione finienda.

*Febris* Synocha (12), initio acuta, cum in-  
quietudine.

Protypus Exanthematicorum *Erysipelas* (10) est.

*Dysenteria* (191) ad Contagiosos referretur, modo Sca-  
bies (263) interna in oculos caderet.

*Malignitatis* symptomata imprimis sunt: *Lipothymia*  
(93), *Delirium* (65), *Vertigo* (74), *Oblivio* (107), *A-*  
*naesthesia* (118), *Lipyrria*, *Carpologia* (135) *Anhelatio*  
(157), *Aphonia* (115), *Aglutitio* (164).

## II. C R I T I C I.

### I. C O N T I N E N T E S.

#### XI. D I A R I A.

Febris terminanda intra septimanam dimidiam.

#### XII. S Y N O C H A.

Febris terminanda intra septimanam unicam.

#### XIII. S Y N O C H U S.

Febris terminanda intra septimanas duas vel tres.

#### XIV. L E N T A.

Febris protrahenda ultra septimanas tres.

## II. I N T E R M I T T E N T E S.

#### XV. Q U O T I D I A N A.

Febris paroxyfmi fimiles nycthemeris fingulis.

## XVI. TERTIANA.

Febris paroxyfmi fimiles nycthemeris alternis.

## XVII. QUARTANA.

Febris paroxyfmi fimiles nycthemeris tertis.

## XVIII. DUPLICANA.

Febris paroxyfmi fimiles alternati.

## XIX. ERRANA.

Febris paroxyfmi diffimiles omnes.

## III. EXACERBANTES.

## XX. AMPHEMERINA.

Febris continens (14) cum Quotidiana (15).

## XXI. TRITÆUS.

Febris continens (14) cum Tertianâ (16).

## XXII. TETARTOPHIA.

Febris continens (14) cum Quartana (17).

## XXIII. HEMITRITÆA.

Febris Tritæus (21) cum Amphemerina  
(20).

## XXIV. HECTICA.

Febris Lenta (14) cum Duplicana (18).

*Protypus Criticorum Tertiana (16) fit, aut potius Rheumatismus (62).*

*Apyria est deflagratio febris.*

*Phthisis (208) posset post Hecticam (24) collocari, si ordo naturalis admitteret et expectoratio.*

*Lethargus (98) cum Febricula his affinis est.*

## III. PHLOGISTICI.

## I. MEMBRANACEI.

## XXV. PHRENITIS.

Inflammatiō (231) *Meningum*.

*Febris* Synocha (12), Cephalalgia (40), Furor (68), Anxietas (89), Syringmos (72), Ophthalmia (43), Carpologia (135), Oblivio (107).

## XXVI. PARAPHRENESIS.

Inflammatiō (231) *Diaphragmatis*.

*Febr.* Peripneumonia (34), Phrenitis (25).

## XXVII. PLEURITIS.

Inflammatiō (231) *Pleurae*.

*Febr.* Synocha (12), Dyspnoea (160), Tussis (155), Haemoptysis (179), Pleuritica (53).

## XXVIII. GASTRITIS.

Inflammatiō (231) *Ventriculi*.

*Febr.* Amphemerina (20), Lipyria, Anxietas (89), Vomitus (183) ingestorum, Cardialgia (48).

## XXIX.    ENTERITIS.

Inflammatio (231) *Intestini*.

*Febr.* cum evacuatione abdominis, colica  
(50) atroci, tensiva, calente.

## XXX.    PROCTITIS.

Inflammatio (231) *Ani*.

*Febr.* Proctica (59) cum Tenesmo (193).

## XXXI.    CYSTITIS.

Inflammatio (231) *Vesicae*.

*Febr.* Dolor Hypogastrii cum tumore inflammatorio, Dysuria (57), Tenesmo (193).

## II. PARENCHYMATICI.

## XXXII.    SPHACELISMUS.

Inflammatio (231) *Encephali*.

*Febr.* Synochus (13), Delirium (65), Carpalgia (135). Asthenia (92), Immobilitas, Anaesthesia (118), Aphonia (115).

## XXXIII.    CYNANCHE.

Inflammatio (231) *Faucis*.

*Febr.* Synocha (12), Tussis (155), Aglutitio



(164), Orthopnoea (162), Angina (46),  
Suffocatio (158), Linguae intumescentia.

#### XXXIV. PERIPNEUMONIA.

Inflammatiō (231) *Pulmonis*.

*Febr.* Synocha (13), Tussis (155), Haemoptysis (179), Dyspnoea (160), Interascapulii dolor, Cubatus supinus.

#### XXXV. HEPATITIS.

Inflammatiō (231) *Jecinoris*.

*Febr.* Amphemerina (20), Tussis (155) sicca, Asthma (161), Singultus (153), Hypochondrii dextri tensio calens.

#### XXXVI. SPLENITIS.

Inflammatiō (231) *Lienis*.

*Febr.* Tetartophia (22), Respiratio interfecta (149), Hypochondrii sinistri tumor pulsatorius.

#### XXXVII. NEPHRITIS.

Inflammatiō (231) *Renis*.

*Febr.* Synochus (13) irregularis, Nausea (182), Singultus (153), Ructus (181), Urinae varietas, Obstipatio (166), Lumbago (62) urens, Femoris stupor (105).

XXXVIII. H Y S T E R I T I S.

Inflammatiō (231) *Uteri*.

*Febr.* Delirium (65), Spasmus (121), Sardiasis  
(125), Dolor hypogastrii tumorque calens.

III. M U S C U L O S I.

XXXIX. P H L E G M O N E.

Inflammatiō (231) *Partis Externae*.

*Febris* ex partis externaе tumore pulsatorio,  
Rubore tensivo, calente.

*Lipyrria dum externa frigent, interna fervent.*

*Protypus Phlogisticorum* Phlegmone (39) est.

Delirium (65) *quasi primus gradus Phrenitidis est.*

## IV. DOLOROSI.

## I. INTRINSECI.

## XL. CEPHALALGIA.

*Capitis* totius aut portionis dolor gravativus.

## XLI. HEMICRANIA.

*Capitis* lateralis dolor tensivus.

## XLII. GRAVEDO.

*Frontis* dolor pressorius.

## XLIII. OPHTHALMIA.

*Oculi* dolor.

## XLIV. OTALGIA.

*Auris* dolor.

## XLV. ODONTALGIA.

*Dentis* dolor maxillaris.

## XLVI. ANGINA.

*Faucis* dolor cum suffocatione (158).

98 GENERA MORBORUM

XLVII. S O D A.

*Oesophagi* dolor rancido deurens Ruſtibus  
(181) calidis.

XLVIII. C A R D I A L G I A.

*Cardiae* dolor ſcrobiculi ſubſyncopalis (94).

XLIX. G A S T R I C A.

*Ventriculi* dolor epigaſtrii.

L. C O L I C A.

*Inteſtini* dolor umbilicalis cum torminibus  
(123).

LI. H E P A T I C A.

*Jecinoris* dolor hypochondrii dextri.

LII. S P L E N I C A.

*Lienis* dolor hypochondrii ſiniſtri, ſuſpiria  
(150).

LIII. P L E U R I T I C A.

*Thoracis* dolor lateralis punctorius.

LIV. P N E U M O N I C A.

*Pulmonis* dolor cum Orthopnoea (162), Tuſſi  
(155), Haemoptyi (179).

## LV. HYSTERALGIA.

*Uteri dolor.*

## LVI. NEPHRITICA.

*Renis dolor.*

## LVII. DYSURIA.

*Vesicae dolor.*

## LVIII. PUDENDAGRA.

*Genitalis dolor.*

## LIX. PROCTICA.

*Ani dolor.*

## II. EXTRINSECI.

## LX. ARTHRITIS.

*Geniculorum dolor periodicus ;*

*a Synovia corrupta.*

## LXI. OSTOCOPUS.

*Articulorum dolor internus fixus ;*

*a Periostio infecto.*

## LXII. RHEUMATISMUS.

*Musculorum dolor ad motum ;*

*a Tunica cellulosa infecta.*

LXIII. VOLATICA.

*Vasorum dolor migrans.*

LXIV. PRURITUS.

*Cutis titillatio occulta, Scalpendi necessitatem  
inducens.*

*Raphania (145) dolore intenso his affinis: Ob Spasmos  
vero et Convulsiones sequentibus.*

## V. M E N T A L E S.

## I. I D E A L E S.

## LXV. D E L I R I U M.

Infania acuta, transitoria, symptomatica cum febre.

## LXVI. P A R A P H R O S Y N E.

Infania acuta, periodica, sine febre.

## LXVII. A M E N T I A.

Infania chronica, universalis, innocua.

## LXVIII. M A N I A.

Infania chronica, universalis, furibunda.

## LXIX. D Æ M O N I A.

Infania chronica, partialis, furibunda, meticulosa, de Daemonibus.

## LXX. V E S A N I A.

Infania chronica, partialis, tranquilla.

## LXXI. M E L A N C H O L I A.

Infania chronica, partialis, moesta, meditata.



## II. I M A G I N A R I I.

### LXXII. SYRINGMOS.

Perceptio *Soni* tinnitantis falsi.

### LXXIII. PHANTASMA.

Perceptio *Visibilis* objecti falsi.

### LXXIV. VERTIGO.

Perceptio circumgyrationis falsae.

### LXXV. PANOPHOBIA.

Imaginatio *mali* falsi in solitudine.

### LXXVI. HYPOCHONDRIASIS.

Imaginatio *fati lethalis* e levi malo, Borborygmi (123), Ructus (181) acidi, Palpitationes (132), Praecordia tremula, Persuasio.

### LXXVII. SOMNAMBULISMUS.

Imaginatio *somniantis* fortior, qua motus voluntarii excitantur.

## III. P A T H E T I C I.

### LXXVIII. CITTA.

Desiderium *non Esculenti* ingerendi.

## LXXIX. BULIMIA.

Defiderium *Cibi* inexplebile.

## LXXX. POLYDIPSIA.

Defiderium *Potus* continuum.

## LXXXI. SATYRIASIS.

Defiderium *Veneris* enorme.

## LXXXII. EROTOMANIA.

Defiderium *Amantium* pudicum.

## LXXXIII. NOSTALGIA.

Defiderium *Patriae* Affiniumve.

## LXXXIV. TARANTISMUS.

Defiderium *Choreae* (*ſaepe a morſura Inſecti*).

## LXXXV. RABIES.

Defiderium *Mordendi* lacerandique innocuos  
(*ſaepe a Morſura Mammalis*.)

## LXXXVI. HYDROPHOBIA.

Averſatio *Potulentorum* cum Rigore (141)  
et Sardiali (125); (*ſaepius praecedenti ma-  
ritata*).

LXXXVII. CACOSITIA.

Aversatio *Cibi* cum horrore.

LXXXVIII. ANTIPATHIA.

Aversatio *objecti* particularis.

LXXXIX. ANXIETAS.

Aversatio *mundanarum* rerum.

(*Cordis dolor*).

## VI. QUIETALES.

## I. DEFECTIVI.

## XC. LASSITUDO.

Debilitas constans musculorum ponderosa,  
quietem inducens.

## XCI. LANGUOR.

Debilitas successiva virium vitalium, non re-  
paranda quiete et cibatione.

## XCII. ASTHENIA.

Debilitas successiva virium omnium.

## XCIII. LIPOTHYMIA.

Defectio motus sensusque subita; superstita  
Pulsu Menteque.

## XCIV. SYNCOPE.

Lapsus virium vitalium subitaneus; abolitis  
Pulsu, Respiratione, Sensu, Calore.

## XCV. ASPHIXIA.

Lapsus virium animalium vitaliumque persi-  
stens.

## II. S O P O R O S I.

### XCVI. SOMNOLENTIA.

Sopor vigiliis protractior.

### XCVII. TYPHOMANIA.

Sopor apparens cum Agrypnia (130).

### XCVIII. LETHARGUS.

Somnolentia constans, levis, febrilis, Delirio  
(65) oblivioso.

### XCIX. CATAPHORA.

Sopor constans allocutione evigilans.

### C. CARUS.

Sopor constans cum insensibilitate, respira-  
tioneque tacita.

### CI. APOPLEXIA.

Sopor constans cum insensibilitate, Respira-  
tioneque stertorosa (156).

### CII. PARAPLEGIA.

Sopor constans partium sub thorace.

### CIII. HEMIPLEGIA.

Sopor constans lateris alterius.

## CIV. PARALYSIS.

Sopor constans partis alicujus.

## CV. STUPOR.

Sopor transitorius partis alicujus cum sensu  
formicationis.

## III. PRIVATIVI.

## CVI. MOROSIS.

*Imaginationis defectus.*

## CVII. OBLIVIO.

*Memoriae defectus.*

## CVIII. AMBLYOPIA.

*Visus obscuritas sine vitio sensibili.*

## CIX. CATARACTA.

*Visus privatio cum vitio observabili.*

## CX. AMAUROSIS.

*Visus privatio sine vitio sensibili, pupilla dilata.*

## CXI. SCOTOMIA.

*Visus Lypothymia (93) momentanea.*

## CXII. COPHOSIS.

*Auditus defectus.*

CXIII. ANOSMIA.

*Olfactus* defectus.

CXIV. AGEUSTIA.

*Gustus* defectus.

CXV. APHONIA.

*Loquelae* privatio.

CXVI. ANOREXIA.

*Famis* defectus.

CXVII. ADIPSIA.

*Sitis* defectus.

CXVIII. ANÆSTHESIA.

*Tactus* sensationis defectus.

CXIX. ATECNIA.

*Libidinis* defectus.

CXX. ATONIA.

*Fibrarum* Muscularium contractionis defectus.



## VII. MOTORII.

## I. SPASTICI.

## CXXI. SPASMUS.

*Artus* distentio violenta, subitanea, fugax.

## CXXII. PRIAPISMUS.

*Penis* spastica intumescencia.

## CXXIII. BORBORYGMUS.

*Intestinorum* contractio boans.

## CXXIV. TRISMOS.

*Mandibularum* clausura arcta.

## CXXV. SARDIASIS.

*Oris* retractio risum mentiens, fugax.

## CXXVI. HYSTERIA.

*Praecordiorum* pressio sub pectore, cum flatulentia (165), Suffocatione (158), Anxietate (89), Palpitatione (132), verticis pressione.

## II. GENERA MORBORUM

### CXXVII. TETANUS.

*Corporis* rigiditas cum sensibilitate.

### CXXVIII. CATOCHUS.

*Corporis* rigiditas cum insensibilitate.

### CXXIX. CATALEPSIS.

*Corporis* totius recepta forma, constans, flexilis, cum insensibilitate.

### CXXX. AGRYPNIA.

*Sensorii* rigiditas spastica, continua (*Pervigilium*).

## II. AGITATORII.

### CXXXI. TREMOR.

*Partium* agitatio continua, chronica, absque frigoris sensu.

### CXXXII. PALPITATIO.

*Cordis* Viscerisque motus subsultorius.

### CXXXIII. ORGASMUS.

*Arteriarum* subsultus.

### CXXXIV. SUBSULTUS.

*Tendinum* subsultoria elevatio.

## CXXXV. CARPOLOGIA.

*Digitorum tremula contractio infcia.*

## CXXXVI. STRIDOR.

*Manducatio sonora, vacua.*

## CXXXVII. HIPPOS.

*Palpebrarum niſtitatio frequentiffima.*

## CXXXVIII. PSELLISMUS.

*Loquelae titubatio in quibusdam literis.*

## CXXXIX. CHOREA.

*Lateris agitatio tremula, continua, inordinata.*

## CXL. BERIBERI.

*Partium tremor (131), Genuum contractura (299), Stupor (105), Raucedo (146).*

## CXLI. RIGOR.

*Partium vibratio periodica, cum frigoris intercutanei ſenſu.*

## CXLII. CONVULSIO.

*Partium agitatio violenta, periodica, cum ſenſibilitate.*

## CXLIII. EPILEPSIA.

*Corporis agitatio periodica, chronica, cum ſenſibilitate.*

CXLIV. HIERANOSOS.

*Corporis* agitatio continua, indolens, convulsiva, cum sensibilitate.

CXLV. RAPHANIA.

*Articulorum* contractio spastica, cum Agitatione convulsiva, Dolore violentissimo, periodico.

## VIII. SUPPRESSORII.

## I. SUFFOCATORII.

## CXLVI. RAUCEDO.

*Vocis sibilans elocutio ab arefcentia pneumatica.*

## CXLVII. VOCIFERATIO.

*Vocis dolorosa exaltataque exclamatio.*

*Ad Corpus indurandum.*

## CXLVIII. RISUS.

*Exspiratio profunda, agitatoria, cum Sardiassi (125).*

*Ad Sanguinem e Corde expellendum.*

## CXLIX. FLETUS.

*Inspiratio interfecta, singultuosa, cita, suspiriosa, cum moestitia, gemitu, lacrymis (172).*

*Ad sanguinem intra pulmones inglutiendum.*

## CL. SUSPIRIUM.

*Inspiratio profunda, agitatoria, lenta.*

*Ad sanguinem e pulmonibus expellendum.*

## CLI. OSCITATIO.

*Inspiratio tarda, adaucta, hians, spasmodica.*

*Ad sanguinem propellendum per pectus.*

## CLII. PANDICULATIO.

*Inspiratio profunda, pressoria cum extensione corporis artuumque.*

*Ad sanguinem per vasorum anastomoses propellendum.*

## CLIII. SINGULTUS.

*Inspiratio celer, convulsiva, momentanea, iterata, sonora.*

*Ad Cardiam evacuandam.*

## CLIV. STERNUTATIO.

*Exspiratio sonora, convulsiva, celer, inspirationi lentae succedens.*

*Ad sinum Frontis evacuandum.*

## CLV. TUSSIS.

*Exspiratio sonora, convulsiva, periodica.*

*Ad Tracheam evacuandam.*

## CLVI. STERTOR.

*Respiratio sonora, rauca, narium agitatione.*

*Ad mucum faucium subigendum.*

## CLVII. ANHELATIO.

*Respiratio citatissima, profunda, laevis, fugax.*

*Ad sanguinem per pulmones accelerandum.*

## CLVIII. SUFFOCATIO.

*Respiratio* angustatione faucium continua,  
fine febre.

*A Tracheae angustatione.*

## CLIX. EMPYEMA.

*Respiratio* gravis cum fluctuatione in cavo  
thoracis, post febrim.

*A pure in cavum Thoracis effuso.*

## CLX. DYSPNOEA.

*Respiratio* anhelosa (157), laboriosa, fine sen-  
su angustationis faucium.

*A pulmonum substantia oppilata.*

## CLXI. ASTHMA.

*Respiratio* stertorosa (156), laboriosa, diffi-  
lis chronica.

*A Bronchiis oppilatis.*

## CLXII. ORTHOPNOEA.

*Respiratio* suspiriosa (150), suffocatoria (158),  
acuta, subitanea.

*A sanguinis per pulmones difficili transitu.*

## CLXIII. EPHIALTES.

*Respiratio* profunda, suffocans (158), dormi-  
entis in dorso cum Somnio laborioso.

*Ab Intestinorum inflatione premente.*



## II. CONSTRICTORII.

### CLXIV. AGLUTITIO.

*Deglutitio* impedita.

### CLXV. FLATULENTIA.

*Ructus* (181) *Crepitusque* (194) impeditus,  
cum abdominis intumescencia.

### CLXVI. OBSTIPATIO.

*Faecum* exoneratio impedita.

### CLXVII. ISCHURIA.

*Mictus* impeditus.

### CLXVIII. DYSMENORRHOEA.

*Menstrua* suppressa s. dolorifica.

### CLXIX. DYSLOCHIA.

*Lochiorum* suppressio.

### CLXX. AGLACTATIO.

*Lactis* defectus.

### CLXXI. STERILITAS.

*Geniturae* suppressio.

## IX. EVACUATORII.

## I. C A P I T I S.

## CLXXII. OTORRHOEA.

*Auris* purulentus fluxus.

## CLXXIII. EPIPHORA.

*Oculi* lacrymalis fluxus continuus.

## CLXXIV. HÆMORRHAGIA.

*Naris* sanguineus fluxus.

## CLXXV. CORYZA.

*Naris* mucosus fluxus, copiosus, continuus.

## CLXXVI. STOMACACE.

*Oris* sanguinea e gingivis cruentatio.

## CLXXVII. PTYALISMUS.

*Oris* salivalis e glandulis copiosissimus effluxus.

## II. T H O R A C I S.

### CLXXVIII. S C R E A T U S.

*Faucis* mucī sonora evacuatio.

### CLXXIX. E X P E C T O R A T I O.

*Pulmonis* serosa e Trachea evacuatio.

### CLXXX. H Æ M O P T Y S I S.

*Pulmonis* sanguinea cum Tussi evacuatio.

### CLXXXI. V O M I C A.

*Pulmonis* purulenta, copiosa, improvisa evacuatio.

## III. A B D O M I N I S.

### CLXXXII. R U C T U S.

Rejectionis *Flatuum* frequens.

### CLXXXIII. N A U S E A.

Rejectionis *Cibi Flatuumque* conatus inanis.

### CLXXXIV. V O M I T U S.

Rejectionis ingestorum convulsiva.

### CLXXXV. H Æ M A T E M E S I S.

*Vomit* (184) sanguinis.

## CLXXXVI. I L I A C A.

*Vomit*us (184) cum Obstipatione (166) fixa  
et Colica (50).

## CLXXXVII. C H O L E R A.

*Vomit*us (184) cum Diarrhoea (188), Colica  
(50.)

## CLXXXVIII. D I A R R H O E A.

Dejectio *Fœcum* liquidarum frequens.

## C L X X X I X. L I E N T E R I A.

*Diarrhoea* (188.) Cibi immutati.

## C X C. C O E L I A C A.

*Diarrhoea* (188) Chymi.

## C X C I. C H O L I R I C A.

*Diarrhoea* (188) rubella, absque Colica.

## C X C I I. D Y S E N T E R I A.

*Diarrhoea* (188) cruenta, cum Colica (50),  
Tenesmo (194.)

## C X C I I I. H A E M O R R H O I S.

Dejectio *Sanguinis* cum Proctica (59), abs-  
que Colica.

## C X C I V. T E N E S M U S.

Dejectio *Muci* frequens, parca, cum desiderio.

## CXCIV. CREPITUS.

Dejectio *Flatuum* copiosa, crebra.

## IV. GENITALIUM.

## CXCVI. ENURESIS.

*Urinae* stillicidium involuntarium, indolens.

## CXCVII. STRANGURIA.

*Urinae* parca, guttata, frequens, dolorosa  
micturitio.

## CXCVIII. DIABETES.

*Urinae* copiosissimae frequens micturitio.

## CXCIX. HÆMATURIA.

*Urinae* cruentae micturitio.

## CC. GLUS.

*Urinae* viscosae micturitio.

## CCI. GONORRHOEA.

*Geniturae* stillicidium.

## CCII. LEUCORRHOEA.

*Muci* e sinu muliebri effluxus.

## CCIII. MENORRHAGIA.

*Menstruatio* copiosa, inordinata.

## CCIV. PARTURITIO.

*Foetus* maturi enixus laboriosissimus.

## CCV. ABORTUS.

*Foetus* praematura ejectio.

## CCVI. MOLA.

*Massae* carnae, intus cysticosae, ex utero ejectio.

## V. CORPORIS EXTERNI.

## CCVII. GALACTIA.

*Lactis* effluxus.

## CCVIII. SUDOR.

*Seri* per poros copiosa, frequens sudatio.

## X. DEFORMES.

## I. EMACIANTES.

## CCIX. PHTHISIS.

Marcor cum Hectica (24), Tussi (155), Dyspnoea (160), Expectoratione (178) purulenta, copiosa.

## CCX. TABES.

Marcor cum Hectica (24), *absque Expectoratione.*

## CCXI. ATROPHIA.

Marcor cum Atonia (120), *absque Expectoratione et Hectica.*

## CCXII. MARASMUS.

Marcor cum Aridura (229), *absque Atonia, Expectoratione, Hectica.*

## CCXIII. RACHITIS.

Marcor carniū tumentibus artuum Geniculis Capiteque; ossibusque saepe flexilibus.



## II. T U M I D O S I.

## CCXIV. P O L Y S A R C I A.

*Corporis* pinguedinosa intumescentia.

## CCXV. L E U C O P H L E G M A T I A.

*Corporis* emphysematosa (229) intumescentia.

## CCXVI. A N A S A R C A.

*Corporis* oedematosa (230) intumescentia.

## CCXVII. H Y D R O C E P H A L U S.

*Capitis* oedematosa (230) intumescentia, hi-  
antibus futuris cranii.

## CCXVIII. A S C I T E S.

*Abdominis* oedematosa (230) intumescentia.

## CCXIX. H Y P O S A R C A.

*Abdominis* nodosa intumescentia.

## CCXX. T Y M P A N I T E S.

*Abdominis* flatulenta (165) intumescentia,  
constans, sonora.

## CCXXI. G R A V I D I T A S.

*Abdominis* a foetu intumescentia nimia.

## III. DE COLORES.

## CCXXII. CACHEXIA.

*Pallor* corporis oedematosus (230), cum debilitate, moerore.

## CCXXIII. CHLOROSIS.

*Viridi-cinereus* color faciei foemineae cum Citta (78).

## CCXXIV. SCORBUTUS.

*Opacitas* faciei cum Anorexia (116), Lassitudine (90) matutina, Stomacace (175), Labario (309).

## CCXXV. ICTERUS.

*Flavedo* corporis cum urina luteo-tinctoria, foecibus albidis, (*Obstipatio Bilis*).

## CCXXVI. PLETHORA.

*Rubedo* corporis a distentis vasis sanguineis, cum Dyspnoea (160).

*HYDROPS* nomine veniunt *Anasarca* (216), *Ascites* (218), *Hyposarca* (219), *Hydrocephalus* (217), *Oedema* (230), et *Tympanites* (220).

## XI. V I T I A.

## I. H U M O R A L I A.

## CCXXVII. A R I D U R A.

Pars exsucca, emarcida, exantlatis humoribus, indolens.

## CCXXVIII. D I G I T I U M.

*Articuli* exsiccatio friabilis occulta.

Digitus marcor Dolore periodico intensissimo.

## CCXXIX. E M P H Y S E M A.

*Flatus* intra tunicam cellulosa Partis.

Tumor elasticus, concolor, subdiaphanus, indolens.

## CCXXX. O E D E M A.

*Lympha* stagnans intra tunicam cellulosa Partis.

Tumor digito premente foveolam admittens, concolor, vespertinus, indolens, Partis.

## CCXXXI. S U G I L L A T I O.

*Cruor* effusus in tunicam cellulosa.

Tumor obsoletus, latus, luridus.

## CCXXXII.    I N F L A M M A T I O.

*Sanguis* obstructus in vasis.

Tumor tensus, calidus, ruber, pulsans, dolens.

## CCXXXIII.    A B S C E S S U S.

Inflammatio suppurata, in *Pus* collecta.

Tumor mollis, aequalis, pruriens.

## CCXXXIV.    G A N G R A E N A.

Inflammatio f. Suppuratio suffocata, *mortua*  
serpens in tunica cellulosa.

Cutis livens, molliuscula, putris cum vesiculis sub epidermide, serpente vitio, margine subinflammato, subardente.

## CXXXV.    S P H A C E L U S.

*Gangraena* (234) omnium solidorum partis.*Mortificatio* putrida ad ossa penetrans, indolens, properans.

## II.    D I A L Y T I C A.

*(Solutiones Continui).*

## CCXXXVI.    F R A C T U R A.

*Ossis* solutio citra substantiae dissolutionem.

## CCXXXVII. LUXATURA.

*Geniculi* solutio citra substantiae dissolutionem.

## CCXXXVIII. RUPTURA.

*Tendinis* solutio citra substantiae dissolutionem.

## CCXXXIX. CONTUSURA.

*Fibrarum* solutio citra substantiae dissolutionem.

## CCXL. PROFUSIO.

*Sanguinis* effluxus copiosus e substantiae dissolutione.

## CCXLI. VULNUS.

Substantiae solutio partis mollis, hians, cruenta.

## CCXLII. AMPUTATURA.

Vulnus *detruncatione* partis totalis factum.

## CCXLIII. LACERATURA.

Vulnus *Fibrarum Cutisque laceratione* factum.

## CCXLIV. PUNCTURA.

Vulnus *Tendinis* punctione factum.

## CCXLV.    M O R S U R A.

Vulnus punctum armis animalium *venenatis*.

## CCXLVI.    C O M B U S T U R A.

Vulnus *igne* factum, inducta Eschara (281).

## CCXLVII.    E X C O R I A T U R A.

*Cutis* remota a Carnibus vivis.

## CCXLVIII.    I N T E R T R I G O.

*Cuticulae* erosio madens dolensque.

## CCXLIX.    R H A G A S.

*Fissura* Cutis arida.

## III.    E X U L C E R A T I O N E S.

(*Suppurationes apertae.*)

## CCL.    U L C U S.

Vulnus *Suppuratum* partis carnosae.

## CCLI.    C A C O E T H E S.

Ulcus *superficiale* serpens, manans, perenne.

## CCLII.    N O M A.

Ulcus Carnes integumentaue depascens, cicatricem inducens.

## CCLIII. CARCINOMA.

Ulcus *Schirri* (284) suppurati.

*Ulcus* putridum, serpens, valis tumidis radi-  
catum, periodice dolens.

## CCLIV. OZENA.

Ulcus intra antrum *Highmori*.

*Ulc.* oculum e Naribus foetens;

## CCLV. FISTULA.

Ulcus cortice *calloso* *vaginato*.

*Ulc.* sinuoso penetrans, intus cortice obtec-  
tum, ore angustatum.

## CCLVI. CARIES.

Ulcus *Offis* separato perioftio.

*Ulc.* connivens, cum raris punctationibus in-  
dolens, fanie passim nigra se prodens.

## CCLVII. ARTHROCACE.

Ulcus *Medullae* cum offis Carie (256).

*Ulc.* malignum, tumens, dolore estocopo (61).

## CCLVIII. COCYTA.

Animalculum venenatum intra partem re-  
ceptum.

*Partis* stigma dolore furioso.

## CCLIX. PARONYCHIA.

Serum corruptum sub *tendinibus* perioestioque.  
*Partis* rubor dolentissimus, os destruens.

## CCLX. PERNIO.

Partis ustio *Gelu* facta.  
*Pars* albo caerulescens, tempestatibus recru-  
 descens, saepe exulcerans.

## CCLXI. PRESSURA.

Digiti inflammatio (232) a *frigore*, in casum  
 unguis tendens.

*Inflam.* Digiti circum unguis in suppurationem  
 vergens.

## CCLXII. ARCTURA.

*Unguis* curvatura lateralis cutem secans.  
*Inflammat.* digiti cum ulceratione laterali  
 unguis.

## IV. SCABIES.

\* *Multiplicativa.*

## CCLXIII. LEPROSA.

*Pustulae* (275), *Eschara* (281) sicca colorata,  
 cum *Nodis* immerfis mobilibus indolenti-  
 bus fuscis *Rhiagadibusque* (249).



## CCLXIV. T I N E A.

*Pustulae* (275) *Capillitii* siccae, eschara (281)  
albo-flavescente, *Pilisque* abbreviatis erec-  
tis bulbofo-radicatis.

## CCLXV. A C H O R.

*Pustulae* (275) exulcerantes, manantes com-  
muni pinguedinoso.

## CCLXVI. P S O R A.

*Pustulae* (275) ichorosae, escharoticae (281),  
noctu imprimis pruriginosae (64).

## CCLXVII. L I P P I T U D O.

*Pustulae* (275) excoriantes *Palpebrarum*  
margines.

## CCLXVIII. S E R P I G O.

*Pustulae* (275) siccae, obsoletae, serpentes,  
subfarinaceo-desquamantes.

## CCLXIX. H E R P E S.

*Pustulae* (275) escharoticae (281), basi com-  
muni erysipelacea (10).

## CCLXX. V A R U S.

*Pustulae* (275) *Glandulurum sebacearum* ru-  
brae, dispersae, chronicae.

## CCI XXI.    B A C C H I A.

*Vari* (270) *faciei* cum nodis maculisque coloratis chronicis.

\*\* *Simplex.*

## CCLXXII.    B U B O.

*Glandula conglomerata* inflammata, in suppurationem tendens.

## CCLXXIII.    A N T H R A X.

*Glandula subcutanea* inflammata, in suppurationem malignam vergens.

*Tumor* rotundus, erisipelaceus (10), immerfus, dolentissimus, suppurandus apice acuto, pustula purifera.

## CCLXXIV.    P H L Y C T Æ N A.

*Vesicula* serosa, distenta, pellucida, basi inflammata, rupta dolens.

## CCLXXV.    P U S T U L A.

*Vesicula* purulenta, turgens, dehiscens pure.

## CCLXXVI.    P A P U L A.

*Tuberculum* farctum, coloratum, inflammatum, vix suppurandum.

## CCLXXVII.    H O R D E O L U M.

*Tuberculum* cysticosum, ovatum, in limbo palpebrarum, suppurans saepius apice.

## CCLXXVIII. VERRUCA.

*Papilla* nervea intumescens, indurata.

*Papula* durior, scabra, sicca, indolens.

## CCLXXIX. CLAVUS.

*Verruca* (278) callosa, in Tendinibus radicata, basi sensibilis.

## CCLXXX. MYRMECIUM.

*Verruca* (278) madida, mollis, denudata.

## CCLXXXI. ESCHARA.

*Crusta* mortua, ab humoribus extravasatis coagmentata, decidua.

## V. TUMORES protuberantes.

## CCLXXXII. ANEURISMA.

*Arteriae* dilatatio.

Tumor mollis, pulsans, concolor, rotundatus.

## CCLXXXIII. VARIX.

*Venae* dilatatio.

Tumor mollis, quiescens, concolor, rotundatus.

## CCLXXXIV. SCIRRHUS.

*Glandula* indurata.

Nodus durus, asper, concolor, indolens, rotundatus, pressione insensibilis.

## CCLXXXV. STRUMA.

*Glandula* infarcta.

Nodus indolens, solidiusculus, pressione obtuse sentiens.

## CCLXXXVI. ATHEROMA.

Tumor tunicatus, rotundatus, mobilis, molliusculus, indolens, absque cystide.

## CCLXXXVII. ANCHYLOSIS.

Tumor *Geniculorum*, ligamenti capsulaeque tensione expressa Synovia.

Tumor ad genicula, mollis, pulposus concolor.

## CCLXXXVIII. GANGLION.

Tumor *Tendinibus* innatus, ovatus, mobilis, pulposus indolens.

## CCLXXXIX. NATTA.

Tumor tunicatus, musculis irradicatus, emittens, pulposus, indolens.

## CCXC. SPINOLA.

Tumor supra *vertebras lumborum* mollis, exiguus, Vertebrarum processibus dehiscen-  
tibus.

## CCXCI. EXOSTOSIS.

Tumor durus ex *osse* prominente enatus.

## VI. PROCIDENTIÆ.

## CCXCII. HERNIA.

*Intestini* obiecti ultra propriam sedem protrusio.

## CCXCIII. PROLAPSUS.

*Viscus* nudum relaxatum, elongato propendens ultra proprium locum.

## CCXCIV. CONDYLOMA.

*Tunica interior* relaxata gibba.

## CCXCV. SARCOMA.

*Caro nuda* enata e vivo vulnere.

## CCXCVI. PTERYGIUM.

*Cuticula* excrefcens e cantho oculi, superficiem ejus obtegens.

136 GENERA MORBORUM

CCXCVII. ECTROPIUM.

*Palpebra inferior resupinato-inversa.*

CCXCVIII. PHIMOSIS.

*Praeputii intumescencia inflammata, glandem denudans incarceransve.*

CCXCIX. CLITORISMUS.

*Clitoridis intumescencia extra finum pudoris.*

VII. DEFORMATIONES.

CCC. CONTRACTURA.

*Geniculorum fixatio rigida.*

CCCI. GIBBER.

*Thoracis dilatatio prominens.*

CCCII. LORDOSIS.

*Ossium incurvatio.*

CCCIII. DISTORTIO.

*Ossium ad latus non naturale flexio.*

CCCIV. TORTURA.

*Oris ad latus flexio.*

CCCV. STRABISMUS.

*Oculi distorti et inaequaliter moti.*

## CCCVI. LAGOPHTHALMIA.

*Oculi* sursum visio palpebra superiore abbreviata.

## CCCVII. NYCTALOPIA.

*Oculi* visus nocturnus.

## CCCVIII. PRESBYTIA.

*Oculi* visus remotus.

## CCCIX. MYOPIA.

*Oculi* visus approximatus.

## CCCX. LABARIUM.

*Dentes* vacillantes in suis alveolis.

## CCCXI. LAGOSTOMA.

*Labium* superius oris fissum.

## CCCXII. APELLA.

*Praeputii* abbreviatio absque inflammatione.

## CCCXIII. ATRETA.

*Meatus* corporis imperforatus.

## CCCXIV. PLICA.

*Capillorum* contortuplicatio indissolubilis.

## CCCXV. HIRSUTIES.

*Pili* copiosiores longioresque.

CCCXVI. ALOPECIA.

*Pilorum* defluvium.

CCCXVII. TRICHIASIS.

*Ciliorum* distortio.

VIII. MACULÆ.

CCCXVIII. CICATRIX.

*Callus* replens ulcerationes consolidatas.

CCCXIX. NÆVUS.

Macula quaecunque congenita.

CCCXX. MORPHÆA.

Macula *alba*, depressa, lata.

CCCXXI. VIBEX.

*Lineae sanguinicolores* subcuticula.

CCCXXII. SUDAMEN.

Maculae *rubrae*, pulicares, glabrae, pungentes, evanescentes.

CCCXXIII. MELASMA.

Macula *caerulefscens* in parte tecta.



## CCCXXIV. HEPATIZON.

Macula *grisea*, subaspera, pruriens.

## CCCXXV. LENTIGO.

Maculae *griseae*, confluentes, insensiles.

## CCCXXVI. EPHELIS.

Color *fuscus* partis insolatae.

*Heu mihi! tot mortes Homini, quot membra, malisque  
Tot sumus infecti, Mors ut Medicina putetur.*

## T H E O R I A.

1. CORPUS vivum constat *Medullari* cerebroso, et *Corticali* solido fluidoque.
2. VITA sentiens movensque, residet in medullari primordiali, continuato, multiplicativo.
3. MEDULLARE arcte custoditum, nervis expansis tentaculatum, fabricat suum corticale solidum e fluidis vegetabilium, et fluida haec vicissim per solida prae-  
parat.
4. Medullare hoc *nutritur* tenuissimo spiri-  
tuofo liquido corticali, sed *flagrat* electri-  
co pulmonibus hausto.
5. Medullare sentiens se pandit ad *gratum*  
salutare, et movens se retrahit ad *ingra-  
tum* noxium.
6. Fluidum corticale, e quo solida, solvitur  
destruiturque *Acidis* aut *Putridis*, utrisque  
multiplicativis. Sic vitatur Sanguis pu-  
trido, Serum acido.

7. His dum resistit sentiens movens, oriuntur FEBRES: *Criticae* ab acescente, *Phlogisticae* a putrescente, at *Exanthematicae* a vivo? peregrino multiplicabili.
8. FLUIDORUM nociva ingrata eliminare studet vita per vias naturales et artificiales, et quo haec periculosiora, eo citius, per datam sic portam simul ejecit quaevis impura; sed duas portas simul apertas non facile admittit, ne exhauriatur (a).
9. Quidquid praecipue adversum sentit, praecipue curat vel minora majoribus adsociat (b), ut tota se his opponat.
10. CORTICALE solidum deteritur viatiaturque quotidie, adeoque quotidie reparandum; reparatur autem *Diaeta*, eaque multiplici; ab appropriata bene, ab erronea perverse, unde defectus, *Morbi* dicti.
11. MORBI tolluntur contraria causa (c); hanc ut citius natura obtineat, *Toxica* misceantur ingerendis, *Medicamenta* dicta.

(a) Evacuationes duae simul et semel possunt vix stare.

(b) Dolor dolorem trahit.

(c) Morbi morbis curantur.

12. CONTRARIA haec ex fapidis in fluida Solidaque et ex *Olidis* in medullare agentibus dignoscenda sunt : E contrariis itaque saporibus et odoribus primaria medicamenta eruenda ; in his itaque *Clavis Materiae Medicae*.

# QUALITATES

## MEDICAMENTORUM.

### I. S A P I D A.

Agunt in *Corticalē* Vitale :

in *Fluidis.* in *Solidis.*

1	AQUOSA.	Mundificantia,	Humectantia.		
		Aborbentia,	Exsiccantia	SICCA.	1
2	ACIDA.	Refrigerantia,	Attenuantia.		
		Balsamica,	Tonica	AMARA.	2
3	DULCIA.	Edulcorantia,	Impinguantia.		
		Incidentia,	Corrodentia	ACRIA.	3
4	VISCOSA.	Inviscantia,	Lubricantia.		
		Penetrantia,	Abstergentia	SALSA	4
5	PINGUIA.	Obtundentia.	Emollientia.		
		Inspissantia,	Adstringentia	STIPTICA	5

### II. O L I D A.

Agunt in *Medullare* Animatum.

Sensum	<i>Excitant</i>	AROMATICA,	<i>Sopiunt</i>	VIROSA.
Motum	<i>Spaslicant</i>	ORGASTICA,	<i>Evacuant</i>	NAUSEOSA.
Judicium	<i>Acuunt</i>	SPIRITUOSA,	<i>Confundunt</i>	TETRA.
Libidinem	<i>Provocant</i>	AMBROSIACA,	<i>Suffocant</i>	HIRCINA.



P A R S T E R T I A.

D E F I N I T I O N E S

G E N E R U M

M O R B O R U M

A Clarissimo

RUDOLPHO AUGUSTO VOGEL,

PHILOS. et MEDIC. D. HUIUSQ. PROFESS. &c. &c.

Gottingae 1764.

T





# TABULA CLASSIUM

## MORBORUM.

- I. FEBRES. Innati caloris augmentum praeternaturale, cum oris siccitate et gravitate corporis.
- II. PROFLUVIA. Humorū evacuatio, ab ordine, quantitate, aut qualitate naturali abhorrens.
- III. EPISCHESES. Excernendorum suppreffiones.
- IV. DOLORES. Sensationes molestae, corporis et animi tranquillitatem turbantes.
- V. SPASMI. Solidorum mobilium contractiones, vel agitationes.
- VI. ADYNAMIÆ. Sensationum, motuum, naturaliumve functionum defectus, aut imminutiones.
- VII. HYPERÆSTHESES. Sensationes auctae, vel perversae.

VIII. CACHEXIÆ. Male colorata corporis constitutio, cum debilitate.

IX. PARANOIÆ. Mentis aberrationes.

X. VITIA. Mutationes in superficie corporis conspicuæ.

XI. DEFORMITATES. Aberrationes solidorum ab ordine, positura, habitu, figura, numero, aliisque qualitatibus.

## I. F E B R E S.

## I. INTERMITTENTES.

Æstus ad summum 18 horas perdurat, dein aliquamdiu cessat, posteaque revertitur praevio frigore.

## I. S I M P L I C E S.

## I. QUOTIDIANA.

Quolibet die aut nocte recurrit.

## II. TERTIANA.

Uno die vel nocte una invadit, sequente intermittit, tertio repetit.

## III. QUARTANA.

Uno die vel una nocte invadit, deinde biduum intermittit, quarto iterum redit.

## IV. QUINTANA.

Singulo quinto die redit.

## V. SEXTANA.

Singulo sexto die repetit.

## VI. SEPTANA.

Singulo septimo die revertitur.

## VII. OCTANA.

Quolibet octavo die redit.

## VIII. NONANA.

Quovis nono die recurrit.

## IX. DECIMANA.

Quovis decimo die recurrit.

## X. VAGA.

Alio post decimum diem, sed haud fixo, recurrit.

## XI. MENTRUA.

Viris circa fluxum haemorrhoidalem, vel etiam citra illum, foeminis circa catamenia accidit.

II. *DUPPLICATÆ.*

## XII. TERTIANA duplex.

Quotidie accedit, interdum quoque bis uno die vacuo, accessionis vero tempora alternis diebus respondent.

## XIII. QUARTANA duplex.

Inter quatuor dies tertium tantum a febre

vacuum habet, et accessionis tempora alternatim praecedenti insultui respondent.

### III. *TRIPPLICATÆ.*

#### XIV. *QUARTANA* triplex.

Quotidiana, paroxysmis quarto quovis die conspirantibus.

## II. *CONTINUÆ.*

Nec interdiu, nec noctu intermittunt, sed remissiones saltem inferunt cum exacerbationibus, quae vel quotidie, aut tertio die, aut quarto, aliove accedunt.

### I. *SIMPLICES.*

#### XV. *QUOTIDIANA* Continua.

Quotidie cum frigore accidit, calor vero per totum reliquum tempus durat.

#### XVI. *SYNOCHUS.*

Facie rubra, cute humida, pulsu magno et frequenti, crisi perfecta terminantur intra 21 dies. Species ejus *Ephemera* est.

#### XVII. *AMATORIA.*

Febris paucarum horarum a magno frigore

incipiens, ex vehementi concubitus expectatione.

# XVIII. PHRENITIS.

Febris acuta, dolor capitis, delirium constans et vehemens.

# XIX. EPIALIA.

In qua frigoris sensus perpetuus cum rigore contingit.

# XX. CAUSOS.

Febris ardentissima, tertio quoque die acerbior, cum immensa siti, et siccissima atque nigra lingua.

# XXI. ELODES.

Febris cum profusissimo ac perpetuo sudore inde a primo die, et magno virium lapsu. *Typhodes* et *Sudor Anglicanus* ejus species sunt.

# XXII. LETHARGUS.

Febris in qua sopor et ab expergefactione delirium, mox opprimente iterum sopore.

# XXIII. TYPHOMANIA.

Febris ex phrenitide et lethargo mixta.

## XXIV. LEIPYRIA.

Febris in qua extrema algent, interna uruntur, pulsus parvus et obscurus.

## XXV. PHRICODES.

Febris cujus decursum crebri horrores rigoresve interpellant.

## XXVI. LINGODES.

Febris in qua aeger a principio usque ad crifin fingultit.

## XXVII. ASSODES.

Febris in qua aeger fere irrequietus est, et implacide molesteque habet, vel fastidio agitatur.

## XXVIII. CHOLERICA.

Febris cum vomitu frequenti atque torminosa alvi dejectione.

## XXIX. SYNCOPALIS.

Febris cui frequens lipothymia se intermiscet.

## XXX. HYDROPHOBIA.

Febris cum aversione liquidorum, fingultu, convulsione, et delirio.

## XXXI. OSCITANS.

Febris cum perpetua oscitatione,

## XXXII. ICTERICODES.

Auriginosa febris, quae cutem colore flavo inquinat, citra hepatis inflammationem.

## XXXIII. PESTILENTIALIS.

Febris pandemia, contagiosa, acutissima, in qua bubones aut certe carbunculi, aut vesiculae oriuntur cum leipyria, ingenti siti, spiritu, sudore, et dejectionibus foetidis, delirio, nausea, vomitu, pulsuque parvo ac obscuro.

## XXXIV. SIRIASIS.

Febris infantibus propria, in qua cutis sicca, pallida, inappetentia, oculi concavi, fontanelae subsidentia.

## II. COMPOSITÆ.

I. *Exanthematicae.*

## XXXV. VARIOLOSA.

Synochus contagiosa, a vomitu, cephalalgia, et lumbagine incipiens, in qua tertio die maculae erumpunt, sensim in pustulas purulentas, escharoticas, deciduas, abeuntes.



## XXXVI. MORBILLOSA.

Synochus contagiosa, cum tussi sicca et mādore oculorum, in qua maculae rubellae, lateſcentes, paulum elevatae erumpunt, quae deinceps in tenuiſſimas ſquamulas ſolvuntur.

## XXXVII. MILIARIS.

Phricodes, dolor rheumaticus in aliqua corporis parte, aut ſentus pūctorius in dorſo, crure, ac intetiſtis, aut itupor in digitis, puſtulae prurientes mihi ſentimus magitudine, rubrae vel albae, ſero primum lim-pido, deinceps ſubalbo perlarum colore non diſſimili, plenae, facie intacta, ſudor multus foetidus.

## XXXVIII. PETECHIALIS.

Febris maligna, exanthemata morſibus pulicum fere ſimilia, ſiaveſcentia, rubra, vel livida.

## XXXIX. SCARLATINA.

Synochos, maculae coccineae crebriores ac latiores, quam morbilli, nodulis ſubflavis, ad inſtar capitis acicularum, ornatae, fugaces, in ſquamulas dehitcentes.

## XL. URTICATA.

Synochos quotidiana continua mitior, tubercula puncturis urticarum similia, rubra, prominentia, fugacia.

## XLI. BULLOSA.

Maligna, vesiculae sero sublimpido repletae, magnitudine nucis avellanae et majores, in variis corporis partibus, facie non excepta, citra cutis inflammationem erumpentes.

## XLII. VARICELLA.\*

Variolae spuriae; ephamera, pustulae variolae simillimae, prurientes, primo die erumpentes et suppurantes, tertio resiccatae, et in squamulas deciduae, toto morbo intra septem dies ad summum terminato.

## XLIII. PEMPHINGODES.

Febris, quae pustulas in ore, phlyctides dictas, generat.

\* Haec *Varicella* facillime illudere Medicis sub specie variolosae potest, nisi ad decursum accuratissime attendant; unde dein bis vel ter laborare homines variolis existimantur.

## XLIV. A P H T H O S A.

Maligna cum ulcusculis in ore superficialibus, fungosis, mucosis, quas aphthas vocant.

## II. I N F L A M M A T O R I Æ.

## XLV. P H R E N I S M U S.

Vera inflammatio cerebri aut membranarum ejus ; quam ex dolore capitis et vehementi delirio febrili vulgo definiunt, quae signa vero admodum ambigua.

## XLVI. C H E M O S I S.

Vehemens adnatae oculorum inflammatio, ut super corneam feratur, acerbus dolor, perversio palpebrarum, cephalalgia, agrypnia.

## XLVII. O P H T H A L M I T E S.

Inflammatio interiorum oculi membranarum, et praecipue choroïdae ; dolor in oculo fere intolerabilis cum febre, cephalalgia, agrypnia, delirio. Vulgo *phlegmone* dicitur.

## XLVIII. O T I T E S.

Inflammatio auris internae ; dolor immanis

in aure, febris, cephalalgia, agrypnia, delirium.

#### XLIX. ANGINA.

Faucium inflammatio; febris continua, respirandi ac deglutiendi difficultas, praefocationis metus.

#### L. PLEURITIS.

Pleurae inflammatio; febris continua, dolor in latere thoracis pungens, tussis sicca, dyspnoea.

#### LI. PERIPNEUMONIA.

Pulmonum inflammatio; febris continua, dolor thoracis obtusus, gravativus, tussis humida aliquando cruenta, difficultas anhelitus angustiae.

#### LII. MEDIASTINA.

Mediaстini inflammatio; febris continua, incendium in thorace, offendiculum quoddam ad sternum in inspiratione, respiratio frequens, tussis cum sputis coloratis, orthopnoea; an semper?

#### LIII. PERICARDITIS.

Pericardii inflammatio; omnia ut in mediaстina, urgente morbo syncope.

## LIV. CARDITIS.

Cordis inflammatio, symptomata fere ut in peripneumonia, sed graviora, dolor vehemens in regione cordis, palpitatio, pulsus frequens ac inaequalis, hydrophobia; an semper?

## LV. PARAPHRENITIS.

Diaphragmatis inflammatio; febris continua, dyspnoea, dolor e regione ventriculi cinguli instar ventrem supra lumbos ambiens, delirium.

## LVI. GASTRITIS.

Ventriculi inflammatio; febris, leipyrria, dolor et ardor in epigastrio, sitis, vomitus ingestorum, singultus.

## LVII. ENTERITIS.

Intestini inflammatio; febris affodes, phricodes, cruciatus ventris intolerabilis, flatuum et stercoreis retentio, aut dysenteria.

## LVIII. HEPATITIS.

Jecinoris inflammatio; febris continua hypochondrii dextri dolor tensivus, tussis sicca, icterus, interdum vomitio bilis et per alvum dejectio.

## LIX. S P L E N I T I S.

Lienis inflammatio; febris continua, hypochondrii sinistri distentio atque tumor, dolor pulsans, molestus dexter decubitus.

## LX. M E S E N T E R I T I S.

Mesenterii inflammatio; febris varia occulta et lenta phricodes aut quotidiana continua, dolor colicae similis, egestionibus chylofae et ichorosae, nullo doloris sensu defluentes.

## LXI. O M E N T I T I S.

Omenti inflammatio; febris continua cum dolore et tumore in regione epigastrica et hypogastrica.

## LXII. P E R I T O N I T I S.

Peritonaei inflammatio; febris assidua, tumor ventris, et dolor punctorius.

## LXIII. M Y O C O L I T I S.

Musculorum abdominalium inflammatio; symptomata ut in peritonite.

## LXIV. P A N C R E A T I C A.

Pancreatis inflammatio. Notae deficiunt.

## LXV. NEPHRITIS.

Renis inflammatio; febris acuta, dolor ardens in regione renis, urina pauca, flammæa, vel nulla, stupor cruris vicini, dolor testis vicini, ructus, vomitio.

## LXVI. CYSTITIS.

Vesicæ urinariæ inflammatio; febris levior, hypogastrii dolor ardens, pressorius, frequens meiendi stimulus, ischuria, tenesmus.

## LXVII. HYSTERITIS.

Uteri inflammatio; febris continua, delirium, tumor hypogastrii inflammatorius, dolor in lumbis et inguine.

## LXVIII. ERYSIPELACEA.

Ephemera, erysipelatis expulsionem efficiens.

## LXIX. PODAGRICA.

Continua, synochos, cum dolentissimo rubore in pede.

## LXX. PANARITIA.

Continua, panaritii gravioris comes.



LXXI. CYSSOTIS.

Ani inflammatio, dolor, tenesmus.

III. SYMPTOMATICÆ.

LXXII. APOPLECTICA.

Continua apoplexiae superveniens.

LXXIII. CATARRHALIS.

Vespertina, catarrhis focia.

LXXIV. RHEUMATICA.

Quotidiana continua rheumatismo juncta,  
multus fudor, interdum pustulae purulenta-  
tae.

LXXV. HÆMORRHOIDALIS.

Ephemera, dolor spinæ, [haemorrhoides, aut  
saltem varices dolentes circa quartum di-  
em erumpentes, quo febris finitur.

LXXVI. LACTEA.

Ephemera, aliquot diebus a partu incidens.

LXXVII. VULNERARIA.

Graviori vulnere superveniens.

LXXVIII. SUPPURATORIA.

Partium internarum inflammationibus, dum



in suppurationes transeunt, superveniens,  
continua.

LXXIX. L E N T A.

Febricula quotidiana in morbo longo.

LXXX. H E C T I C A.

Quotidiana continua vehementior in morbo  
longo, cum sudore colliquativa et phthisi.

## II. PROFUVIA.

## I. HÆMORRHAGIÆ.

## LXXXI. HÆMORRHAGIA.

Sanguinis e vulnere profusio.

## LXXXII. EPISTAXIS.

Sanguinis e naribus profusio.

## LXXXIII. HÆMOPTOE.

Sanguinis ex ore et faucibus eruptio.

## LXXXIV. HÆMOPTYSIS.

Sanguinis e pulmonibus aut trachea rejectio  
per tussim.

## LXXXV. STOMACACE.

Gingivarum cruentatio.

## LXXXVI. ODONTIRRHOEA.

Sanguinis ex alveolo dentis evulsi eruptio.

## LXXXVII. OTORRHOEA.

Sanguinis ex aure effluxus.

## LXXXVIII. OPHTHALMORRHAGIA.

Sanguinis ex oculo ejusve cantho aut palpe-  
bris eruptio.

## LXXXIX. HÆMATEMESIS.

Vomitus cruentus; sanguinis e ventriculo per vomitum rejectio.

## XC. HEPATIRRHOEA.

Fluxus hepaticus; diarrhoea aquosa rubella instar loturae carniū recentium.

## XCI. CATARRHEXIS.

Sanguinis puri ex alvo profusio.

## XCII. HÆMATURIA.

Mictio e renibus cruenta, quae sanguine urinae exquisite permixto perfunditur, ut ea quasi dilutus et tenuis sit sanguis.

## XCIII. CYSTIRRHAGIA.

Mictio cruenta e vesica dolorifica, qua sanguis urinam non aequaliter perfundit ac in imo subsidens in grumos concrescit; ejus quoque portio aut grumus interdum citra urinam excidit. *Haemorrhoides vesicae* appellant.

## XCIV. STYMATOSIS.

Haemorrhagia penis sine urina, nulloque voluntatis arbitrio.

166 GENERA MORBORUM

XCV. HÆMATOPEDESIS.

Sudor sanguineus ; sanguinis tenuis e poris cutis eruptio.

XCVI. MENORRHAGIA.

Sanguinis inordinata et larga ex vulva profusio.

XCVII. ABORTIO.

Sanguinis ex utero gravido profluvium, cum foetu immaturo aut mola subsequente.

II. APOCENOSES.

XCVIII. CATARRHUS.

Tussis frequens, acris, cum raucitate.

XCIX. EPIPHORA.

Lachrymae involuntarium profluvium.

C. CORYZA.

Catarrhus narium cum feri tenuioris destillatione.

CI. OTOPUOSIS.

Puris ex aure effluxus ; catarrhus auris fordidus.

CII. OTOPLATOS.

Humiditatis olidae retro aurem excretio.

## CIII. PTYALISMUS.

Copiosa salivae profusio.

## CIV. VOMICA.

Subitanea, copiosa puris aut sanguinis nigri  
e pulmonibus rejectio per tussim.

## CV. DIARRHOEA.

Copiosum sinceriorum humorum ex alvo pro-  
fluvium, sine vehementi sensu doloris.

## CVI. PUORRHOEA.

Puris sinceri ex alvo excretio.

## CVII. DYSENTERIA.

Frequens, pauca, torminosa ac tenesimodes  
alvi dejectio.

## CVIII. LIENTERIA.

Laevitas intestinorum qua, quae per alvum  
descendunt, alimentis assumptis substantia  
et colore finitima.

## CIX. COELIACA.

Laevium aequalium et quasi chyli aut cre-  
moris specie dejectio.

## CX. CHOLERA.

Vomitibus biliosis multi alvique dejectiones,  
cum periadynia.

CXI. PITUITARIA.

Mera pituitae, loco stercoreis, excretio diuturna, cum contabescencia.

CXII. LEUCORRHOIS.

Pituitae sinceræ et cruentæ ex alvo excretio tenesmodes, periodica.

CXIII. ENEURESIS.

S. incontinentia urinae; mictio urinae involuntaria constans, sine acrimoniae et doloris sensu.

CXIV. DIURESIS.

Immodica urinae prorsus aqueae excretio, in morbo spastico, periodica.

CXV. DIABETES.

Immodicum urinae profluvium diuturnum, sub quo corpus contabescit.

CXVI. PUOTURIA.

Mictio purulenta.

CXVII. CHYLARIA.

Urinae mucosae, albae, paucae, et quasi verminosae, excretio. *Glus Linn.*

CXVIII. GONORRHOEA.

Invita seminis, liquoris, prostaticarum, ichoris,

citra venerem, citra libidinis infomnia, citraque colis tentiginem, profusio.

CXIX. LEUCORRHOEA.

Fluor albus ; nimia muci aut ichoris ex vulva profusio.

CXX. EXONEIROSIS.

Pollutio ; involuntaria, at jucunda feminis ex rigido cole profusio.

CXXI. HYDROPEDESIS.

Sudor immodicus.

CXXII. GALACTIA.

Laëtis ex mammis stillicidium.

CXXIII. HYPERCATHARSIS.

Immodica purgatio ex operatione violentioris medicamenti colliquantis, urentis, stimulantis.

CXXIV. ECPHYSE.

Flatuum ex urethra aut uteri vagina eruptio.

CXXV. DYSODIA.

Exhalatio foetida ex toto corpore aut ejus parte.

## III. EPISCHESES.

## CXXVI. GRAVEDO.

Catarrhus narium impeditus cum carebaria,  
voce haud bene sonora, spiritu nonnihil  
difficili, qui nec nisi hianti ori duci potest.

## CXXVII. FLATULENTIA.

Flatuum impedita supra infraque expulsio,  
cum intumescencia ventris.

## CXXVIII. OBSTIPATIO.

Stercoris excretio impedita.

## CXXIX. ISCHURIA.

Urinae suppressio.

## CXXX. AMENORRHOEA.

Menstrui sanguinis ex utero fluxus, ex toto  
vel ex parte cohibitus.

## CXXXI. DYSLOCHIA.

Lochiorum suppressio aut imminutio.

## CXXXII. DEUTERIA.

Secundinarum retentio.

## CXXXIII. AGALAXIS.

Lactis defectus.



## IV. D O L O R E S.

## CXXXIV. A N X I E T A S.

Molesta sensatio circa praecordia, quae praesentem rerum statum fastidit.

## CXXXV. B L E S T R I S M U S.

Incontinens corporis jactatio et inquietudo.

## CXXXVI. P R U R I T U S.

Dolorifica voluptas in cute, hominem ad scilpendum excitans.

## CXXXVII. C A T A P S Y X I S.

Sensus frigoris dolorificus in parte musculosa aut cutanea.

## CXXXVIII. R H E U M A T I S M U S.

Cutis et musculorum dolor. *Lumbago, ischias, glossagra, et pleurodyne Sauvag.* sunt species.

## CXXXIX. A R T H R I T I S.

Articulorum dolor; cujus species *chiragra* et *gonagra*.

## CXL. C E P H A L A L G I A.

Capitis dolor brevis.

CXLI.    C E P H A L Æ A.

Capitis dolor longus.

CXLII.    C L A V U S.

Capitis dolor in vertice cum sensu frigoris.

CXLIII.    H E M I C R A N I A.

Capitis dolor tensivus alterutrum ejus latus occupans.

CXLIV.    C A R E B A R I A.

Molestia capitis velut gravitas quaedam.

CXLV.    O D O N T A L G I A.

Dolor dentium.

CXLVI.    H Æ M O D I A.

Dentium stupor cum dolore.

CXLVII.    O D A X I S M U S.

Gingivaram dolor infantilis in dentitione.

CXLVIII.    O T A L G I A.

Dolor auris internae et externae.

CXLIX.    A C A T A P O S I S.

De-glutitio difficilis.

CL.    C I O W I S.

Dolorifica uvulae crassities.

## CLI. HIMANTOSIS.

Ejusdem solito major longitudo et gracilitas.

## CLII. CARDIOGMUS.

Anxietas cordis dolorifica, cum sensu ponderis et pulsatione.

## CLIII. MASTODYNIA.

Mammarum dolor.

## CLIV. SODA.

Dolor urens calidus e ventriculo in fauces affurgens.

## CLV. PERIADYNIA.

Ventriculi dolor.

## CLVI. PNEUMATOSIS.

Dolorifica ventriculi a flatibus distentio.

## CLVII. CARDIALGIA.

Ventriculi dolor vehemens spasticus, cum nausea saepeque vomitu.

## CLVIII. ENCAUSIS.

Ardor in stomacho cum inextinguibili siti,

## CLIX. NAUSEA.

Inani vomendi desiderium.

## 174 GENERA MORBORUM

### CLX. COLICA.

Dolor spasticus intestinorum cum obstipatione, nausea, et vomitu.

### CLXI. EILEMA.

Dolor in intestino fixus velut clavi muro impacti.

### CLXII. ILEUS.

Colica acuta cum vomitu demum excrementorum.

### CLXIII. STRANGURIA.

Urinae densae rubrae mictio parca, frequens, ardore in urethra excepta.

### CLXIV. DYSURIA.

Urinae stillicidium dolorificum citra ardorem in urethra.

### CLXV. LITHIASIS.

Difficilis mictio a calculo in organis uropoeticis, cum arenulis in urina subsidentibus.

### CLXVI. TENESMUS.

Impetuosa, dolorifica desidendi cupiditas, qua nihil praeter pauca mucosa et cruenta egeritur.

## CLXVII. CLUNESIA.

Dolor in podice. *Proctica Sauvages.* et *Linn.*

## CLXVIII. CEDMA.

Dolor in partibus genitalibus. *Pudendagra Linn.*

## CLXIX. HYSTERALGIA.

Dolor ventris parturientium similis.

## CLXX. DYSMENORRHOEA.

Profluvium sanguinis uterini menstruum dolorificum.

## CLXXI. DYSTOCIA.

Partus laboriosus, difficilis.

## CLXXII. ATOCIA.

Partus difficillimus, qui sine arte prorsus absolvi non potest.

## CLXXIII. PRIAPISMUS.

Colis erectio dolorifica permanens, citra libidinis stimulum.

## CLXXIV. PSORIASIS.

Durities scroti cum intensa prurigine, et interdum quoque exulceratione.

CLXXV. PODAGRA.

Dolor rheumatico-arthriticus in pede acutus.

CLXXVI. OSTEOCOPUS.

Dolor in osse fixus.

CLXXVII. PSOPHOS.

Strepitus ossium.

CLXXVIII. VOLATICA.

Dolor per tractum majorum cutis vasorum  
oberrans.

CLXXIX. EPIPHLOGISMA.

Ardor alicujus partis velut a pruna obortus.

In aure dicitur *Pyrosis*.

## V. S P A S M I.

## CLXXX. T E T A N U S.

Totius corporis aut solius cervicis distentio rigida, dolorifica, acuta, qua flecti haud possit.

## CLXXXI. O P I S T H O T O N U S.

Eadem distentio, sed qua corpus in posteriora curvatur.

## CLXXXII. E P I S T H O T O N U S.

Eadem, sed qua corpus in anteriora curvatur.

## CLXXXIII. C A T O C H U S.

Tetanus cum privatione sensuum.

## CLXXXIV. T R E M O R.

Levior totius corporis aut membri singularis concussio, sine frigoris sensu.

## CLXXXV. F R I G U S.

Cum extremæ partes membrorum inalgescunt.

CLXXXVI. HORROR.

Totius corporis alior cum tremore.

CLXXXVII. RIGOR.

Idem et violentior cum trismo et fenfu frigidis in interioribus partibus.

CLXXXVIII. EPILEPSIA.

Agitatio convulſiva univerſalis, chronica, periodica, cum oppreſſione ſenſoriorum, exituque ſpumae ex ore.

CLXXXIX. ECLAMPSIA.

Epilepſia acuta.

CXC. HIERANOSOS.

Agitatio corporis vel artuum convulſiva, continua, chronica, cum integritate ſenſuum.

CXCI. CONVULSIO.

Agitatio corporis vel artuum violenta, periodica, cum integritate ſenſuum.

CXCII. RAPHANIA *Linn.*

Convulſio cum ſpaſtica articulorum contractione et dolore immani, periodica.

CXCIII. CHOREA.

Convulſio ſaltatoria aut procuſſiva. *Tarantismus* eſt ſpecies.



## CXCIV. CRAMPUS.

Digitorum manuum pedumque, aut crurum  
extensio vel contractio violenta, dolorifi-  
ca, brevis.

## CXCV. SCELOTYRBE.

Immanis continuaque crurum contractio et  
obrigescencia.

## CXCVI. ANGONE.

Faucium praefocatio acuta, sine inflammati-  
one. *Angina convulsiva et Suffocatio hy-*  
*sterica* ejus sunt species.

## CXCVII. GLOSSOCELE.

Linguae violenta, acuta, extrusio.

## CXCVIII. GLOSSOCOMA.

Linguae violenta, acuta, revulsio.

## CXCIX. HIPPOS.

Oculorum constans agitatio ; malum ab ortu  
contractum.

## CC. ILLOSIS.

Oculorum perversio acuta.

## CCI. CINCLESIS.

Palpebrarum nictitatio perpetua,

CCII. CATACLASIS.

Alterutrius oculi occlusio spastica, acuta.

CCIII. CILLOSIS.

Cilii superioris perpetuus tremor.

CCIV. STERNUTATIO.

Membranae narium agitatio convulsiva, impetuosam aëris inspirationem, similemque mox expulsionem per nares cum strepitu inducens.

CCV. TUSSIS.

Convulsiva et sonora aëris e pulmonibus expulsio.

CCVI. CLAMOR.

Vocis anxia exaltatio.

CCVII. TRISMUS.

Stridor dentium inter se collisorum.

CCVIII. CAPISTRUM, *f. Spasmus Maxillae inferioris.*

Immobilitas ejus, qua os arcte clauditur.

CCIX. SARDIASIS, *f. Spasmus Cynicus.*

Spasmus musculorum faciei et oris, quo in obliquum torquentur.

CCX. GELASMUS, *f. Rîsus Sardoniûs.*

Involuntarius rîsus, sub quo animus non gaudio, sed dolore atque iracundiâ plerumque effertur.

CCXI. INCUBUS.

Suffocatio in infomnio terrifico, respirationem offendens, vocemque intercipientis.

CCXII. SINGULTUS.

Inspiratio convulsiva subitanea velocissima, sonora recurrens.

CCXIII. PALPITATIO.

Cordis, visceris, musculi, tendinis, arteriaeve, temporaria agitatio.

CCXIV. VOMITUS.

Violenta contentorum in ventriculo per os rejectio.

CCXV. RUCTUS.

Violenta flatus ventriculi inclusi per os explosio.

CCXVI. RUMINATIO.

Cum cibus e ventriculo in os vicissim masti-

candus iterumque deglutiendus, citra voluntatem, impellitur.

CCXVII. OESOPHAGISMUS, *f. Spasmus Oesophagi.*

Ciborum deglutitorum in oesophago subsistentium remora dolorifica.

CCXVIII. HYPOCHONDRIASIS.

Anxietas praecordialis, cum spasmodicis ventriculi ac intestinorum, variisque congestionibus conjuncta, chronica.

CCXIX. HYSTERIA.

Eadem in mulieribus.

CCXX. PHLOGOSIS, *f. Aëstus volaticus.*

Subitus fugaxque aëstus cum rubore faciei.

CCXXI. DIGITIUM.

Primae phalangis digitorum invita et constans incurvatio.

## VI. A D Y N A M I Æ.

## CCXXII. L A S S I T U D O.

Ingrata et gravativa sensatio impotentiae ad motum.

## CCXXIII. A S T H E N I A.

Languor aut debilitas corporis.

## CCXXIV. T O R P O R.

Sensus motusque imminutus in parte carnea.

## CCXXV. A D Y N A M I A.

Impotentia, qua se aegri nullo modo movere aut in lecto erigere possunt.

## CCXXVI. P A R A L Y S I S.

Sensus motusve aut utriusque defectus in singulari parte externa.

## CCXXVII. P A R A P L E G I A.

Omnium partium sub collo, aut saltem medii corporis artuumque inferiorum paralysis.

## CCXXVIII.    H E M I P L E G I A.

Paralyſis alterutrius lateris.

## CCXXIX.    A P O P L E X I A.

Subita functionum animalium ceſſatio, cum ſtertore et magno pulſu.

CCXXX.    C A T A L E P S I S, *f. Catoche.*

Subita functionum animalium ceſſatio, in qua correptus vigilantis formam figuramque retinet, articuliſque eum ſitum, qui ipſis datur.

## CCXXXI.    C A R U S.

Veternus ſopor, liberam reſpirationem ſine ſtertore conſervans, ex quo aegri vix excitantur.

CCXXXII.    C O M A, *f. Cataphora.*

Sopor in quo aegri vellicati evigilant, et mox in ipſum relabuntur.

## CCXXXIII.    S O M N O L E N T I A.

Inclinatio in ſomnum juſto major.

## CCXXXIV.    H Y P O P H A S I S.

Albi oculorum inter dormiendum ſubapparitio.

## CCXXXV. PTOSIS.

Impotentia attollendi palpebram superiorem.

## CCXXXVI. AMBLYOPIA.

Visus imbecillitas integro oculo.

## CCXXXVII. MYDRIASIS.

Pupillae dilatatio, quae visioni nocet.

## CCXXXVIII. AMAUROSIS.

Coecitas sine sensibili oculorum labe, praeter mydriasin.

## CCXXXIX. CATARACTA.

Coecitas cum obscurata lente, retro pupillam conspicua.

## CCXL. SYNIZESIS.

Coecitas cum pupillae coalitione.

## CCXLI. GLAUCOMA.

Coecitas turbatis humoribus et oculo flaccido.

## CCXLII. ACHLYS.

Corneae obscuritas, visum inminuens aut tollens.

## CCXLIII. NYCTALOPIA.

Visus noctu saltem contingens.

CCXLIV. HEMERALOPIA.

Vifus noctu abolitus.

CCXLV. HEMALOPIA.

Vifus dimidiatus.

CCXLVI. DYSICOIA.

Imbecillitas auditus.

CCXLVII. SURDITAS.

Auditus abolitus.

CCXLVIII. ANOSMIA.

Odoratus abolitus.

CCXLIX. APOGEUSIS.

Gustus abolitus.

CCL. ASAPHIA.

Vocis obfcuritas.

CCLI. CLANGOR.

Vox acuta cum ftridore.

CCLII. RAUCITAS.

Vox afpera et obfcura, quae vix nifi a prope  
adftantibus exaudiri poteft.

CCLIII. APHONIA.

Vocis privatio.



## CCLIV. LEPTOPHONIA.

Vitium vocis nimium gracilis.

## CCLV. OXYPHONIA.

Vox acuta, qualis edi solet cum ejulatu et planctu.

## CCLVI. RHENOPHONIA.

Vox nasalis, quae ex naribus haud simul editur.

## CCLVII. MUTITAS.

Loquellae privatio.

CCLVIII. TRAULOTIS, *Blaefitas*,

Vitiosa literarum f et r pronuntiatio.

CCLIX. PSELLOTIS, *Balbuties*.

Cum inter pronunciandum aut litera aut syllaba aufertur et eliditur.

## CCLX. ISCHNOPHONIA.

Vitium pronuntiationis, quo syllaba syllabae cito copulari non potest.

## CCLXI. BATTARISMUS.

Vitium pronuntiationis, quo sermo praecipitatur, unaque syllaba aliquoties cum celebritate repetitur.

## CCLXII. SUSPIRIUM.

Inspiratio lenta, profunda, gemebunda.

## CCLXIII. OSCITATIO.

Inspiratio tarda, profunda, aperto ore.

## CCLXIV. PANDICULATIO.

Oscitatio cum artuum extensione.

## CCLXV. APNOEA.

Respiratio adeo rara et parva, ut plane spiritus pervisse videatur.

## CCLXVI. MACROPNOEA.

Respiratio per longa intervalla contingens.

## CCLXVII. DYSPNOEA.

Respirandi difficultas continua, levior.

## CCLXVIII. ASTHMA.

Respiratio difficilis periodica, chronica, cum sensu angustiae in faucibus.

## CCLXIX. ORTHOPNOEA.

Respiratio suffocatoria acuta, non nisi erecto cervice peragenda.

CCLXX. PNIGMA *Catarrhus suffocativus.*

Difficillima respiratio, cum subitanea sensuum

motusque interceptione, stertore, pulsuque intermittente.

CCLXXI. RENCHUS, f. *Stertor*.

Sonus ex naribus editus.

CCLXXII. RHOCHMOS, f. *Ronchus*.

Sonus stertorosus intra fauces.

CCLXXIII. LIPOTHYMIA.

Subita sensus motusque interceptio, cum sudore frigido, tinnitu aurium, pulsu ac respiratione debili.

CCLXXIV. SYNCOPÉ.

Eadem gravior, nullo pulsu, nulla respiratione perceptibili, abolitoque omni sensu, et extincto calore.

CCLXXV. ASPHYXIA.

Abolitio pulsus.

CCLXXVI. APEPSIA.

Concoctionis ciborum in ventriculo privatio.

CCLXXVII. DYSPLEPSIA.

Tarda difficilisque concoctio.

CCLXXVIII. DIAPHTHORA.

Ciborum corruptio in ventriculo.

CCLXXIX. ANOREXIA.

Inappetentia sine fastidio ciborum.

CCLXXX. ANATROPE.

Inappetentia nauseabunda.

CCLXXXI. ADIPSIA.

Sitis defectus.

CCLXXXII. ACYISIS.

Sterilitas muliebris ; conceptionis defectus.

CCLXXXIII. AGNESIA.

Rei venereae impotentia in viro ; libidinis defectus.

CCLXXXIV. ANODYNIA.

Doloris defectus.

## VII. HYPERÆSTHISES.

## CCLXXXV. ANTIPATHIA.

Certarum rerum visu, olfactu, aut gustu percipiendarum, talis averfatio, ut ex earundem perceptione gravia symptomata inducantur.

## CCLXXXVI. AGRYPNIA.

Somni defectus.

## CCLXXXVII. PHANTASMA.

Perceptio corporum ante oculos obversantium, quae non adfunt.

## CCLXXXVIII. CALIGO.

Qua subito visui omnia nigra se repraesentant.

## CCLXXXIX. HÆMALOPIA.

Qua omnia rubra apparent.

## CCXC. MARMARYGE.

Fulgor ante oculos corruscans.

CCXCI. DYSOPIA.

Visus duplicatus.

CCXCII. SUSURRUS.

Soni non existentis perceptio.

CCXCIII. VERTIGO.

Imaginatio, qua omnia homini cum semet-  
ipso circumagi videntur.

CCXCIV. APOGEUSIA.

Sapor in ore depravatus.

CCXCV. POLYDIPSIA.

Continuum potus desiderium.

CCXCVI. BULIMUS.

Vehemens fames, cum lipothyinia.

CCXCVII. ADDEPHAGIA.

Voracitas.

CCXCVIII. CYNOREXIA.

Fames canina; addephagia cum vomitu sub-  
sequente.

CCXCIX. ALLOTRIOPHAGIA.

Rerum non esculentarum devoratio arbitra-  
ria.

## CCC. M A L A C I A.

Earundem anxia appetentia.

## CCCI. P I C A.

Certi cibi assumendi, aut rei olfaciendae vehementem desiderium.

## CCCII. B O M B U S.

Murmur ex flatibus, quod auribus percipitur.

## CCCIII. C E L S A.

Sensus flatus, vaporis, aut formicarum oberantium subter cute.

## VIII. CACHEXIÆ.

## CCCIV. CACHEXIA.

Corpus grave atque iners, colore pallido squallidum.

## CCCV. CHLOROSIS.

Cachexia in virginibus, colore ex pallido virescente.

## CCCVI. ICTERUS.

Cachexia cum flavo cutis colore, urina obscure rubra, tingente immixta lintheamina colore croceo.

## CCCVII. MELANCHLORUS.

Cachexia cum subnigro cutis colore, urina de nativo statu haud decedente.

## CCCVIII. ATROPHIA.

Extenuatio corporis, aut partis ejus, sine febre lenta et hectica.

## CCCIX. TABES.

Extenuatio corporis cum febre lenta vel hectica, at sine dyspnoea et tussi.



## CCCX. P H T H I S I S.

Extenuatio corporis cum febre lenta vel hec-  
tica, dyspnoea, et tussi \*.

## CCCXI. H Y D R O T H O R A X.

Cachexia cum dyspnoea et effusione aquae  
intra pectus, strepitum concussione intus  
facientis.

## CCCXII. R A C H I T I S.

Atrophia infantum cum epiphygium protu-  
berantia.

## CCCXIII. A N A S A R C A.

Totius corporis intumescentia, aquosa, mollis,  
digiti impressi vestigium aliquamdiu reti-  
nens, cum pallore cutis.

## CCCXIV. A S C I T E S.

Tumor abdominis, scroti, et crurum aquo-  
sus, cum atrophia superiorum partium.  
Abdomen impulsu sonum collectae permo-  
taeque intus aquae praebet.

\* In *atrophia* sola pinguedo absumitur, nec aequè re-  
stituitur; in *tabe* et *pthisi* caro simul minuitur.

## CCCXV. HYDROCYSTIS.

Hydrops faccatus pleurae, peritonaei, aut  
viceris abdominalis.

## CCCXVI. TYMPANITES.

Tumor abdominis renitens, pulsatione soni-  
tum edens, cum obstipatione et atrophia.

## CCCXVII. HYSTEROPHYSE.

Tumor hypogastrii ab utero flatu distento.

## CCCXVIII. SCORBUTUS.

Cachexia cum lassitudine, maculis artuum li-  
vidis, stomacace, ulceribus.

## CCCXIX. SIPHYLIS.

Cachexia contagiosa ex contagio venereo,  
cum tumoribus ossium et ulceribus fauci-  
um partiumque obscoenarum, praegressis  
plerumque bubonibus aut gonorrhoea.

CCCXX. LEPROA *Graecorum, f. Psora.*

Pertinacissima scabies totius corporis vel par-  
tis, sicca, dura, aspera, serpentibus pustu-  
lis furfuracea.

CCCXXI. ELEPHANTIASIS, f. *Lepra Arabum.*

Mutatio cutis in tumores lividos, dueros, faciem foetidam crustosam emanantes.

CCCXXII. ELEPHANTIA *Arabum.*

Eadem duntaxat in pede valde tumido et duro.

CCCXXIII. PLICA, f. *Rhopalosis.*

Vitium capillorum capitis aut pubis, quo ab humore glutinoso ita in cirrhos contorquentur, ut explicari nullo modo possint.

CCCXXIV. PHTHIRIASIS.

Morbus pedicularis, quo pediculi variis in corporis partibus copiose emergunt.

CCCXXV. PHYSCONIA.

Intumescencia abdominis longa, a magnitudine habituve visceris mutato.

CCCXXVI. PARACYISIS.

Graviditas a natura abhorrens retardatione aut alieno situ foetus extra uterum.

## CCCXXVII. GANGRÆNA.

Inflammatae partis livor et mortificatio foetida, cum pustulis ichorosis ; sensus doloris hebes.

## CCCXXVIII. SPHACELUS.

Perfecta mortificatio, qua pars sensum motum et innatum calorem tota amisit, fitque prorsus nigra, mollis, putris, et cada-verosa.

## IX. P A R A N O I Æ.

## CCCXXIX. A T H Y M I A.

Animi abjectio, consternatio, tristitia, desperatio.

CCCXXX. D E L I R I U M, *Paraphrosyne*.

Mentis alienatio in febre haud constans, nec furibunda. *Carpologia* ejus est species.

## CCCXXXI. M A N I A.

Infania longa, ridicula aut furibunda. *Furorem uterinum* et *satyriasin* pro speciebus habeo.

## CCCXXXII. M E L A N C H O L I A.

Infania longa cum moestitia ac timore. *Nostalgia* ejus species est.

## CCCXXXIII. E C S T A S I S.

Infania, quae brevi tempore durat.

## CCCXXXIV. E C P L E X I S.

Excessus mentis, qui ex repentina aliqua perturbatione ab externa causa affertur.

## CCCXXXV. E N T H U S I A S M U S.

Est veluti cum quidam in sacris faciendis

mente capiuntur, si qua viderint audiverintve.

CCCXXXVI. STUPIDITAS, *Morosis, Fatuitas.*

Mentis imminuta et infirmata functio, seu quaedam ignavia, citra delirium et soporem.

CCCXXXVII. A M E N T I A, *Anoia.*

Imaginationis vel mentis occasus atque privatio, qua jam ab ipso ortu affecti vix mentis inopia loqui discunt.

CCCXXXVIII. O B L I V I O.

Memoriae privatio.

CCCXXXIX. S O M N I U M.

Visum, quod in somno occurrit, tanquam verum sit existimatum. *Pavor* ejus est species.

CCCXL. H Y P N O B A T A S I S.

Somnium in quo homo assurgit, ambulat, et diversa vigilantium opera exercet.

## X. V I T I A.

I. *INFLAMMATIONES.*

## CCCXLI. O P H T H A L M I A.

Inflammatiō albi oculorum.

## CCCXLII. B L E P H A R O T I S.

Inflammatiō palpebrarum.

## CCCXLIII. E R Y S I P E L A S.

Inflammatiō lata cutis, quae splendet et leviter ac aequaliter tumet.

## CCCXLIV. H I E R O P Y R.

Erysipelas cum eminentibus ardentibus pustulis. *Zoster* dicitur, si abdominis cutem occupat.

## CCCXLV. P A R O N Y C H I A.

Inflammatiō dolorifica in summitate digitorum.

## CCCXLVI. O N Y C H I A.

Inflammatiō digiti lateralis ab ungue profundius in cutem demerso.

## CCCXLVII. E N C A U S I S.

Inflammatiō cutis ab uſione.

## CCCXLVIII. P H I M O S I S.

Inflammatiō, aut oedematodes tumor praeputii, quo glans nudari non poteſt.

## CCCXLIX. P A R A P H I M O S I S.

Inflammatiō praeputii, retro glandem adducti, ut eam tegere non poſſit.

## CCCL. P E R N I O.

Cutis rubor ardens, pruriens, a frigore; in exulcerationem tendens.

## II. T U M O R E S.

## CCCLI. P H L E G M O N E.

Tumor dolens renitens inflammatorius cum rubore, ovi ſaltem gallinacei magnitudine.

## CCCLII. F U R U N C U L U S.

Tuberculum acutum apoſtematodes, ovum columbinum magnitudine non excedens.

## CCCLIII. A N T H R A X.

Quaſi malignus furunculus, qui partem mox



adurit, pustulas circum se ardentissimas ci-  
et, tandem crusta nigra vel cinerea obduci-  
tur, et corruptae carnis lobum excutit,  
qua excidente ulcus cavum fordidumque  
manet.

CCCLIV.      A B S C E S S U S.

Collectae in inflammato loco materiae in  
pus aut in alienam substantiam conversio.

CCCLV.      O N Y X.

Abcessus inter corneae laminas.

CCCLVI.      H I P P O P Y O N.

Abcessus intra oculum.

CCCLVII.      P H Y G E T H L O N.

Phlegmone in glandulis emergens.

CCCLVIII.      E M P Y E M A.

Abcessus in thorace, latus aut partem ejus  
in tumorem attollens, cum febre hectica,  
praegressa pleuritide vel peripneumonia.

CCCLIX.      P H Y M A.

Tumor glandularum, simplici phlegmone at-  
que phygethlo minor, planior, minusque  
rubens ac dolens.

## CCCLX. ECTHYMATA.

Tubercula ex cute subito erumpentia, modo colorem cutis non excedentia, modo rubra fugacissima.

## CCCLXI. URTICARIA.

Tubercula puncturis urticarum similia, rubra, prurientia, fugacia, acuta.

## CCCLXII. PARULIS.

Tuberculum dolens inflammatum in gingivis.

## CCCLXIII. EPULIS.

Tuberculum in gingivis sine inflammatione.

## CCCLXIV. ANCHYLOPS.

Tumor durus inflammatorius apofematodes in cantho oculi interno.

## CCCLXV. PARAGLOSSA.

Lingua tumida.

## CCCLXVI. CHILON.

Labium tumidum et inflammatum.

## CCCLXVII. SCROFULA.

Tumor glandularum colli et mesenterii indolens obduratus.

## CCCLXVIII. B U B O N.

Tumor glandulae inguinalis.

## CCCLXIX. B R O N C H O C E L E.

Tumor glandulae thyreoideae.

## CCCLXX. P A R O T I S.

Tumor glandulae ejusdem nominis.

## CCCLXXI. G O N G R O N A.

Collum tumidum.

## CCCLXXII. S P A R G A N O S I S.

Tumor mammarum in lactantibus a lactis  
copia.

## CCCLXXIII. C O I L I M A.

Intumescencia abdominis subita, flatulenta.

## CCCLXXIV. S C I R R H U S.

Tumor durus, indolens, concolor, renitens.

## CCCLXXV. C A N C E R.

Tumor durus, dolore lancinante gravis, inae-  
qualis, livescens aut nigricans.

## CCCLXXVI. S A R C O M A.

Carnis incrementum tuberculi tumorisve  
specie.

## CCCLXXVII.    P O L Y P U S.

Sarcoma intra nares, praelongum, pluribus  
appendicibus adherens.

## CCCLXXVIII.    C O N D Y L O M A.

Tuberculum durum, pene indolens in ani  
margine. Ejus species *Ficus* et *Thymus* a  
figura ita dictae.

## CCCLXXIX.    G A N G L I O N.

Tumor durus, concolor, indolens tendini in-  
fidens.

CCCLXXX.    R A N U L A, *Batrachus*.

Tumor ad frenulum linguae folliculosus, ma-  
teriam spissam aut tofaceam complexus.

## CCCLXXXI.    T E R M I N T H U S.

Tuberculum rotundum, nigrum, praesertim  
in tibiis enascens, humorum glutinosum  
et subrubrum exulceratione emittens.

## CCCLXXXII.    O E D E M A.

Tumor frigidus, laxus, mollis, indolens,  
circumscriptus aut diffusus, pressu digito  
cedens.

## CCCLXXXIII. ENCEPHALOCÉLĒ.

Cerebrum per hiatum calvae extrorsum emiens.

## CCCLXXXIV. HYDROCEPHALUM.

Capitis monstrosus tumor a collecta aqua in cute aut subter calvaria.

## CCCLXXXV. HYDROPTHALMIA

Totius oculi tumor cum aliquo dolore, adeo ut is palpebris operiri non possit.

CCCLXXXVI. SPINA *bifida*.

Tumor aquosus exiguus, in nucha aut inferiore spinæ loco, posterioribus vertebrarum dehiscentibus processibus emergens.

## CCCLXXXVII. HYDROMPHALUS.

Tumor umbilici ab humore in eodem consistente.

## CCCLXXXVIII. HYDROCELE.

Tumor tunicarum, quibus testis comprehenditur, aquosus.

CCCLXXXIX. HYDROPS. *Scroti*.

Tumor tunicae scroti cellulosa aquosus.

## CCCXC. S T E A T I T E S.

Abdominis intumescencia pinguedinosa, graviditatem mentiens.

## CCCXCI. P N E U M A T O S I S.

Totius corporis intumescencia a flatu.

## CCCXCII. E M P H Y S E M A.

Tumor mollis, frigidus, in singulari parte ab aëre cellulosam cutis habitum ingresso formatus.

## CCCXCIII. H Y S T E R O P T O S I S.

Uteri vel vaginae procidentia, protuberantiam intra aut extra vaginam faciens.

## CCCXCIV. C Y S T O P T O S I S.

Membranae vesicae urinariae interioris protuberantia extra urethram.

## CCCXCV. A R C H O P T O M A.

Intestini recti procidentia.

## CCCXCVI. B U B O N O C E L E.

Tumor in inguine ex annulo musculi obliqui ab ingresso intestino omentove, vel utroque conjunctim.

## CCCXCVII. OSCHEOCELE.

Idem in scroto tumor.

## CCCXCVIII. OMPHALOCELE.

Idem ex umbilico.

## CCCXCIX. MEROCELE.

Tumor ab intestino infra ligamentum Poupartii elapso.

CCCC. ENTEROCELE, *Ovularis*.

Hernia intestinalis foraminis ovalis, in superiori et interna femoris parte prope perinaeum.

## CCCCI. ISCHIATOCELE.

Tumor ab intestino per hiatus intra ligamenta sacro-ischiatica elapso.

## CCCCII. ELYTROCELE.

Hernia in vagina uteri eminens.

## CCCCIII. HYPOGASTROCELE.

Hernia intestini ventralis.

## CCCCIV. CYSTOCELE.

Prominentia vesicae per musculi obliqui anulum, sub qua urina nonnisi pressa exterius tumore redditur.

## CCCCV. CYRTOMA.

Tumor particularis abdominis a flatibus.

## CCCCVI. HYDRENTEROCELE.

Tumor ex hernioso et hydropico compositus.

## CCCCVII. VARIX.

Tumor venae mollis, lividus, aut niger.

## CCCCVIII. ANEURISMA.

Tumor arteriae mollis et pulsans.

## CCCCIX. CIRSOCELE.

Tumor arteriarum venarumque spermaticarum inaequalis, renitens.

## CCCCX. GASTROCELE.

Hernia ventriculi ; tumor inter cartilaginem xiphoiden et umbilicum inque ipso illo, post pastum auctus, dolore stomachi, vomitionibusque stipatus.

## CCCCXI. HEPATOCELE.

Hernia ab hepate facta ventralis, vel umbilicalis congenita.

## CCCCXII. SPLENOCELE.

Hernia a liene, ventralis aut inguinalis.



## CCCCXIII. HYSTEROCELE.

Hernia uteri ventralis vel inguinalis.

## CCCCXIV. HYGROCIROCELE.

Aquosus et varicosus tumor vasorum testis.

## CCCCXV. SARCOCELE.

Testis sarcoma aut scirrhus.

## CCCCXVI. PHYSOCELE.

Tumor a flatu herniam mentiens.

## CCCCXVII. EXOSTOSIS.

Tumor in ossē circumscriptus.

## CCCCXVIII. HYPEROSTOSIS.

Tumor totius ossis.

## CCCCXIX. PÆDARTHROCAE.

Tumor ossis, dolore gravis, in exulcerationem tendens.

## CCCCXX. ENCYSTIS.

Tumor frigidus, indolens, membrana inclusus, et materiam spissam complexus. *Atheroma, Steatoma, Testudo, talpa, Meliceris* ejus species.

## CCCCXXI. STAPHYLOMA.

Protuberantia corneae obscuratae.

## CCCCXXII. STAPHYLOSIS.

Procidentia uveae ex cornea disrupta.

## CCCCXXIII. FUNGUS.

Tumor ad articulum mollis, oedematodes.

## CCCCXXIV. TOFUS.

Tuberculum ad articulum, tofaceam materiam complexum, in morbo articulari.

## CCCCXXV. FLEMEN.

Tumor pedis circa talos.

## III. EXTUBERANTIAE\*.

## CCCCXXVI. VERRUCA.

Tuberculum supra cutim durum, asperum, sessile vel penfile. Unde species *Aerohordon*, *Acrothymium*, *Myrmaecium*.

## CCCCXXVII. PORRUS.

Verruca in obscoenis mollis, madida, tactu dolens.

\* Extuberantiae supra cutim eminent; tumores intra aut subter eam existunt.

## CCCCXXVIII. C L A V U S.

Tuberculum album, rotundum, callosum, in digitis plantisque pedum.

CCCCXXIX. C A L L U S, *f. Tylloma.*

1. Obdurata summa cutis ex labore in palmis aut pedum plantis. 2. Tunica pallida, dura, quae sine sensu est, in ulcere.

## CCCCXXX. E N C A N T H I S.

Intumescencia carunculae lacrymalis.

## CCCCXXXI. P L A D A R O T I S.

Tuberculum fungosum, molle in interiori palpebra.

## CCCCXXXII. P I N N U L A.

Excrefcentia corneae tunicae inhaerescens.

## CCCCXXXIII. P T E R Y G I U M.

Excrefcentia, membranulae forma, rubra supra album oculi.

CCCCXXXIV. H O R D E O L U M, *Crithe.*

Tuberculum calidum in abscessum fere deficiens, quod e palpebrae margine atque e cilio prorumpit.

## 214 G E N E R A M O R B O R U M

### CCCCXXXV. G R A N D O.

Tuberculum durum, palpebrae fere superiori  
innascens.

### CCCCXXXVI. V A R U S, *Ionthos*,

Tuberculum in facie durum, exiguum, ru-  
brum, fere callosum, dispersum, multiplex.

### CCCCXXXVII. G U T T A, *Rosacea*.

Varus quasi confluens, cum rubedine aspera  
maculosa.

### CCCCXXXVIII. E P H E L I S.

Asperitas quaedam et durities mali coloris  
in facie.

### CCCCXXXIX. E S O C H E.

Tuberculum intus in ano latens.

### CCCCXL. E X O C H E.

Idem foris eminens

## IV. P U S T U L Æ et P A P U L Æ.

### CCCCXLI. E P I N Y C T I S.

Pustula ardens alba, subrubra aut sublivida,  
sanie subcruenta repleta, ciceris aut fabae

magnitudine, circa quam vehemens inflammatio et dolor.

CCCCXLII. P H L Y C T Æ N A.

Pustula subflavo humore distenta, lucida, illi similis, quae ab ambustione erumpit, non manifesto dolens. In capite *Psydracium* vocatur.

CCCCXLIII. H E R P E S, *Serpigo*.

Papula ardens, cutem serpentibus minimis pustulis erodens. *Purpura scorbutica*, quam vocant, verissima *serpigo* est.

CCCCXLIV. S C A B I E S.

Durities cutis rubicundior, ex qua pustulae oriuntur, quaedam humidiores, quaedam sicciore, faniem rodentem, exulcerantem, crustas formantem, et contagiosam complexae.

CCCCXLV. A Q U U L A.

Pustula palpebrarum, vel pinguis quaedam materia, cuti earundem substrata.

CCCCXLVI. H Y D R O A, *Boa, Sudamina*.

Pustulae milii magnitudine, aquosae sine ru-

bore et sine ullo dolore, ex fudoribus repente sparsim toto corpore emergentes.

## CCCCXLVII.    V A R I O L A.

Pustula purulenta ex macula rubra in syncho emergens, contagiosa.

## CCCCXLVIII.    V A R I C E L L A.

Pustula similis acuta, ex macula rubra in ephemera erumpens, non contagiosa.

## CCCCXLIX.    P U R P U R A.

Pustula pruriens, seminis milii magnitudine, rubra vel alba, lucida, acuta.

CCCCL.    E N C A U M A, *Phlyzacion.*

Pustula ab uestione contracta.

## V.    M A C U L Æ.

## CCCCLI.    E C C H Y M O M A.

Macula a sanguine per cutem quasi effuso livida vel nigra. Illa *Pelioma*, haec *Melasma* speciatim dicitur.

## CCCCLII.    P E T E C H I Æ.

Maculae pulicum morsui similes, magnitudi-

ne et colore, interdum tamen etiam lividae in febre acuta.

## CCCCLIII. MORBILLI.

Maculae acutae, rubellae, latefcentes, et plerumque confluentes, inque squamas defluentes, in febre acuta.

## CCCCLIV. SCARLATÆ.

Maculae latiores ac rubicundiores quam morbilli, subflavis nodulis ornatae, in febre acuta.

## CCCCLV. LENTIGO.

Macula lentis magnitudine fusca, multiplex, in facie potissimum et in manibus emergens.

## CCCCLVI. URTICARIA.

Maculae subtumidae, rubentes, prurientes, fugaces.

## CCCCLVII. STIGMA.

Macula coloris coccinei.

## CCCCLVIII. VIBEX.

Linea coccinea, qualis relinquitur e flagellis.

## CCCCLIX. VITILIGO.

Macula foeda, fere subaspera, dispersa, serpens, alba (*Alphos*) aut nigra (*Melas*).

## CCCCLX. LEUCE.

*Alphos* in qua albi et lanugini similes pili.

## CCCCLXI. CYASMA.

Macula fusca in fronte, labiis, aut manibus gravidarum.

CCCCLXII. LICHEN, *Impetigo*.

Macula subrubra aspera, dura, sicca, cum ingenti pruriginē.

## CCCCLXIII. SELINE.

Macula alba in ungue.

## CCCCLXIV. NEBULA.

Macula alba in cornea.

## VI. DISSOLUTIONES.

I. *Apospasmata*

## CCCCLXV. VULNUS.

Solutio partis solidae, mollis a causa mechanica, cum effluxu sanguinis.



## CCCCLXVI. R U P T U R A.

Solutio partis solidae, mollis, internae, ab interna causa, cum haemorrhagia.

## CCCCLXVII. R H A G A S.

Solutio cutis linearis arida.

## CCCCLXVIII. F R A C T U R A.

Dissolutio ossis transversa aut obliqua.

## CCCCLXIX. F I S S U R A.

Eadem recta, et ut ligni in longitudinem.

## CCCCLXX. P L I C A T I O.

Ossium longorum concussio et contorsio citra fracturam.

## CCCCLXXI. T H L A S I S.

Calvaria depressa citra fracturam.

## CCCCLXXII. L U X A T I O.

Dimotio ossis ex articulo suo perfecta.

## CCCCLXXIII. S U B L U X A T I O.

Cum os ab osse paulum recedit, eaque inter se dehiscunt.

## CCCCLXXIV. D I A C H A L A S I S.

Suturae dimotio.

CCCCLXXV. ATTRITIO, *Ecthlima*.

Diffolutio cuticulae et cutis a compressione.

CCCCLXXVI. PORRIGO, *Pityriasis*.

Resolutio cutis in tenues squamulas, deciduas.

CCCCLXXVII. APOSYRMA.

Cutis abrasio, dilaceratio.

CCCCLXXVIII. ANAPLEUSIS.

Offis corrupti squamula.

CCCCLXXIX. SPASMA.

Species solutionis continui tendinum, ligamentorum, citra rupturam, membri mobilitatem dolorificam inducens.

CCCCLXXX. CONTUSIO.

Cutis musculorumque conquassatio dolorifica, plerumque cum ecchymomate, at citra vulnus aut substantiae manifestam deperditionem.

CCCCLXXXI. DIABROSIS.

Erosio cutis a re acri et mordaci interna vel externa,

## CCCCLXXXII. AGOMPHIASIS.

Dentium vacillatio.

## CCCCLXXXIII. ESCHARA.

Cutis pars dehiscens a viva carne, et in crustam emortuam mutata.

## CCCCLXXXIV. PIPTONYCHIA.

Unguis destructio et casus.

2. *Exulcerationes.*

## CCCCLXXXV. CACOETHES.

Ulcus fere magnum oris tuméntibus atque callofis.

## CCCCLXXXVI. THERIOMA.

Ulcus in quo caro computrescit, atque molli et cadaverosa reddita tetrum odorem exhalat.

## CCCCLXXXVII. CARCINOMA.

Cancri conversio in ulcus, quod nigrum est, putridum, deterrimi odoris, et vehementer dolet.

## CCCCLXXXVIII. P H A G E D Æ N A.

Ulcus serpens, sed solam cutem rodens ac depascens.

## CCCCLXXXIX. N O M A.

Ulcus quod non afflictam tantum partem, sed et vicinas exedit et absumit.

## CCCCC.            S Y C O S I S.

Ulcus, in quo multa caro excrescit.

## CCCCXCI.        F I S T U L A.

Ulcus altum, angustum, callosum.

## CCCCXCII.        S I N U S.

Ulcus altum, quod ab angusto ore orsum intus curvatum ampliatur, sine callo.

## CCCCXCIII.      C A R I E S.

Ulcus in osse cum substantiae et periostei corruptione, qua os spongiosum et friabile redditur.

## CCCCXCIV.        A C H O R E S.

Ulcuscula capitis manantia, plurimis ac minimis foraminulis, unde tenuis et glutinosa sanies exit, cutem perforantia,

CCCCXCV. CRUSTA *lactea*.

Achores in facie.

CCCCXCVI. FAVUS, *Cerion*.

Ulcus multis foraminibus, sed majoribus ac in achore, pervium, ex quibus melli similis humor exit. Frequentius in capite, rarius in partibus musculosis, articulis, et plantis pedum, oritur.

## CCCCXCVII. TINEA.

Ulcus capitis, quod densissimam, durissimam aridissimamque crustam facit, serpens, pilis abbreviatis.

## CCCCXCVIII. ARGEMON.

Exulceratio in cornea.

## CCCCXCIX. ÆGILOPS.

Anchilops in ulcus conversum.

## D. OZÆNA.

Ulcus narium putridum, e quo graveolens mucus exstillat.

## DI. APHTHÆ.

Ulcera oris aut pudendorum, superficialia,  
mucosa.

## DII. INTERTRIGO.

Excoriatio cutis madens ac rubens, a fudoris  
vel urinae acrimonia.

## DIII. RHACOSIS.

Excoriatio scroti laxati.

## VII. CONCRETIONES.

## DIV. ANCYLOBLEPHARON.

Palpebrarum inter se conglutinatio.

## DV. SYNIZESIS.

Pupillae concretio.

## DVI. DACRYOMA.

Punctorum lacrymalium coalitus.

## DVII. ANCYLOGLOSSUM.

Linguae concretio cum partibus subjectis, lo-  
quelam, suctum, deglutitionemque impe-  
diens.

## DVIII.     A N C Y L O S I S.

Articulorum rigor, quo flexus eorundem aut extensio prohibetur.

## DIX.     C I C A T R I X.

Callus a conglutinato vulnere ulcerève relictus. *Leucoma* in cornea dicitur.

## DX.     D A C T Y L I O N.

Digitorum concretio.

E t

## XI. DEFORMITATES.

## DXI. PHOXOS.

Cui caput acuminatum et fastigiatum.

## DXII. GIBBER.

Protuberantia spinæ dorsalis, omoplatae, os-  
suumve thoracis. Ejus species *Cyphosis*,  
*Lordosis*, *Scoliosis*, et *Seisis*.

DXIII. CAPUT *obstipum*.

Incurvatio colli.

## DXIV. STRABISMUS.

Oculorum distortio et inaequalis motus.

## DXV. MYOPIASIS.

Qua propinqua cernimus, remota vel parum  
vel nihil omnino.

## DXVI. LAGOPHTHALMUS.

Vitium superioris palpebrae, si illa parum de-  
scendit, oculumque non claudit.

## DXVII. TRICHIASIS.

Obversio ciliorum ad oculum.



## DXVIII. ECTROPIUM.

Vitium palpebrae inferioris, quo parum sursum attollitur, sed hiat, aut extrorsum eversa est.

## DXIX. ENTROPIUM.

Palpebrae inferioris inversio introrsum.

## DXX. RHOEAS.

Defectus carunculae lacrymalis, epiphoram faciens.

## DXXI. RHYSSEMATTA.

Rugae et fordes, quae in senili facie cernuntur.

DXXII. LAGOCHEILOS, *Labium leporinum.*

Divisum semel vel bis labium.

## DXXIII. MALACOSTEON.

Ossium mollities.

## DXXIV. HIRSUTIES.

Praeternaturalis pilorum in parte generatio.

## DXXV. CANITIES.

Capillorum color albus ante legitimam aetatem.

## DXXVI. DISTRIX.

Exilitas pilorum, modum excedens.

## DXXVII. XIRASIA.

Lanuginosa pilorum superficies, quasi pulvere  
sint conspersi.

## DXXVIII. PHALACROTIS.

Pilorum casus, qui tabescentibus et ex morbo  
graviores convalescentibus evenit.

## DXXIX. ALOPECIA.

Pilorum defluvium, aream relinquens. *Ophi-*  
*asis* ejus species, item *Calvities* et *Pelada*.

## DXXX. MADAROSIS.

Ciliorum defluvium.

## DXXXI. PTILOSIS.

Eadem cum duritie callosa palpebrarum.

## DXXXII. RODATIO.

Ciliorum decurtatio.

## DXXXIII. PHALANGOSIS.

Ciliorum duplex vel triplex acies.

## DXXXIV. COLOBOMA.

Defectus particulæ in parte aliqua corporis.

## DXXXV. CERCOSIS.

Clitoris praelonga.

## DXXXVI. CHOLOSIS.

Claudicatio, quando crus vel longius vel brevius fit.

## DXXXVII. GRYPOSIS.

Unguium aduncatio.

## DXXXVIII. NÆVUS.

Tuberculum, maculave congenita.

## DXXXIX. MONSTROSITAS.

Deformitas multiplex congenita.

## DXL. POLYSARCIA.

Corpulentia excedens.

## DXLI. ISCHNOTIS.

Excessiva corporis gracilitas.

## DXLII. RHICNOSIS.

Cutis corrugatio cum extenuatione corporis.

## DXLIII. VARUS.

Cui crura introrsum versa.

## DXLIV.    V A L G U S.

Cui crura extrorsum distorta.

DXLV.    L E I O P O D E S,    *Plancus,*  
*Plautus.*

Cui pedum medium ab interiori parte non est cavum, sed planum.

## DXLVI.    A P E L L A.

Cui praeputium citra inflammationem ita contractum est, ut glandem non tegat.

## DXLVII.    H Y P O S P A D I Æ O S.

Cui glans non antice, sed inferne sub frenulo perforata.

## DXLVIII.    U R O R H O E A S.

Cui urina ex urethra in perinaeo exesa effluit.

## DXLIX.    A T R E T A:

Cujus anus aut naturalia occlusa.

## DL,    S A N I O D E S.

Cui thorax tabulae ritu est angustus,

## DLI.    C R I P S O R C H I S.

Cujus unus testis aut ambo absconditi.

## DLII. HERMAPHRODITUS.

Cui vitiosa naturalium conformatio, ita ut utriusque sexus adesse videantur.

## DLIII. DIONYSISCUS.

Cui prope tempora duae eminentiae osseae, quasi cornua, nascuntur.

## DLIV. ARTETISCUS.

Qui membri alicujus defectum patitur.

## DLV. NEFRENDIS.

Qui dentibus caret.

## DLVI. SPANOPOGON.

Qui raram habet barbam, et cui e mento piluli excidunt.

## DLVII. HYPERARTETISCUS.

Cui membrum aliquod superfluum.

## DLVIII. GALIANCON.

Cui brachium altero brevis.

## DLIX. GALBULUS.

Cui flavedo corporis congenita.

## DLX. MOLA.

Massa carnea, fibrosa, vasculosa, ex utero excreta. Ovum deforme.

Nec silentio prorsus transeunda sunt vitia quaedam occulta, quae non nisi in cadaverum sectione se offerunt; velut hydrops pericardii, concretiones viscerum, ossescentiae cartilaginum, membranarum, muscutorumque, varices venarum majorum, hydatides, polypi cordis et vasorum, positura viscerum perversa, bullae aëreae in venis et pulmonum superficie, aneurismata aortae, angustiae praeternaturales vasorum et ductuum, ipsorumque concretiones.

PARS QUARTA.

S Y S T E M A  
M O R B O R U M  
S Y M P T O M A T I C U M,

A U T O R E

LAR. JO. BAPT. MICH. SAGAR,

MED. DOCT, &c. &c.

Viennæ 1776.

G g





# CLAVIS CLASSIUM ET ORDINUM.

## CLASSIS I. VITIA.

Symptomata externa levidentia, palpabilia,  
absque notabili cachexia, pyrexia.

- ORDO I. MACULÆ.
- II. EFFLORESCENTIÆ.
- III. PHYMATA.
- IV. EXCRESCENTIÆ.
- V. CYSTIDES.
- VI. ECTOPIÆ.
- VII. DEFORMITATES.

## CL. II. PLAGÆ.

Continui solutiones, morbi proprie chirurgici per sæpe fat graves.

- O. I. SOLUTIONES recentes plerumque cruentae.
- II. SOLUTIONES artificiales recentes cruentae.
- III. SOLUTIONES incruentae.
- IV. SOLUTIONES anormales.

### CL. III. CACHEXIAE.

Coloris, figurae, molis, in corporis habitu  
fine notabili febre, depravatio.

- O. I. MACIES.
- II. INTUMESCENTIÆ.
- III. HYDROPE PARTIALES.
- IV. TUBERA.
- V. IMPETIGINES.
- VI. ICTERITIÆ.
- VII. CACHEXIÆ ANOMALÆ.

### CL. IV. DOLORES,

Sensationes molestae ad febres non referendae.

- O. I. DOLORES VAGI.
- II. DOLORES CAPITIS.
- III. DOLORES PECTORIS.
- IV. DOLORES ABDOMINIS.
- V. DOLORES EXTER-  
NARUM.

## CL. V. FLUXUS.

Exitus insolitus cujusvis solidi, vel fluidi,  
e corpore est character hujus classis.

O. I. SANGUIFLUXUS.

II. ALVIFLUXUS sanguinolenti.

III. ALVIFLUXUS non sanguinolenti.

IV. SERIFLUXUS.

V. AERIFLUXUS.

## CL. VI. SUPPRESSIONES.

Meatuum impeditio, hinc excretionum con-  
suetarum in sanitate retentio.

O. I. SUPPRESSIONES egerendorum.

II. SUPPRESSIONES ingerendorum.

III. SUPPRESSIONES imi ventris.

## CL. VII. SPASMI.

Contractio invita constans, vel interpolata  
musculorum motum localem efficientium.

O. I. SPASMI TONICI PARTIALES.

II. SPASMI TONICI GENERALES.

III. SPASMI CLONICI PARTIALES.

IV. SPASMI CLONICI GENERALES.

## CL. VIII. ANHELATIONES.

Motus spasmodici iterati, defatigantes, pectoris cum respiratione sonora, molesta, absque pyrexia notabili.

O. I. ANHELATIONES SPASMODICÆ.

II. ANHELATIONES OPPRESSIVÆ.

## CL. IX. DEBILITATES.

Impotentia sentiendi, appetendi, imaginandi, organa artufque movendi more ad sanitatem neceffario.

- O. I. DYSÆSTHESIÆ.
- II. ANEPITHYMIÆ.
- III. DYS CINESIÆ.
- IV. LEIPOPSYCHIÆ.
- V. COMATA.

## CL. X. EXANTHEMATA.

Febris cum efflorescentia cutis varia maculosa, pustulosa, phlyctænoidea, et asthenia.

- O. I. EXANTHEMATA contagiosa
- II. EXANTHEMATA non contagiosa.

## CL. XI. PHLEGMASIÆ.

Febris cum pulsu duro, dolore topico, inflammatione partis externae vel internae, sanguine misso crusta inflammatoria tecto, urina plus tincta.

- O. I. PHLEGMASIÆ musculosae.
- II. PHLEGMASIÆ membranaceae.
- III. PHLEGMASIÆ parenchymatosae.

## CL. XII. FEBRES.

Frigus, calor, pulsus frequens, respiratio aucta, viribus artuum imminutis, depravatis, vel viribus vitalibus pulsu et respiratione vix mutatis, virium artuum summa prostratio.

- O. I. FEBRES CONTINUÆ.
- II. FEBRES REMITTENTES.
- III. FEBRES INTERMITTENTES.

## CL. XIII. VESANIAE.

Error mentis in imaginatione, appetitu, judicio, aut memoria.

O. I. HALLUCINATIONES.

II. MOROSITATES.

III. DELIRIA.

IV. VESANIÆANOMALÆ.

H h





# C L A S S I S I.

## ORDO I. MACULAE.

Mutationes coloris nativi:

### GENUS I. LEUCOMA.

1

Macula corneae pelluciditatem vitians, opacans.

### G. II. VITILIGO.

2

Macula corymbosa cum cutis depressione, locum fixum non servans in quo nascatur.

### G. III. EPHELIS.

3

Maculae umbrinae glabrae, corymbosae, raro partes tectas afficientes, acquisitae.

### G. IV. NÆVUS.

4

Macula congenita eminens, vel non, supra libellam cutis.

### G. V. ECCHYMOA.

5

Est macula nigricans, vel atro-rubra, caerulea, livescens, in gilvum successive desinens colorem, nata a sanguine in adiposam sub cute effuso.

## O. II. EFFLORESCENTIAE.

Aspredines, cum cuticulae elevatione ultra libellam cutis humorales, exiguae, gregales, absque pyrexia.

## 6 G. VI. PUSTULA.

Phyma aut vesicula colorata suppurans, diametri linearis, fastigiata, pure dehiscens, quandoque in crustam abiens; est seu *furunculus* linearis diametri.

## 7 G. VII. PAPULA.

Phyma parvulum seu efflorescentia desquamanda, nec suppurans.

## 8 G. VIII. PHLYCTHÆNA.

Vesicula parva fluido seroso plena, quae deinde sponte rumpitur et fundit serum.

## 9 G. IX. BACCHIA.

Maculae rubrae, vel efflorescentiae nasi et partium adjacentium eidem, guttatae plus, minus prominentes, asperae, furfurascennes, diuturnae; hoc genus ambigit inter maculas et efflorescentias.

## G. X. V A R U S. 10

Tumor pifi magnitudine plerumque fat durus, non suppurandus, aut desquamandus, pertinax in glandulis sebaceis. L.

## G. XI. H E R P E S. 11

Papularum prurientium corymbus in squamas furfuraceas fatifcentium.

## G. XII. E P I N Y C T I S. 12

Phlycthaenarum atro-rubrarum congeries, maxime in tibiis, noctu potissimum acriter prurientium.

## G. XIII. H E M E R O P A T H O S. 13

Papulae rutilae crura obsidentes, extra lectum illico apparentes, importune prurientes, in lecto evanescentes, diuturnae.

## G. XIV. P S Y D R A C I A. 14

Efflorescentia erysipelatosa absque febre notabili.

## G. XV. H Y D R O A. 15

Exanthemata granis milii magnitudine et forma similia subito exorta, phlycthaenoides, fugacia, absque asthenia, pyrexia, et

praegressa oppreffione praecordiorum, miliaria multis habita.

### O. III. P H Y M A T A.

Tumores humores solitarii.

#### 16 G. XVI. E R Y T H E M A.

Phyma rubrum calens, diffusum, sine febre.

#### 17 G. XVII. O E D E M A.

Phyma album, frigidum, indolens, molle foveam ex preffione fervans plerumque.

#### 18 G. XVIII. E M P H Y S E M A.

Phyma cuti concolor elasticum, ex preffione aut percussione crepitans.

#### 19 G. XIX. S C I R R H U S.

Phyma durum, indolens, gravans, frigidum, in partibus glandulosis enatum, dum externum cuti quoque concolor observatur.

#### 20 G. XX. I N F L A M M A T I O.

Est tumor sphaeroideus rubore, calore, tensione, dolore pulsatili insignis, solitarius,

plerumque sat extensus, in suppurationem sponte vergens ; erysipelas non suppurat, et phlegmone habet semper pyrexiam conjunctam manifestam ; inflammatio saepius in phlegmone transit, vel phlegmone est gradus major inflammationis.

G. XXI. BUBO.

21

Phyma scirrroso-phlegmonoideum in glandulis inguinalibus.

G. XXII. PAROTIS.

22

Tumor scirrroso-phlegmonoideus parotidis glandulae, in suppurationem lentissime vergens.

G. XXIII. FURUNCULUS.

23

Tumor inflammatorius cutaneus, seu subcutaneus, prominens, profunde ruber, sphaceloideus, cujus centrum occupat vortex fibrosus digere nescius ; ordinario juglandis habet magnitudinem.

G. XXIV. ANTHRAX.

24

Phyma apice gangraenosum, et in radio inflammatum.

## 25 G. XXV. CANCER.

Phyma scirrhum lancinans, vel phyma lancinans venis varicosis profunde rubris, nigris, lividis oblitum, cinctum, facile sanguinantibus.

## 26 G. XXVI. PARONYCHIA.

Inflammatorius tumor extremi digiti, cum dolore saepius perterebrante, calore, tensione, et subinde cum rubore.

## 27 G. XXVII. PHIMOSIS.

Tumor fere semper inflammatorius praeputii glandem incarcerans, aut excludens ad coronam hancce vinciendo.

## O. IV. EXCRESCENTIÆ.

Tumores a solidis adauctis per succum nutritium copiosorem advectum, &c. in hos conversum.

## 28 G. XXVIII. SARCOMA.

Excrefcentia carnis consistentiam fere habens, plerumque rubra.

## G. XXIX. CONDYLOMA. 29

Est excrefcentia eminens, vel non eminens, firmior carnibus et cute, mollior contra ossibus, non elastica.

## G. XXX. VERRUCA. 30

Excrefcentia cutanea prominens, vix sensibilis, indolens, praerupta seu aspera superficie.

## G. XXXI. PTERYGIUM. 31

Est excrefcentia carnea, vel membranaceo-vasculosa ad oculi canthum in globo oculi exorta, alam expansam utcunque referens, versusve corneam sese extendens, crescens.

## G. XXXII. HORDEOLUM. 32

Tumor durus, aut excrefcentia plus, minus mollis, plerumque cuti concolor, ferme sensu carens, in limbo palpebrarum enata, magnitudine saepius granum hordei vel pisi aequans.

## G. XXXIII. TRACHELOPHYMA. 33

Est tumor varius, non purulentus, neve inflammatorius, anticae partis colli.



## 34 G. XXXIV. EXOSTOSIS.

Tumor ossis partialis, vel aliquando totius ossis, ut subinde in minoribus fit, ad ossa accedens.

## O. V. CYSTIDES.

Tumores capsulati fluido referti.

## 35 G. XXXV. ANEURYSMA.

Cystis arteriosa cruore referta, ex pulsu et situ noscenda.

## 36 G. XXXVI. VARIX.

Dilatatio venae rubra, nigrescens, ad pressionem recedens, iterumque subito rediens hac cessante, plerumque pruriens, mordicans.

## 37 G. XXXVII. MARISCA.

Tumor in margine ani, ex sanguine in textum vasorum minimorum varicosorum effuso efformatus, ruber, dolens, variae formae et magnitudinis. Vide Haemorrhoidem. L.



## G. XXXVIII. HYDATIS. 38

Cystis lymphæductuum dilatatorum, lympham vel serum continens.

## G. XXXIX. STAPHYLOMA. 39

Cystis corneae, ex dilatatione ejusdem, ectopia uveae in cameram oculi anteriorem prolapsae ; hoc genus magis ad Ectopias spectat. Vide Caliginem. L.

## G. XL. LUPIA. 40

Est cystis materiem pultis, vel mellis consistentiam referentem continens, haud purulentam, indolens, cuti concolor, loco mobilis.

## G. XLI. HYDARTHURUS. 41

Hydrops vel in capsula articulari, vel in cellulis vicinis, haud in tunica propria ; tumor est fluctuans sine coloris mutatione, pulsatione.

## G. XLII. APOSTEMA. 42

Cystis purulenta, vel ichoroso-purulenta ; noscitur ex fluctuatione, praegressa inflammatione, albedine, remissione doloris et pulsationis.

## 43 G. XLIII. EXOMPHALUS.

Cystis umbilicalis, fluido quopiam repleta,  
absque ectopia.

## 44 G. XLIV. OSCHEOPHYMA.

Cystis scroti variis fluidis turgens.

## O. VI. ECTOPIAE.

Partium solidarum e sua sede dimotio, sensibus obvia, continentibus has relaxatis.

## 45 G. XLV. EXOPHTHALMIA.

Ectopia oculi.

## 46 G. XLVI. BLEPHAROPTOSIS.

Est palpebrae utriusque, vel alterutrius, morbofa elongatio, retractio, intro vel extra versio, cum symptomatis cuique ectopiae propriis.

## 47 G. XLVII. HYPOSTAPHYLE.

Est procidentia seu elongatio uvulae relaxatae, inflammatae, ulceratae, incrassatae, attenuatae, vel bicornis.

## 48 G. XLVIII. PARAGLOSSA.

Est linguae magnitudo minuta, vel aucta; vel plane soluto, aut elongato frenulo, in fauces ejusdem revolutio,

## G. XLIX. PROPTOMA. 49

Est procidentia appendicum externarum insolita et morbosa, diversa a praedictis.

## G. L. EXANIA. 50

Sphincteris ani, vel et intestini recti inversi procidentia extuberans, rubra, reducibilis semper extra strangulationem.

## G. LI. EXOCYSTIS. 51

Vesicae inversa membrana interior, soluta a reliquis per urethram foras pendet, et en exocystis !

## G. LII. HYSTEROPTOSIS. 52

Est uteri procidentia tumorem sistens in vagina, vel quandoque extra genitalia pendentem, undique liberum, menses stillantem, saltem initio reponibilem, cum doloribus hypogastrii, inguinum, urinae difficultate, animi deliquiis; haec omnia tactus obstetricius definit.

## G. LIII. COLPOPTOSIS. 53

Tumor in sinu muliebri, vel extra pendens, annularis, mollis, perforatus (prolabitur subinde una tantum ruga vaginae) per quod foramen digitus immissus altius

orificium uteri, utrumque in sua quasi sede absque colpocele deprehendit, reponibilis; torquet insuper aegram dysuria, tenesmus.

#### 54 G. LIV. GASTROCELE.

Est tumor in scrobiculo cordis vulgo dicto, vel ad minus supra umbilicum insolitus, herniosus, ventriculum, aut alia viscera illapsa, continens, cuti concolor, reponibilis, in decubitu dorsali sponte recedens, indolens, ex relaxatione integumentorum, undecunque orta natus, vomitum caussans.

#### 55 G. LV. OMPHALOCELE.

Tumor herniosus ad umbilicum, reponibilis, cuti concolor, indolens plerumque, ex relaxatione integumentorum et peritonaei natus, varia viscera continens.

#### 56 G. LVI. LAPAROCELE.

Tumor herniosus, ventralis seu abdominalis, in quocunque loco abdominis aliis herniis non dicato.

#### 57 G. LVII. MEROCELE.

Tumor herniosus, in suprema et anteriore parte femoris, ad exitum vasorum cruralium

in foeminis praecipue observabilis, proprietates herniarum habens ; vidi merocelen etiam in viro.

## G. LVIII. BUBONOCELE.

58

Tumor herniosus emergens per annulum vasorum spermaticorum, sensim enatus, cuti concolor et indolens, absente strangulatione.

## G. LIX. OPODEOCELE.

59

Est tumor herniosus in summo femine adlatus, genitalium egrediens per sinuositatem ossis ischii superiorem, vasis transmittendis dicatam ; in foeminis prope alterum vulvae labium visitur haec ectopia ; reponibilis, cuti concolor, mollis ; dum parvus est tumor, vix observatur, subin est elasticus.

T. I. Auctorum chirurgicorum Paris. p. 709. consule L.

## G. LX. ISCHIOCELE.

60

Est hernia emergens per incisuram ossis sacri, seu hiatum inter os sacrum et tuber ossis ischii, decubitu prono reponibilis ; rarum genus, et fat adhuc obscurum.

## 61 G. LXI. COLPOCELE.

Est tumor herniosus in vagina emergens, reponibilis, in decubitu supino natibus elevatis sponte recedens plerumque, indolens, absque signis aliorum tumorum qui hic enasci solent.

## 62 G. LXII. PERINÆOCELE.

Tumor herniosus in perinaeo ad unam vel alteram, aut plane utramque, ut vidi in parvula puella, partem, raphes, mollis, reponibilis, cuti concolor; subin est effectus dytlociae; species hujus generis vesicalis, intestinalis, omentalis, patent una cum therapeia ex prioribus.

## 63 G. LXIII. PERITONÆORIXIS.

Sunt herniae omnes jam descriptae ob rupturam peritonaei natae; rixis vero peritonaei signa sunt, crepitus in violentia aliqua majore peritonaicum lacerante, herniae alicujus subita et magna protuberantia, eruptio; dolor in loco rixis major aut minor; species sunt hujus generis tot, quot genera jam numeravi herniarum. Hernia est extensio praeternaturalis peritonaei et integumentorum cavum formans,



## G. IX. AMPUTATIO. 86

Vulnus detruncatione partis totalis factum.

## G. X. SUTURA. 87

Est, studiosis puncturis mediante acu factis, filiisque per puncturas trajectis, solutorum mollium contractio, adductio; futura sicca fit emplastris, quae huc non spectat, quum non sit plaga.

## G. XI. PARACENTESIS. 88

Est artificialis punctura in aliquod cavum corporis, plerumque acu triquetra cannulata facta.

## O. III. SOLUTIONES

Incruentae, nec ad priores referendae, pus, faniem, cariem, &c. sistentes.

## G. XII. ULCUS. 89

Est vulnus suppuratum partis mollis, vel solutio continui mollis antiqua, pus, ichorem, aut faniem quamcunque alens, fundens.

## 90 G. XIII. EXULCERATIO.

Est excoriatio suppurans, seu ulcus superficiale, reliqua, quae ad hoc genus spectare videntur, ex ulcere patent.

## 91 G. XIV. FISTULA.

Est ulcus cōrtice calloso vaginatum, ore angustatum, oblongum.

## 92 G. XV. SINUS.

Est cavitas ulcerosa ampla, saepe multiplex, ore angusto non calloso, vel plane nullo donata.

## 93 G. XVI. ESCHARA.

Crusta mortua sicca partis mollis saepius causticis facta est eschara, sensus et vitae expers.

## 94 G. XVII. CARIES.

Offis erosio cava, aspera, perioestio denudata, plerumque nigra; unde os evadit fragile, friabile, vel exfoliabile: Species numerat hoc genus sequentes; est nimirum caries sicca, humida, exfoliabilis, syphilitica, scorbutica, scrophulosa, variolosa.



recipiens viscera adjacentia; praeter praedictas hernias dantur herniarum varietates: Sic dantur herniae partiales intestinales, ubi media pars fistulae intestinalis cavum herniosum ingreditur, altera parte libera in abdomine manente; dantur herniae accretae, in quo casu pars illapsa cavi herniosi peritoneo accrescit; cavum herniosum quandoque praeter viscera illapsa liquorem in abdomine collectum continet; saepius quoque partes cavum herniosum ingressae incarcerantur a spastice contracto annulo, unde ileus nascitur, quem vide suo loco. Peritoneorixis pertinet quidem ad rupturam; sed, propter affinitatem ejusdem cum herniis, hic eandem subjunxi.

## G. LXIV. ENCEPHALOCELE.

64

Est cerebri, aut cerebelli, vel utriusque simul, per hiatus ossium cranii necdum sat cohaerentium, ectopia herniosa, relaxata pariter lamina utraque durae matris et piae externa tenuissima pellucida; symptomata subin non magna, subin contra gravissima causans.

K k

## 65 G. LXV. HYSTEROLOXIA.

Est uteri gravidi, vel non gravidi, in abdomine situs seu directio aberrans a directione naturali axeos suae, noscenda ex orificii uterini directione mutata, palpo externo abdominis, tum aliis symptomatis inconsoetis ; ut ichuria, dysuria, enuresi, obstipatione, &c.

## 66 G. LXVI. PARORCHIDIUM.

Est testiculi unius, vel utriusque, a situ naturali aberratio.

## 67 G. LXVII. EXARTHREMA.

Est separatio contigui in ossium articulis per diarthrosin combinatorum, noscenda ex impotentia ad motum, mutatione nativae conformationis, dolore, protuberantia insolita, cavitate, muscutorum tensione, conversione artus, accurtatione membri, vel prolongatione.

## 68 G. LXVIII. DIASTASIS.

Ossium recessus junctorum per raphen, harmoniam, synchondrosin, aut syndesmosin, cognoscibilis cavitate insolita uno in loco, in altero vero tumore, mutatione positu-

rae, et reliquis symptomatis oculo et tactui patentibus.

G. LXIX. LOXARTHROS.

69

Est ossium articulorum situs relativus in alienum constanter mutatus, seu obliquitas respectiva persistens citra exarthrema et spasium: Vidè Subluxationem et Distortionem.

G. LXX. GIBBOSITAS:

70

Est ossium pectus, vel pelvim componentium indecora prominentia a tumore, luxatione, diafasi, torsione, pressione, aut alio principio nata.

G. LXXI. LORDOSIS.

71

Ossium longiorum fistulosorum circa medium inflexio, incurvatio, ectopia a linea recta.

O. VII. DEFORMITATES

Sunt vitia quae vix sanitatem laedunt.

G. LXXII. LAGOSTOMA.

72

Labium oris fissum.

## 73 G. LXXIII.    A P E L L A.

Est praeputii, vel alterius appendicis mollis, brevitās, parvitas.

## 74 G. LXXIV.    P O L Y M E R I S M A.

Partium numerum ordinarium excessus.

## 75 G. LXXV.    E P I D O S I S.

Appendicum mollium incrementum incon-  
fuetum sanum : Species sunt penes prae-  
longi, auriculae pendentes, praeputia lon-  
gissima, clitorismus, caro pubis foemina-  
rum Africanarum, nafores, labia tumida  
oris, &c.

## 76 G. LXXVI.    A N C H Y L O M E R I S M A.

Est partium concretio.

## 77 G. LXXVII.    H I R S U T I E S.

Pili copiofiores, longiores, vel in locis ubi  
non folent crefcere obvii, dant ideam hu-  
jus generis.

## C L A S S I S II.

## P L A G Æ.

CHAR. CLASSIS. Continui solutiones, morbi proprie chirurgici per sæpe fat graves.

## ORDO I. SOLUTIONES

Recentes, quasi semper cruentae.

## G. I. VULNUS. 78

Est continui solutio molli in parte hians, labiata, cruenta, ab instrumento mechanico scindente facta; corneae vulnus cruorem non fundit.

## G. II. PUNCTURA. 79

Continui solutio intus extensa tantum, eaque instrumento pungente facta casualiter.

## G. III. SCLOPETOPLAGA. 80

Est vulnus a glandibus e bombardis, aut sclopetis explosis illatum, vaginatum, decursum glandis designans, oblongum, vexatum.

## G. IV. MORSUS. 81

Est plaga recens, quam animalia dentibus inferunt mordendo.

## 82 G. V. EXCORIATIO.

Est epidermidis a cute, vel cutis a carnibus separatio, detractio.

## 83 G. VI. CONTUSIO.

Est partis cujuscunque mollis, vel solidae, in minimis vasculis, fibris attritio, fractio, solutio.

## 84 G. VII. RUPTURA.

Membranarum, tendinum, aut ligamentorum dialysis per tensionem facta, vires horum excedentem: Confule chirurgos et de utero rupto Cl. Henricum Crantz, ingenii excitatissimi virum; huc pertinet peritonaeorixis.

## O. II. SOLUTIONES

Recentes, cruentae, et artificiales.

## 85 G. VIII. OPERATIO.

Est studiosa solutio continui ad aliquid eximendum, ut lithotomia; operatio reipsa est vulnus studiosa et dextra manu factum chirurgi, morbum relinquens hujus classis.

## G. XVIII. ARTHROCACE. 95

Ulcus medullae ab interioribus sponte natum, cum offis carie, exostosi, et persaepe dolore; species numerat hoc genus fere totidem quot caries; vulgo vocatur spina ventosa: Consule super hac Petit de morbis offium.

## O. IV. SOLUTIONES

Anomaliae, quae prioribus includi renuunt.

## G. XIX. RHAGAS. 96

Est solutio continui sicca in partium mollium marginibus, ut labiis oris; species includit Rhagas veneream, malignam, pestiferam, frambaesiacam, ulcerosam, benignam, lixiviam, glaciam, &c.

## G. XX. AMBUSTIO. 97

Est plaga a flamma ignis, corporibusque ex igne candentibus, liquidis ferventibus, aut radiis solis in focum coactis, nostro corpori illata, succedentibus phaenigmo, phlycthaenis, vel eschara.



## 270 SYSTEMA MORBORUM

### 98 G. XXI. FRACTURA.

Est divisio ossium in fragmenta separabilia.

### 99 G. XXII. FISSURA.

Divisio ossium rimam referens, haecceve  
non penitus separans.



# C L A S S I S III.

## O. I. M A C I E S.

Diminutio voluminis corporis ex consumptione pinguedinis, vel sanguinis defectu.

### G. I. T A B E S.

100

Est macilentia universalis, cum pyrexia lenta et habituali, citra tussim purisve anacatharsin.

### G. II. P H T H I S I S.

101

Corporis emaciatio, cum amphimerina lenta, tussi, dyspnoea, et ut plurimum puris sputo: Ab initio rarius in phthisi adest puris sputum, in Statu contra et fine semper. Quid est proprie pus?

### G. III. A T R O P H I A.

102

Est macies sine tussi, anacatharsi, et febre notabili; raro equidem est atrophia sine omni febricula. Consule definitionem febris.

### G. IV. H A E M A T A P O R I A.

103

Macies seu cachexia ex inopia sanguinis. Descriptio: Virium debilitas, pertinax an-

rium sibilus, anorexia, facies lurida, epidermis tecta, pallidissima, alvi fluxus, diabetes, sudores profusi, lipothymiae, tibiae tumidae, subin hydrothorax his succedens, vigiliae, suspiria, animi abjectio, moeror, mortis timor, urina pallida, venae abditae, pulsus vacuus, sanguinis profluvia praegressa, sunt signa haemataporiae; aliquando aër evolutus locum sanguinis in vas occupat.

104 G. V. ARIDUR A.

Macies, exsiccatio unius tantum artus, vel partis corporis, sine febre.

## O. II. INTUMESCENTIÆ.

Deformitas ex volumine, mole, auctis.

105 G. VI. PLETHORA.

Intumescentia universalis, proportionata et aequabilis, ex abundantia sanguinis. Descriptio: Amygdilidis et ventris cultus, pulsus plenus aut suppressus, venarum amplitudo conspicua: Æstus et gravitas totius corporis, respirandi difficultas, lassitu-

do spontanea, stupor artuum, somni turbati, partes epidelio tectae ruberrimae, temperamentum sublaxum, sanguineum.

G. VII. POLYSARCIA. 106

Intumescencia universalis, mollis, pallidula, ab adipe nimium aucto.

G. VIII. PNEUMATOSIS. 107

Intumescencia universalis ab aëre, ad attactum crepitans, elastica, levis.

G. IX. ANASARCA. 108

Intumescencia universalis oedematosa, non elastica, vestigium digiti impressi servans, pallida, frigida, haud crepitans.

G. X. PHLEGMATIA. 109

Intumescencia oedematosa artuum inferiorum mollis, cuti concolor, indolens, foveam digiti impressi servans, non elastica.

G. XI. PHYSCONIA. 110

Est intumescencia abdominis a partibus solidis praeternaturalis, sine graviditate, fluctuatione, et elasi, ad tactum dura, resistens, parenchymatica.

## III G. XII. GRAVIDITAS.

Intumescencia abdominis ex imo hypogastrio incipiens, in axique ejusdem ascendens, opus generationis subsequens, partu terminanda ; pathemata gravidarum, menostasia, mutationes oris tincae, motus infantis sensibilis, sunt totidem characteres hujus generis.

## O. III. HYDROPE PARTIALES.

Tumores a fluidis in cavitatibus congestis, ut abdomine, &c.

## II2 G. XIII. HYDROCEPHALUS.

Hydrops capitis a fero.

## II3 G. XIV. PHYSOCEPHALUS.

Est tumor totius capitis emphysematosus elasticus, sub digito premente crepitans.

## II4 G. XV. HYDRORACHITIS.

Tumor cysticus ex hiatu vertebrarum lumbarium, vulgo spina bifida, in recens natis protuberans cum anaesthesia; est verus hydrops thecae spinalis. A.

## G. XVI. ASCITES. 115

Gravis, sphaeroidea, et fluctuosa abdominis intumescencia, non elastica, cum polydipsia, urina pauca, lixiviali, lateritia.

## G. XVII. HYDROMETRA. 116

Tumor hypogastrii sine graviditate, ab utero fluidis distento, rotundus, fluctuans, leges gravitatis sequens; dolor inguinum, spirandi difficultas, menostasia, rigores, mammarum mollities, phlegmatia, et tactus orificii uterini, diagnofin firmant.

## G. XVIII. PHYSOMETRA. 117

Est constans tumor hypogastrii a flatu uterum distendente, rotundus, elasticus, levis, in fede uteri.

## G. XIX. TYMPANITES. 118

Est intumescencia totius abdominis, levis et elastica, a pulsatione sonum edens, cum ructibus, borborygmis, constipatione, et doloribus abdominis; chronicus est hic morbus.

## 119 G. XX. METEORISMUS.

Est intumescencia flatulenta epigastrii, hypochondriorum, vel totius abdominis, fugax et plerumque indolens.

## O. IV. TUBER A.

Tumores partium solidarum externi, non hydropici, cachexia.

## 120 G. XXI. RACHITIS.

Est deformitas nata ex articulorum tumore duro, carniū marcore et flacciditate, capitis mole, sterni protuberantia; ingenuum praecox in infantibus, ossiumve flexilitas et lordosis.

## 121 G. XXII. SCROPHULA.

Tumores subscirrhosi glandularum colli, mesenterii, cum labiis nasoque crassioribus; scrophula ordinario mollior est scirro.

## 122 G. XXIII. CARCINOMA.

Ulcera cancrofa, fordida, labiis duris everfis, scirrhosis, ex quibus ichor manat acris et rodens; adsunt insuper dolores lancinantes.



tes, excreſcentiae fungosae, venae adjacentes varicosae non inepte pedes cancri referentes, et febris hectica.

G. XXIV. LEONTIASIS. 123

Cognoscitur ex mutatione formae humanae in ferinam aliquatenus ; unde aspectus hominis ferinus.

G. XXV. MALIS. 124

Morbus est, qui cognoscitur tumoribus, ulceribus, quae infecta vermiformia vel horum larvae excitarunt, in quibus nidulantur, et ex apertis prodeunt.

G. XXVI. FRAMBÆSIA. 125

Morbus contagiosus, aliquando et congenitus apud Americanos, cujus praecipuum symptomata sunt excreſcentiae fungosae mori fructus referentes, quibus sese adjungunt ulcera dysepulota, exostoses, caries, anchyloses, et macies.

O. V. IMPETIGINES.

Morbi contagiosi, chronici, qui cutis excreſcentias, tumores gregales, exulcerationes,

crustas, inducunt, plures foveantur a viru inoculabili.

126 G. XXVII. SYPHILIS.

Ulcuscula, porri, ficus, bubones, tophi, nodi, post vel cum gonorrhoea plerumque; de- in pustulae crustosae, dolores nocturni, o- stocopi, exostoses, caries, macies, et color luridus, morbum adesse loquuntur.

127 G. XXVIII. SCORBUTUS.

Cognoscitur ex maculis lividis, flavis, coeruleis tibiarum, stomacace, facie lurida, urina pellicula tecta.

128 G. XXIX. ELEPHANTIASIS.

Facies deformis, tubera callosa, ozaena, rau- cedo, cutis elephantina crassa et unctuosae, rictus satyrorum, anaesthesia in artubus, constituunt characterem hujus generis.

129 G. XXX. LEPROA.

Cognoscitur ex pustulis verrucosis, duris, crassis, herpetosis, vel squamis ficcis in co- rymbos dispositis, prurientibus, escharoti- tics, rhagadibus; dum plures sunt ficcae pustulae, *ficca*; ubi vero, e contra, plures



humidae et exulceratae, *humida* dicitur lepra.

## G. XXXI. SCABIES.

130

Cognoscitur ex pustulis, vel phlycthaenis, lentis vel fecalis grani magnitudine, lympham aut saniem continentibus, quae scalpendo ruptae crustas prurientes formant; contagiosus hic morbus et inoculabilis flexuras artuum maxime occupat.

## G. XXXII. TINEA.

131

Incipit a pustulis vel phlycthaenis capitis aut faciei diversi-coloribus, quae ruptae in crustas humidas vel siccas abeunt corymbosae; videtur nimirum esse scabies capitis, et nihil aliud.

## O. VI. ICTERITIAE.

Cognoscuntur ex totius cutis colore inaffueto, pallido, flavo, nigro, rubro, lurido sine pyrexia notabili.

## G. XXXIII. AURIGO.

132

Flavedo cutis ad aureum, vel aurantium ten-

dens colorem, praecipue vero scleroticae membranae.

133 G. XXXIV. MELASICTERUS.

Color cutis et scleroticae niger, atro-lividus, fuliginosus, constituunt characterem hujus generis, cum moestitia et perturbatione mentis.

134 G. XXXV. PHOENIGMUS.

Morbus hicce apyretus rubedine cutis diffusa maculata, vel punctata, notatur.

135 G. XXXVI. CHLOROSIS.

Pallor faciei totiusve corporis, cum asthenia, et saepius pica, sine aurigine scleroticae; color est albus, cinereus, fuscus, cereus, luridus, aut virescens, cum sclerotica semper albissima perseverante.

O. VII. CACHEXIÆ ANOMALÆ.

Noscuntur ex signis classeos et affinitate cum prioribus generibus.

## G. XXXVII. PHTHIRIASIS. 136

Exortus infectorum, pediculorum, aut his affinium, cum porrigine, exulceratione, pruritu, cachexia.

## G. XXXVIII. TRICHOMA. 137

Morbus contagiosus Hebraeorum, cujus praecipuum symptoma est capillorum conspurcatio, complicatio, conglutinatio, et in cirros ac funiculos concretio inextricabilis, saepius cum phthiriasi; haecreditarius est morbus hicce.

## G. XXXIX. ALOPECIA. 138

Defluvium pilorum et desquamatio cuticulae constituunt characterem hujus morbi, cunctis animantibus communis.

## G. XL. ELCOSIS. 139

Copiosa ampla ulcera, foetida, cariosa, chronica, cum pyrexia lenta, produnt hoc genus.

## G. XLI. GANGRÆNA. 140

Anaesthesia, immobilitas, frigus, phlycthaenae lympham continentes, flacciditas, lividitas, et partis mors in cute et membrana

cellulosa, vel in omnibus ad ossa usque, textus facilis laceratio et dissolutio putrida, cum foetore cadaveroso, definiunt hoc genus.

#### 141 G. XLII.      NECROSIS.

Est partis mors lenta sine praevio tumore, mollitie, et dissolutione foetida, cum dolore ardente ordinario et stupore, quae sequitur exsiccatio partis, induratio, nigredo, et mumia; differt a gangraena in eo, quod lentius procedat, cum dolore rodente et stupore, et in mumiam abeat; gangraena contra mollescat, phlycthaenas elevet, putrescat, foeteat, atque cito decurrat.

## C L A S S I S. IV.

Ingrata et molesta sensatio, aut imaginatio, qualis ex nervearum partium laceratione, rosione, ustione, pressione, distractione, oritur, reliqua symptomata superans hanc definit classem.

## O. I. DOLORES VAGI.

Saepius universales, aut cutanei ad phlegmasias non referendi.

## G. I. ARTHRITIS.

142

Articulorum dolor spontaneus, periodicus a synovia corrupta.

## G. II. OSTOCOPUS.

143

Est dolor constans et notabilis ossium, a periosio interno potissimum affecto, ex pressione non exacerbans, fixus.

## G. III. RHEUMATISMUS.

144

Dolor diuturnus in parte carnosa, tendinosa artuum, vagabundus, saepius sine coryza, rheumate, catarrho, erysipelate, et sine febre notabili; acutus rheumatismus facit genus inter phlegmasias *Myositin* a me dictum; sanguis missus rheumatismo la-

borantium est gelatinosa crusta tectus, et  
urina saepe ad sulphureum colorem accedit.

145 G. IV. CATARRHUS.

Colli collove vicinarum partium dolor a frigore suscepto, cum tussi, coryza, levi partium intumescencia, et pyrexia vespertina exigua, seu amphimerina catarrhali.

146 G. V. ANXIETAS.

Molestia ad loci mutationem assiduam cogens aegrum, quem habet.

147 G. V. LASSITUDO.

Est ingrata sensatio, juncta cum debilitate, quae ad quietem cogit virium reparandarum gratia.

148 G. VII. STUPOR.

Est molesta sensatio cum obscuritate tactus,

149 G. VIII. PRURITUS.

Molesta sensatio ad scalpendum cogens.

150 G. IX. ALGOR.

Molestia qualis a summo aëris frigore excitatur, jam cum phricasmo, rigore, vel concussione corporis, jam sine his symptomatibus.

G. X.      A R D O R.      151

Molestia qualis a summo aëris calore produci-  
tur.

## O. II. DOLORES CAPITIS,

Faciei, vel Capillitii.

G. XI.      C E P H A L A L G I A.      152

Est capitis gravitas vel sensatio molesta, quæ  
refert caput interius distensum, turgidum,  
et quasi gravatum, malum haud chroni-  
cum.

G. XII.      C E P H A L Æ A.      153

Est dolor capitis chronicus, et, juxta Stahli-  
anos, tensivus; videtur sola diuturnitate a  
cephalalgia differre receptissimum hoc ge-  
nus.

G. XIII.      H E M I C R A N I A.      154

Est morbus, cujus præcipuum symptoma est  
dolor in alterutro capitis latere, potissi-  
mum ad tempora, frontem, ac oculos,isque  
vehemens sæpe et periodicus quandoque.

N n



## 155 G. XIV. OPTHALMIA.

Cognoscitur ex oculi dolore, rubore, intolerantia lucis, et lacrymatione, vel ficcitate.

## 156 G. XV. OTALGIA.

Dolor in aure.

## 157 G. XVI. ODONTALGIA.

Dolor dentium maxillarumque, cum vigiliis et saepius ptyalismo, maxillae aut genarum tumore.

## O. III. DOLORES PECTORIS

Anhelationis expertes.

## 158 G. XVII. PYROSIS.

Ardor oesophagi ad ventriculum usque extensus, sine febre, vulgo Soda dicitur.

## 159 G. XVIII. CARDIOGMMUS.

Est gravis pertinaxque molestia in praecordiis, cum sensu ponderis auctaeve molis et pulsatione, quae ad minimum motum augentur: Aneurysmati cordis, auricularum, sinuum, et arteriarum tribuitur cardiogmus, seu dolor cordis.



## O. IV. DOLORES ABDOMINIS

Interni.

## G. XIX. CARDIALGIA. 160

Molestia ad epigastrium et ventriculum relata, syncopen minitans.

## G. XX. GASTRODYNIA. 161

Notabilis et durans in regione ventriculi dolor, sine syncope et pyrexia.

## G. XXI. COLICA. 162

Est dolor potissimum intestini crassi regiones occupans in abdomine, hujusque officia turbans, sine febre notabili, cum pulsu plerumque suppresso, rariore, et obstipatione.

## G. XXII. HEPATALGIA. 163

Molesta sensatio gravativa, tensiva, aut quavis alia in regione hepatis, sine pyrexia acuta.

## G. XXIII. SPLENALGIA. 164

Est dolor pertinax gravativus, tensivus, in regione lienis, cum aliquali dyspnoea, pul-

## 288 SYSTEMA MORBORUM

fu in inspiratione intermittente, tumore et duritie, sine pyrexia.

### 165 G. XXIV. NEPHRALGIA.

Dolor fixus in regione renum et ureterum, sine pyrexia acuta.

### 166 G. XXV. HYSTERALGIA.

Dolor in regione uteri, sine parturitionis nisu et phlegmasia notabili.

## O. V. DOLORES EXTERNARUM

Partium locales.

### 167 G. XXVI. MASTODYNIA.

Dolor mammarum.

### 168 G. XXVII. RACHIALGIA.

Atroces dolores abdominis, ad lumbos et dorsum serpentes, pressione non crescentes, cum umbilici subin retractione, alvi constipatione, convulsione, manuum torpore, paresi, paralyfi, ac contracturis artuum, definiunt hunc morbum.

## G. XXVIII. LUMBAGO. 169

Est dolor lumborum corporis erectionem impediens, sine nausea, ureterum dolore, femoris stupore, urinaeve vitiis; dolor est in musculis spinæ dorsi aut ligamentis.

## G. XXIX. ISCHIAS. 170

Dolor constans coxendicis, pelvis, et capitis femoris, nec non musculorum ejusdem; hinc difficultas gradiendi, standi, claudicatio, frigus partis; conatus ad deponendam alvum dolorem augent ischiadicum.

## G. XXX. PROCTALGIA. 171

Est dolor podicis.

## G. XXX. PUDENDAGRA. 172

Dolor partium genitalium tum in viris tum in foeminis.

## G. XXXII. DIGITIUM. 173

Est dolor periodicus articuli cujusdem digiti, cum emaciatione et ossis friabilitate, sine omni phlegmasia. Vide Ill. De Sauvages, T. I. p. 150.

# CLASSIS V.

## FLUXUS.

CHAR. CLASSIS. Exitus insolitus cujusvis fluidi vel solidi e corpore.

### O. I. SANGUIFLUXUS.

Sanguinis, vel saltem sanguinolentae materiae ejectio seu effluxus, quacunque via, praeter alvinam.

#### 174 G. I. HAEMORRHAGIA.

Est fluxus sanguinis e naribus.

#### 175 G. II. HAEMOPTYSIS.

Est sanguinis expectoratio seu anacatharsis, cum tussi sine notabili pyrexia.

#### 176 G. III. STOMACACE.

Stomacace laborantibus sanguis dissolutus promanat e gingivis laxis, sordidis, et foetidis, sponte, vel ad levem harum attactum.

#### 177 G. IV. HÆMATEMESIS.

Est sanguinis rejectio ex oesophago, cum vomitorio conatu, anxietate magna, et animi deliquiis; observantur et faeces alvi sanguine tinctae, nigricantes.

## G. V. HÆMATURIA. 178

Est effluxus seu minctio cruoris, urinae cruentae ex vesica, vel feminis sanguinolenti ex urethra, in viris et mulieribus.

## G. VI. METRORRHAGIA. 179

Sanguinis ex utero aut vagina fluxus morbosus, nimius.

## G. VII. ABORTUS. 180

Est foetus immaturi, id est, ante nonum mensem graviditatis saltem aliquot septimanis exclusio, subin cum metrorrhagia: Symptomata sunt, lassitudo, anorexia, frigus, mammarum flacciditas, lumbago, hysteralgia, lipothymia, &c.

## O. II. ALVIFLUXUS

Sanguinolenti.

## G. VIII. HEPATIRRHOEA. 181

Est alvi fluxus per inferiora sanguinolentus, nec ater, nec torminosus.

## G. IX. HÆMORRHOIS. 182

Est sanguifluxus ex tuberculis, mariscis rubris, duris, dolorificis, finem intestini recti

obsidentibus, vel in recto latentibus; sentiunt posteriora tubercula aegri in recto saepius obstitati, et digitus immissus intestino haec offendit; sanguis in depositione alvi praecedit, vel ad minus comitatur, excrementa.

183 G. X.      DYSENTERIA.

Est frequens torminosa muco-so-cruenta alvi dejectio.

184 G. XI.      MELÆNA.

Est Fluxus materiei nigricantis, atro-rubrae, ano vel cato frequens.

## O. III. ALVIFLUXUS

Non sanguinolenti.

185 G. XII.      NAUSEA.

Est inanis vomendi conatus, et tamen maximis licet nisibus nihil nisi flatus aut mucus exiguus exantlatur; adest anorexia, gastrodynia, motus ossis hyoidis ad superiora, ptyalismus; capitis ad anteriora inclinatio, tremor labii inferioris, &c.

## G. XIII. VOMITUS.

186

Est palpabilium materierum non cruentarum per os oesophagumque rejectio frequens ex ventriculo; causa est antiperistaltica ventriculi contractio, concurrente diaphragmatis et muscutorum abdominalium pressione, cum simultanea expiratione; pulsus est contractus, rigidus, et frequens.

## G. XIV. ILEUS.

187

Gastrodynia, obstipatio, anxietas, et vomitus demum faeculentae materiae, determinant hunc morbum; atrocia circa umbilicum tormina, ructus, nausea, singultus, intestinorum volutatio, virium prostratio, pertinax alvi obstipatio, et vomitus demum faeculentus, sunt symptomata principalia hujus morbi.

## G. XV. CHOLERA.

188

Est syndromae ex vomitu, diarrhoea, gastrodynia, prostratione virium, et subin furarum crampo.

## G. XVI. DIARRHOEA.

189

Est recrementorum et excrementorum ut plurimum fluxilium frequens per anum



dejectio notabilis et constans, adeoque mor-  
bosa.

190 G. XVII.      COELIACA.

Est albescentium, aut chyliacearum materi-  
erum per alvum frequens dejectio, ple-  
rumque profusa, cum torminibus et pro-  
stratione virium.

191 G. XVIII.      LIENTERIA.

Alimenta parum aut nihil mutata per al-  
vum dejiciunt, et quidem plerumque  
paulo post ingestionem, lienterici.

192 G. XIX.      TENESMUS.

Muci frequens et pauca dejectio per anũ,  
cum intensa dejiciendi cupiditate, conatu-  
que eidem proportionali; stimulum et do-  
lorem sentiunt aegri in intestino recto.

193 G. XX.      PROCTORRHOEA.

Est fluxus mucosi subalbi, flavescentis, quan-  
doque striis sanguineis tincti, humoris ex  
vasis haemorrhoidalibus externis, vel in  
recto latitantibus, qui humor ordinario  
spissior est, dum ex internis vasis stillat,  
scybalaque praecedit: Vide Lieutaud, T.  
I. p. 396. No. 4. Pruritus praeterea et



ardorem hoc fluore madentes et foëtentes in podice sentiunt, queruntur. Species non adeo magni momenti in praxi possunt esse proctorrhoea externa, interna, periodica, sanguinolenta, hujus generis, quod etiam proctoleucorrhoea vocari potest, ob similitudinem cum leucorrhoea.

#### O. IV. S E R I F L U X U S.

Fluidi, nec sanguinolenti, nec per alvum, effluxus morbosus.

##### G. XXI. E P H I D R O S I S. 194

Est sudoris quantitate, qualitate, aut intemperativitate peccantis, excedentis effluxus.

##### G. XXII. E P I P H O R A. 195

Est oculis constans effluxus humoris serosi, lacrymalis, sebacei, aut purulenti, morbosus.

##### G. XXIII. C O R Y Z A. 196

Est humoris serosi mucosive e naribus fluxus morbosus, sine, vel cum ozaena, concomitante plerumque gravedine capitis.

## 197 G. XXIV. PTYALISMUS.

Est salivae mucive, sine anacatharsi ac vomitione, ex ore effluxus, emissio, aut sputatio uber et constans.

## 198 G. XXV. ANACATHARSIS.

Est muci, lymphae, aut puris facta cum tussi e pectore per os resectio frequens, notabilis, et morbofa.

## 199 G. XXVI. DIABETES.

Subita potus omnis per urinae vias emissio, vel urinarum utcunque coctarum nimia profusio, cum siti, anorexia, et polydipsia.

## 200 G. XXVII. ENURESIS.

Involuntaria et inopportuna doloris et ardoris expers minctio, quaeque saepius infantiis accidit.

## 201 G. XXVIII. PYURIA.

Est purulentae, albae, flavae, mucosae, aut lutulentae materiae cum urinis minctio.

## 202 G. XXIX. LEUCORRHOEA.

Est serosae, flavae, puriformis, mucosae, foetidae, atrae, &c. materiae ex utero aut vagina delapsus, effluxusve morbosus.

## G. XXX. LOCHIORRHOEA. 203

Est lochiorum alborum nimius fluxus puerperam debilitans.

## G. XXXI. GONORRHOEA. 204

Est stillicidium fluidi feminalis, vel puriformis, ex urethra, sine minctione.

## G. XXXII. GALACTIRRHOEA. 205

Est stillicidium lactis e mammis, vel locis insolitis.

## G. XXXIII. OTORRHOEA. 206

Est fluxus serosus, purulentus, foetidus, ex cavo auris, meatu auditorio, vel ambitu auriculae.

## O. V. AERIFLUXUS,

Sunt flatus halitusve insolitae et vitiosae emissiones per os vel anum, &c.

## G. XXXIV. FLATULENTIA. 207

Est morbus flatuum per os, vel anum, frequenti emissionem et borborygmis designatus.

## 208 G. XXXV. ÆDOPSOPHIA.

Est flatuum ex vesica per urethram, vel ex utero per vaginam, emissio.

## 209 G. XXXVI. DYSODIA.

Est foetidorum vaporum e corpore exhalatio odoratum offendens, exhalant tales vapores e naribus, ore, vulva, inguinibus, axillis, et pedibus.

## C L A S S I S VI.

CHAR. CLASSIS. Meatum impeditio;  
hinc solitarum in sanitate excretionum  
impedimentum et emanatio; *Suppressorios*  
morbos vocavit Ill. Linnaeus.

## ORDO I. SUPPRESSIONES

Humorum feroforum.

## G. I. ADIAPNEUSTIA.

210

Transpirationis naturalis, et liquoris cutis organa humectantis, suppressio.

## G. II. STERILITAS.

211

Est geniturae suppressio, conceptus impeditio.

## G. III. ISCHURIA.

212

Urinae secretae a renibus retentio seu suppressio, cum tumore hypogastrii, vel secretionis in renibus suppressio, cum stupore renum, singultu, anorexia, vomitu, ptyalifino urinoso, ephridrosi.

## G. IV. DYSURIA.

213

Difficilis et dolorifica, guttata saepius et ardens mictio; est ergo fluxus urinae pro parte suppressus, et non in integrum, ut in ischuria.

214 G. V. AGLACTATIO.

Lactis defectus.

215 G. VI. DYSLOCHIA.

Est lochiorum suppressio.

O. II. SUPPRESSIONES  
INGERENDORUM,

Constrictio meatuum ingerenda admittentium, sine phlegmasia.

216 G. VII. DYSPHAGIA.

Est deglutitionis suppressio, impeditio, absque notabili respirationis laesione et phlegmasia.

217 G. VIII. ANGINA.

Est respiratio impedita, cum sensu obicis in gutture, absque phlegmasia, sive dein adsit dysphagia, sive non.

## O. III. SUPPRESSIONES

Imi ventris.

## 218 G. IX. DYSMENORRHOEA.

Menstrua suppressa, dolorifica, cum lumbagine, cephalalgia, dyspnoea, palpitatione cordis, &c. constituunt characterem hujus generis; fluxus menstruus periodicus a tribus ad 8 dies protelari solet; quantitas sanguinis a quinque ad 10 uncias limitatur; circa 13 annum aetatis incipit, et ad 45 plerumque producitur; sanguis refert sanguinem victimae.

## 219 G. X. DYSTOCIA.

Dolorifica, laboriosa ultra modum foetus exclusio aut secundinarum, vel penitus impossibilis.

## 220 G. XI. DYSHAEMORRHOIS.

Est suppressio suetarum haemorrhoidum; dum fluxus haemorrhoidum suetarum periodicus saepius supprimitur, ex quacunque



occasione, ante annum circiter 60, 65, quo hic fons sponte siccare solet; oriuntur lumbago, ischias, vertigo, cephalalgia, tensio cervicis, anxietas, dyspnoea, colica, &c. Haemorrhoidum fluxus, qui ultra 65. annum aetatis protelatur, jam morbosus haberi debet et supprimi minuere; senectus enim hunc fluxum non fert. Haemorrhoids rarissime cum constantia sanitatis observatur; hinc vix pro beneficio haberi potest, licet morbos graviores praevertere dicatur.

## 221 G. XII. OBSTIPATIO.

Faecum alvi exoneratio impedita. Carolus *Linnaeus*; est nimirum segnis, difficilis, rara faecum alvi excretio, vel plane nulla etiam medicamentis prolici possunt excrementa: Medici assiduo curant obstipationem, et tamen hanc nec in numero morborum tolerant; ecquidem raro est morbus per se, saepissime vero symptomata hoc alios morbos comitatur et auget.



# CLASSIS VII.

## SPASMI.

CHAR. CLASSIS. Contractio constans, vel interpolata, musculorum motum localem efficientium, eaque invita.

### O. I. SPASMI TONICI PARTIALES.

Rigiditas organi, vel artus determinati.

#### G. I. STRABISMUS.

222

Oculi alterutrius spasmus, tonicus axium optitorum divergentiam, vel convergentiam nimiam inferens ; seu est spasmus tonicus oculi, unde hujus axis cum alterius axi ad unum objectum non convergit.

#### G. II. TRISMUS.

223

Est spastica contractio tonica, aliquando visa fuit solum clonica maxillae inferioris, vulgo *trotura oris* dicitur ; rusticus venerat ad me pedes trismo tonico laborans pro consilio, contra hunc morbum ; datur

igitur solitarius hicce morbus; vide *tet-  
anum*.

224 G. III. OBSTIPITAS.

Est colli spasmus, vulgo dicitur *torticollis*,  
tonicus, vel clonicus capitis mobilitatem  
et directionem mutans.

225 G. IV. CONTRACTURA.

Est artus unius vel plurium constans, diu-  
turna rigiditas, inflexibilitas.

226 G. V. CRAMPUS.

Est subitanea, fugax, et dolorifica musculi ri-  
giditas, cum dolore subin atroci.

227 G. VI. PRIAPISMUS.

Est penis ingrata et sine appetitu libidinis ri-  
giditas seu, erectio.

## O. II. SPASMI TONICI GENERALES.

228 G. VII. TETANUS.

Spasmus generalis tonicus subito ortus, cum  
dyspnoea; rigent musculi omnes, et cor-  
pus inflexile servant, cum dyspnoea et ru-

bore faciei; vel rigent muscoli soli posteriores corporis, aut anteriores, et corpus flectunt horribiliter, et plerumque flexum servant diutius.

G. VIII. CATOCHUS.

229

Spasmus generalis tonicus sensim factus, sine dyspnoea, agitatione pectoris, faciei rubore, chronicus.

O. III. SPASMI CLONICI  
PARTIALES.

Agitatio invita et coacta cujusdem organi aut artus, cujus motivum ab aegro non percipitur.

G. IX. NYSTAGMUS.

230

Spasmus clonicus oculi, vel palpebrae.

G. X. CARPHOLOGIA.

231

Est spasmus clonicus manuum, quo aegri floccos e tegumentis evellunt, paleas colligunt, muscas venantur; symptoma hoc a suffusione natum plerumque est lethale.

## 232 G. XI. SUBSULTUS.

Est motus palpitans aut tremulus tendinum,  
pone carpos potissimum observabilis.

## 233 G. XII. PANDICULATIO.

Est spasmus artus successive extendens plu-  
res, vel omnes in oscitatione.

## 234 G. XIII. APOMYTOSIS.

Est succussio cutis et capitis, cum trunci toti-  
us agitatione tremula et violenta; adest fi-  
mul exspiratio sonora, quasi stertorosa.

## 235 G. XIV. CONVULSIO.

Est agitatio invita artus, vel musculi brevis  
cum superfluo exercitio animi.

## 236 G. XV. TREMOR.

Artuum aut capitis alterna, per itus et redi-  
tus frequentes, motitatio per brevissimas  
spatiola, cum movendi voluntate concurrens,  
qua cessante, cessat quoque tremor.

## 237 G. XVI. PALPITATIO.

Est pulsatio in regione cordis insolita, cum  
pulsu intermittente, crapizante, tremulo,  
subduro, inaequali, inordinato, debili, quan-  
doque et dyspnoea ad quemlibet motum

notabili ; habeo aegram, cujus pulsus sub actuali palpitatione remittit, vel intermittit, in 5 annum jam hoc ex morbo languentem ; subin tremorem in praecordiis patitur, cum pulsu caprizante, tremulo ; notum est, quod regularis pulsatio cordis non dicatur palpitatio.

## G. XVII. CLAUDICATIO.

238

Est vitiosus gradiendi modus, quo truncus singulis passibus huc vel illuc nimium inclinatur, unde crus indecore movetur, trahitur.

D. IV. SPASMI CLONICI  
GENERALES.

## G. XVIII. PHRICASMUS.

239

Est succussio invita totius cutis, imo saepius totius corporis, frigorifera.

## G. XIX. ECLAMPSIA.

240

Est morbus convulsivus clonicus acutus, quandoque remittens, cum sensuum fermentatione in paroxysmo ; pollices intro non

premunt, spuma ex ore non eructat, spasmi sunt tremuli artuum omnium; vulgo vocatur hic morbus *apoplexia puerilis*.

# 241 G. XX. EPILEPSIA.

Est morbus spasmodicus clonicus, intermittens, seu periodicus, chronicus, cum variorum membrorum invita agitatione, dyspnoea, spumae oris eruptione, pugnorum constrictione, et sensuum feriatiōe exter-  
norum et internorum, sine asphyxia.  
*Symptomata:* Subitaneus casus, obliuio omnium, clamor, mugitus, stridor dentium, truculentia oculorum, spuma oris, pugnorum constrictio, totius corporis agitatio.

# 242 G. XXI. HYSTERIA.

Est artuum organorumque externorum internorumque spasmus clonicus tonicusve, paroxysmis fugacibus, leviter variantibus, cum pusillanimitate, sensibilitate animae summa, mortis formidine intensa, teneritudine partium convulsarum remanente, attactum fugiente, et urina hyalina. Signa pathognomica hujus morbi statuit Ill. Astruc agitationem matricis, pnycem, con-

strictionem pectoris et glomum fluctuantem in abdomine.

## G. XXII. S C E L O T Y R B E.

243

Est motus semivoluntarius unius lateris, vel totius corporis in gressu, situ erecto, aut comestione, gesticulationem, aut ridiculam histrionis festinationem, referens; hunc morbum vocavit *Sydenhamus Choream Sancti Viti*.

## G. XXIII. B E R I B E R I A.

244

Est motus gradientium genua spastice retrahens, cum tremore artuum, formicationis sensu, vocis raucedine, stupore dolorifico artuum, qui morbis Indis est familiaris. In ovibus olim lupum videntibus beriberiam spasmus vidi, stantes hae vel gradientes tristes momentanae retrahunt genua, ad situm naturalem illico reditura.



## CLASSIS VIII.

## ANHELATIONES.

CHAR. CLASSIS. Est agitatio invita, defatigans musculorum pectoris, cum respiratione difficili, laboriosa, sonora, frequenti, sine febre notabili, et sine phlegmasia.

O. I. ANHELATIONES  
SPASMODICAE

Sunt symptomata fugacia spasmodica, saepius repetentia, quae consistunt in ex vel inspirationibus sonoris.

## 245 G. I. EPHIAENTES.

Morbus hic recurrens afficit dormientes cum anhelatione et insomnio corporis cujusdam pectus opprimentis; unde respiratio horum querula, gemebunda, et anxia.

## 246 G. II. STERNUTATIO.

Est violenta, sonora, et subitanea exspiratio in nares posticas immisso aëre, ad nares everrendas sub convulsiva capitis et trunci corporis concussione, ad anteriora flexa



ione. Species sunt sternutationis, *catarrhalis*, *rubeolosa*, *verminosa*, *spontanea*, *febricosa*, *epidemica*, *critica*, *medicamentosa*, &c.

### G. III. OSCEDO.

247

Est aëris copiosi profunde inspirati diutina, lenta, et invita naturalis exspiratio, cum magno oris hiatu; saepe concurrit et pandiculatio.

### G. IV. SINGULTUS.

248

Est concussio diaphragmatis invita, cum inspiratione subito interrupta, sonora.

### G. V. TUSSIS.

249

Est concussio sonora, violenta, invita pectoris, cum exspiratione ad pulmonem quodam obice liberandum.

## O. II. ANHELATIONES SUPPRESSIVÆ.

Hæ fiunt cum metu suffocationis, suntque pleraque constantes.

## 250 G. VI. STERTOR.

Est respiratio sonum gravem et tremulum in gutture edens, saepius sibilo stipata.

## 251 G. VII. DYSPNOEA.

Est difficultas respirandi assidua et chronica, sine signis empyematis, hydrothoracis.

## 252 G. VIII. ASTHMA.

Est chronica, periodica respirandi difficultas.

## 253 G. IX. ORTHOPNOEA.

Est morbus continuus acutus, subitanea anhelatione sublimi, et fere suffocatoria, stipatus.

## 254 G. X. PLEURODYNE.

Anhelatio, cum pectoris dolore, sine phlegmasia, cum exigua vel nulla febre.

## 255 G. XI. RHEUMA.

Cognoscitur ex difficultate respirandi, cum sensu gravitatis in pectore, quam comitantur coryza, sternutatio, rauco, cephalalgia, tussis, sine pyrexia notabili, et sine sanguine inflammato; *endemiis hic morbus*

## 256 G. XII. HYDROTHORAX.

Est genus anhelationis chronicum continuum stipatum phlegmasia pedum, pallore faciei

oedemate manuum, subita in somno suffocatione, alterutrius manus stupore, sine signis empyematis; haec symptomata jam adfunt omnia, jam tantum aliqua; anhelatio crescit pro inclinatione corporis.

## G. XIII. EMPYEMA.

257

Est difficultas respirandi a pectoris reclinacione crescens, quam praecessit phlegmasia pectoralis non resoluta, sed suppurata; comitatur amphimerina tabida notabilis, macies, decubitus horizontalis et in latus sanum difficilis, gravitas supra diaphragma, sudores profusi, rubor genarum, et multa symptomata hydrothoracis: Species sunt, *peripneumonicum*, *vomical*, *pleurale*, *mediastinale*, *diaphragmaticum*, *intercostale*; quas species sufficiat hic nominasse, quum earundem historia necdum satis provecta sit.

# CLASSIS IX.

## DEBILITATES.

CHAR. CLASSIS. Est impotentia clare et distincte sentiendi, appetendi, consueta vi artus organave movendi, nec non imaginandi, vigilandi, sensibus internis et externis utendi.

### O. I. DYSÆSTHESIAE.

Impotentia clare et distincte sentiendi.

#### 258 G. I. AMBLYOPIA.

Est visus debilitas respectiva ad situm, gradum lucis, distantiam objecti, oculis pellucidis; vel est debilitas visus absoluta, vel respectiva, sine opacitate corneae, aut vitio internarum partium oculi.

#### 259 G. II. CALIGO.

Est imminutio partialis, vel totalis deletio visus, propter repagulum opacum citra seu ante pupillam oculo inhaerens, aut palpebris.

## G. III. CATARACTA. 260

Est visus debilitas, vel abolitio, ob maculam opacam, post pupillam positam, seu opacitatem lentis crystallinae.

## G. IV. AMAUROSIS. 261

Est visus suppressio, abolitio, vel defectus, cum pupillae ferme plenaria immobilitate, sine sensibili oculorum vitio aut opacitate externis.

## G. V. ANOSMIA. 262

Est imminuta, vel suppressa facultas percipiendi odores.

## G. VI. AGHEUSTIA. 263

Est suppressio facultatis, qua diversos sapores percipimus, cum vel sine anorexia.

## G. VII. DYSECOEA. 264

Est audiendi difficultas, seu gravis auditus et obscura perceptio sonorum.

## G. VIII. PARACUSIS. 265

Est debilitas seu confusio auditus, qua affecti clare percipiunt voces, sed non distincte diversos sonos et articulatas voces audiunt, vel alios sonos clare et distincte audiunt, alios tantum clare sine distinctione.

## 266 G. IX. C O P H O S I S.

Est obscura, vel nulla sonorum perceptio, seu impotentia percipiendi sonos totalis, vel partialis.

## 267 G. X. A N Æ S T H E S I A.

Est sensus omnis privatio, superfluitibus motu musculari et rerum necessariarum appetitu aliquantum minutis, sine omni sopore.

## O. II. A N E P I T H Y M I Æ.

Appetuum sensitivorum debilitas, seu imminutio notabilis.

## 268 G. XI. A N O R E X I A.

Est notabilis debilitas, imminutio, seu cessatio famis in jejunis animantibus.

## 269 G. XII. A D I P S I A.

Est sitis debilitas, seu imminutio, aut abolitio.

## 270 G. XIII. A N A P H R O D I S I A.

Est debilitas, vel abolitio appetitus venerei, seu impotentia: Vide *sterilitatem*.

## O. III. D Y S C I N E S I Æ.

Impotentia exercendi motus solitos voluntati subjectos.



G. XIV. M U T I T A S. 271

Est impotentia proferendi voces articulatas.

G. XV. A P H O N I A. 272

Est plenaria vocis suppressio, citra stuporem, syncopen, et comata; muti inarticulatam vocem habent, aphonici contra nullam.

G. XVI. P S E L L I S M U S. 273

Est difficultas seu impotentia quasdam syllabas literasve recte pronunciandi, faciunt hoc puellae quaedam naviter, ut magis placeant procis.

G. XVII. C A C O P H O N I A. 274

Est vocis vitium et insuavitas atque asperitas.

G. XVIII. P A R A L Y S I S. 275

Est unius tantum artus, vel articuli frigida plerumque laxa immobilitas, absque dolore, cum vel sine anaesthesia; *paresis* est sensum invadens debilitas movendi artus, seu est imperfecta paralytis; movent enim hi artus, sed difficulter; colicam plectonum aliasque rachialgiae species comitatur, vel sequitur paresis, lente accedit paretica debilitas, et non est tanta, quanta observatur

paralyticorum ; actu observo paresin in brachiis egregii chirurgi Christophori Nohrer, ex colica pictonum laborantis.

276 G. XIX. HEMIPLEGIA.

Cognoscitur ex summa debilitate, vel integra motus muscularis suppressione unius lateris corporis, cum laxitate, frigiditate, indolentia artuum et mentis integritate, sine vel cum anaesthesia.

277 G. XX. PARAPLEXIA.

Est paralyxis artuum inferiorum, vel omnium artuum, cum enuresi, anaphroditia, quandoque et anaesthesia ac marasmo.

O. IV. LEIPOPSYCHIAE

Virium vitalium, pulsus, et respirationis debilitas seu imminutio ; *pulsus est perpendicularis vitae.*

278 G. XXI. ASTHENIA.

Est debilitas omnium artuum, superstitie actionum vitalium minutarum tenore, superstitibusque sensibus, sine dolore.



## G. XXII. LIPOTHYMIA.

279

Est subitanea et brevis virium muscularium et sensuum dejectio, seu eclipsatio, superstita pulsu et cognoscendi aliqua facultate adstantes, cum aurium tinnitu, calore, vertiginosaque capitis turba.

## G. XXIII. SYNCOPÉ.

280

Est subitanea virium omnium animalium, et vitalium sensuumve, imminutio tanta, ut aeger per tempus sui conscius non sit, cum lenta lenive respiratione, pulsu obscuro, sudore frigido, et aliquali interiorum calore.

## G. XXIV. ASPHYXIA.

281

Est subitanea eclipsis omnium actionum naturalium, animalium, et vitalium, cum mortis imagine: Vide Cl. *Lancisium* circa mortes subitaneas.

## O. V. COMATA SEU MORBI SOPOROSI.

Omnium sensuum feriaciones, maximae debilitates.

## 282 G. XXV.      CATALEPSIS.

Est sensuum omnium motuumque muscularium suppressio, pulsu et respiratione pacatis, placidis, lentis, minutis, vel obscuris, cum mira ad quosvis situs suscipiendos, et retinendos artuum flexilitate, aptitudine; retinent figuram, in qua ipsosprehendit morbus, et omnem recipiunt servantque, quam illis dederis; morbus est recurrens, et fors tantum mulierum.

## 283 G. XXVI.      ECSTASIS.

Est status soporofus a gravi pathemate, vel mentis attentione profunda ortus, aegrum in eodem situ, quo prehensus est, retinens, sine aptitudine cataleptica.

## 284 G. XXVII.      TYPHOMANIA.

Est sopor apparens, cum pervigilio delirioso reali, mustratione; vel est sopor levis quo aegri facile excitantur, cum delirio comitante.

## 285 G. XXVIII.      LETHARGUS.

Est status soporofus facile excitabilis, cum summo imaginationis et memoriae torpore, oblivione, et febre.

## G. XXIX. CATAPHORA. 286

Est somnolentia facile excitabilis, sine febre, oblivione, stertore, delirio.

## G. XXX. CARUS. 287

Est somnus altissimus, vix aut ne vix excitabilis, sine stertore, cum respiratione tacita pacatissima; morbus saepius est acutus; semi-apertis oculis plerumque dormiunt omnino immobiles.

## G. XXXI. APOPLEXIA. 288

Est somnus profundissimus, vix aut ne vix excitabilis, cum stertorosa respiratione, faciei tumore, omnium artuum laxitate, et pulsu plerumque duro, forti.

# CLASSIS X. EXANTHEMATA.

CHAR. CLASSIS. Febris cum asthenia, efflorescentia cutis maculata varia, pustulosa, papulosa, phlyctenoidea, &c. vel cavi oris, saepius maligna.

## ORDO I. EXANTHEMATA CONTAGIOSA.

### 289 G. I. PESTIS.

Eruptio purpurae, bubonum, anthracum, pemphigi, cum pyrexia typhode, maligna, dat characterem pestis: Vide celebrem Loimographum *Diemerbroeckium*.

### 290 G. II. VARIOLA.

Praeludium variolae patefit cephalalgia, lum-  
bagine, nausea, vomituritione, eclampsia,  
et febre continua inflammatoria; erum-  
punt dein pustulae phlegmonoideae sup-  
purantes, escharoticae, deciduae, cicatri-  
fantes; variola saepissime epidemicus mor-

bus habet IV. stadia, nempe contagium, eruptionem, seu inflammationem pustularum, suppurationem, tandem exsiccationem.

## G. III. PEMPHIGUS.

291

Est phlegmasia saepius acuta, exanthematica, stipata bullis seu vesiculis avellanam circiter magnitudine aequantibus, sero flavo turgidis, per cutim sparsis: An *Hippocratis* T. I. p. 684. ichores constituerint pemphigum? Tomo citato, p. 798. *Hippocrates* scripsit: 'πυρετοι οἱ δὲ πεμφιγώδεις.' Et *Claudius Galenus*, sexto epidemiorum T. I. Classe 3. p. 311. Basilea 1561, inter reliquas interpretationes hujus febris, etiam hanc admisit, quae est character hujus generis; nihil ergo novi pemphigus.

## G. IV. PURPURA.

292

Sunt maculae pulicum moribus similes, faciei parcentes, pressione non evanescentes, carentes stigmate aculei a pulice infixi, coloris purpurei, lateritii, nigri, lividi, sine tumore, aspredine, cum febre amphimerina, vel tritaeophya, putrida, asthenia, lingua plerumque rubra, lateritia, molli,

Post praeludium catarrhosum, coryzam, epiphoram, tussim, cephalalgiam, somnolentiam, et palpebrarum tumorem, erumpunt papulae corymbosae rubrae, pulicum morfus aemulantes, asperae, uniformes, evanescenti-furfuraceae die IV. cum exiguo levamine symptomatum contagii in facie, collo, thorace, trunco reliquo, et artubus; quandoque sexto die in facie jam asperantur, siccantur, et in tenuissimum furfurem fatiscit epidermis; et hoc est initium tertii stadii, quod ordinario 8. vel 9. die, una cum morbo, finitur; febris comitatur rubeolam continua; rubeolam porro inoculat atmosphaera morbilloso bronchiis, sacco lacrymali, et sinubus sex internares patentibus; medici contra seminatores rubeolae gossypium furfure morbilloso repletum sublimi vulnuscule, cujusque brachii imponunt, emplastro omnia tegunt, et 6. die post appositum hunc apparatus incipiunt aegrotare.

## G. VI. SCARLATINA.

294

Est efflorescentia maculosa, ruberrima, pruriens, papulosa, irregularis, diffusa, desquamabilis, sine praeludio catarrhali efflorescens, cum febre plerumque judicatoria. Stadia tria scarlatinae observamus, praeludium noscimus inde, quod febris plerumque judicatoria, cum horrore et frigore, prehendat infantes, sub finem aestatis, sine praeludio catarrhali et sine vomitu; quarto vel citius die, facies intumescit modice, pectus, &c. erumpunt exanthemata paulo ante descripta, et hoc est stadium secundum; post 3 vel 4 dies incipit stadium tertium, in quo evanescunt exanthemata, et epidermis sub forma subtilis pollinis desquamatur.

O. II. EXANTHEMATA  
NON CONTAGIOSA.

## G. VII. MILIARIS.

295

Eruptio phlycthaenarum milii semine raro majorum, cum sudore vapido; febris



continua, vel remittens, putrida; praeludit oppressio praecordiorum, gastrodynia gravans, pulsus suppressus, urina minus tincta, lingua plerumque alba, mollis, asthenia; perstant in cute 4, 5, 6, 7, 9, 11, &c. diebus, et cum pruritu, sudore solvuntur, in farinam subtilem disparent. *Hippocrates*, T. I. p. 697. describit miliarum et quidem criticam, seu servantem mulieres omnes, quarum cutim obsederat haec efflorescentia. *Silenus* insuper indubie 8. die morbi miliari rubra maculatus fuit, T. I. p. 674.

# 296 G. VIII. ERYSIPELAS.

Est eruptio erythematis cum febre continua, vel amphimerina potius dicenda, tumiduli, superficialis, dilatibilis, desquamabilis; sistit nimirum maculas latas, amplas, subtumidulas, non suppurabiles; sanguis missus crusta inflammatoria non est tectus, sed pelle alba, tenui, et sat tenaci; dolor erythematis est calens, rodens. Tria stadia observantur erysipelatis: *Primum* absolvit gravedo, horror, inappetentia, lassitudo.



tudo, cum febricula amphimerina; die 2. 3. vel 4. incipit secundum stadium, eruptio, nempe, erythematis, quod ordinario in 4. usque diem augetur; in tertio stadio collabitur successive tumor, calor, et dolor erythematis, et epidermis desquamatur, quod opus plerumque 4 diebus Natura absolvit.

G. IX. E S S E R A.

297

Constituunt hoc genus maculae rubellae impruriginosae, non fastigiatae ultra libellam cutis, magnitudinis grani tritici, zaeae, subito erumpentes ferme sine febre, et post 4, 5, 7, 9, 11, 14, dies sponte et sine desquamatione epidermidis disparentes; quandoque sunt paucae, subin contra numerosae; aegri sunt plerumque orthostadii; praecedit eruptionem nox inquieta, leves anxietates; cutis, exstante essera, non est aspera ad attactum, nec rubedo est diffusa; maculae aliae sunt majores; aliae minores, sub epidermide latentes; hujus morbi meminit *D. Allen*, p. 407. ubi tamen non hunc, sed alium descripsit; *Cl. D. Lieutaud*, T. I. p. 614. unam speciem descripsit hujus generis.

Cognoscitur aphtha papulis seu phlycthaenis  
 . linguae, faucium, oris superficiem occupan-  
 tibus, subrotundis, plerumque semiline-  
 aribus, colore albis in disco, cum radio  
 saepius rubro, vel rubris, brunneis, flavis,  
 lividis, nigris, et febre tritaecophya, vel ob-  
 scura hectica, aut penitus nulla; adest si-  
 mul somnolentia, dolor urens oris, et diffi-  
 cultas in masticatione, suctione, ac degluti-  
 tione. Aphtha 4 stadia habet distincte, si-  
 non omnibus speciebus, in febrili observa-  
 bilia; Stadium *primum* sese prodit lassitu-  
 dine spontanea, levi dyspnoea, gastro-  
 dynia, anxietate exigua, somnis turbatis, et  
 calore oris; Stadium *secundum* propul-  
 sio papularum nobis adesse loquitur.  
 In stadio *tertio* elewantur papulae seu ma-  
 culae in phlycthaenas miliares, quae pro-  
 babiliter sunt idem cum miliaribus cutis;  
 Stadium *quartum* absolvit desquamatio  
 epidemii, cum dolore sensibilissimo linguae  
 et faucium superficiali.

## C L A S S I S    X I.

## P H L E G M A S I Æ.

CHAR. CLASSIS. Febris quasi semper continua, cum pulsu duro, dolore topico, alijus partis inflammatione, sanguine crusta inflammatoria tecto, urina plus colorata, lingua sub sicca, sicca, calente, &c. *Hippocrates*, T. I. p. 810. 811. reliquit: Lingua concolor attingentibus, ipsam humoribus: Quapropter per hanc humores cognoscimus.

O. I.    P H L E G M A S I Æ  
M U S C U L O S Æ.

## G. I.    P H L E G M O N E.

299

Cognoscimus phlegmonem ex febre acuta continua inflammatoria, pulsu duro, sanguine crusta inflammatoria tecto, et partis externae inflammatione; pars externa phlegmone affecta calet, rubet, dolet, tumet, est simul tensa resplendens sphaeroides; cutis ipsa et partes sub ipsa contentae inflammatae sunt; phlegmone in supurationem tendit, neutiquam vero erysipelas.

## 300 G. II. CYNANCHE.

Est phlegmasia acuta pharyngis, laryngis, dyspnoeam et dysphagiam inducens, cum pyrexia acuta, faucium rubore, calore, dolore, tumore, quae adesse docet inspectio in fauces, depressa lingua.

## 301 G. III. MYOSITIS.

Febris acuta inflammatoria, dolores in diversis musculis artuum, eorundemque involucribus, diu noctuque discruciantes, motum vetantes ferme omnem, ad noctem exacerbantes; sanguis missus est tectus crusta inflammatoria subgelatinosa, vel pelle tenui tenaci; hic morbus vulgo audit rheumatismus acutus.

## 302 G. IV. CARDITIS.

Adest dolor constans sub sternone in regione cordis urens, flammam vitae extinguens, cum palpitatione, frequentibus animi deliquiis, pulsu jam magno, duro, per momenta, jam parvo, frequente, inaequali, inordinato, intermittente; febre acuta typhode et anxietatibus; cor manu tenentes aegri fugitivis oculis et mille jactationibus agitati, sibi comburi, illudque mori quaeruntur, clamant.

## O. II. P H L E G M A S I Æ M E M B R A N A C E Æ.

### G. V. P H R E N I T I S.

303

Est phlegmasia acuta, cum pyrexia et delirio perpetuo, a cephalalgia atroci plerumque incipiens; delirium quandoque est audax, urina plerumque citrina, cum nebula sublimi.

### G. VI. D I A P H R A G M I T I S.

304

Est phlegmasia cum dolore obscuro ad costas spurias, oppressione pectoris, sputis saepe cruentis, orthopnoea, anxietate; cingulum praecordia stringens quaeruntur aegri; angulos oris semivoluntarie saepe retrahentes delirant; quandoque lethargo, vel cataphora laborant; pulsus est inaequalis, inordinatus, intermittens, durus; hypochondria intro tracta, respiratio sine motu diaphragmatis; facies jam pallet, jam rubet; calor est urens ad praecordia internus; scripsi sicut observavi in meis aegris: Vide *Hippocratem*, T. II. p. 101. IX.

### G. VII. P L E U R I T I S.

305

Est phlegmasia cum pyrexia acuta, dysp-

noea, dolore pectoris plerumque puncto-  
rio, et tussi molesta dolorem augente, sine  
gravitate in medio pectore; sedes morbi  
in 300 pleuriticis denatis a *P. Servio Ro-*  
*mano* in pleura pulmonali inventa est;  
invenit, nimirum, pleuram pulmonis super-  
ficiem investientem, cum superficialibus  
et extremis vasis pulmonis, inflammata.

306 G. VIII. GASTRITIS.

Est phlegmasia stipata dolore epigastrii, ar-  
dore, tensione, siti, nausea, vomitione, sin-  
gultu, et pyrexia acutissima.

307 G. IX. ENTERITIS.

Est phlegmasia acuta, cujus symptomata sunt  
tensio tumida et valde dolorifica, tactum  
non tolerans, partium abdominis intestinis  
respondentium, cum pyrexia, meteorismo,  
quandoque et ileo, vel dysenteria.

308 G. X. EPIPLOITIS.

Bis observavi hanc phlegmasiam, semel in  
viro rustico 30 annorum, et semel in qua-  
dragenaria muliere, cum sequente charac-  
tere: Febris erat mitis amphimerina, vi-  
rium non adeo magna prostratio (rusticus  
venerat ipse 4ta die morbi pro consilio



ad me) lingua alba tumidula, sanguis missus coriaceus, obstipatio non pertinax, dolor obtusus infra peritonaeum ad contactum paululum acutus, tumor omenti, respiratio suspiriosa, pulsus durus naturali celeritate et frequentia non multum major, sitis mediocris, urinae flavae, appetitus aliquis, aliquis et somnus.

## G. XI. CYSTITIS.

309

Est phlegmasia, cujus praecipua symptomata sunt intumescencia ovalis in pelvi, cum tensione, dolore tactum non tolerante, dysuria, vel ischuria et pyrexia amphimerina; adsunt insuper vigiliae, sitis, subinde delirium, extremorum frigus, tenesmus, vel obstipatio; pulsus observavi tensum, subdurum, naturali frequentia et celeritate non multum majorem; in sanguine missocrustram tenuem albam, subgelatinosam, clysmatum difficilem injectionem: Scribo sicut observavi.

O. III. P H L E G M A S I A E  
P A R E N C H Y M A T O S A E.

## G. XII. CEPHALITIS.

310

Est phlegmasia, in qua mentis stupor, som-

nolentia, sopor cataphoricus, carphologia adfunt, cum pyrexia acuta typhode; pulsus fucceffive mollefcit, cum frequentia fine celeritate; aegri funt admodum debiles; lingua plerumque mollis, fudor quafi perpetuus; caput faepe manibus impetunt, fricant etiam deliri. Ter obfervavi jam hunc morbum, et poft mortem in cujuflibet aegri cadavere fuppurationem cerebri inveni; respirabant hi aegroti cum fonitu fine ftertore.

### 311 G. XIII. PERIPNEUMONIA.

Pyrexia acuta, dyfpnoea gravis, fenfus oppreffionis gravativae fub fterno, calor et anxietas in pectore, tuffis cruenta, facies rubra, lingua rubra tumidula; pulsus in incremento magnus, fub infpiratione remittens, vel penitus intermittens, ad finem morbi mollis.

### 312 G. XIV. HEPATITIS.

Eft phlegmafia acuta, cujus fympptomata funt tenfio dolorifica hypochondrii dextri fub coftis fpuriis, cum fenfu ardoris ac gravitatis, dyfpnoea, tuffi ficca, faciei colore fla-



vescente, siti, anorexia, saepius et singultu, vomitione et tumore hepatis; pulsus est subdurus, tensus; urinae icteritiae, bilio-sae; serum sanguinis missi et crusta subflava; febris quasi semper remittens.

#### G. XV. SPLENITIS.

313

Cognoscitur haec phlegmasia febre remittente, saepius tetartophya, tumore, durtie in regione lienis, dolore tactum fugiente pulsatili, calore, dyspnoea, pulsu in inspiratione intermittente in carpo sinistro magis, et absentia symptomatum nephriticorum; frigent hi aegri artubus; calor internus non est adeo magnus; sanguis missus est crusta inflammatoria tectus; cibi adest fastidium, decubitus in latus sinistrum difficilis, sitis et anxietas: Semel observavi hunc morbum sicut illum hic descripsi.

#### XVI. NEPHRITIS.

314

phlegmasia pyrexia acuta, dolore renum inflammatorio, urinae ardore, mictione frequenti stipata; dolor sequitur ureteres, costis retrahitur, rotatur, crus stupet, ple-

rumque adest vomitio, sine augmento doloris aeger potest corpus ad anteriora flexum erigere.

### 315 G. XVII. METRITIS.

Hanc phlegmasiam adesse noscimus tumore, ardore, dolore, gravitate in regione uteri, et pyrexia acuta; digitum in vaginam immissi os uteri tactum non fert, idem valde calet; adest dolor ad inguina, femora, diaphragma, qui ad claviculas extenditur, cum dyspnoea, nausea, vomitione, singultu, obstipatione, ischuria, vel dysuria, horrore perpetuo, frigore extremorum, delirio, jactatione, spasms, dolore oculorum, pulsus varius, animi deliquia, sopor, tetanus, catalepsis observantur, cum febre plerumque remittente.

## C L A S S I S XII.

## F E B R E S.

CHAR. CLASSIS. Pulsus frequens, celer, fortis ; respiratio celeritate, magnitudine, frequentia aucta, viribus artuum minutis ; vel virium vitalium augmentum, aut saltem in statu sanitatis perseveratio, viribus artuum notabiliter minutis.

## O. I. FEBRES CONTINUÆ.

Pyrexia semel crescit, et semel decrescit, in decursu aegritudinis.

## G. I. JUDICATORIA.

316

Ingruit tota febris subito cum frigore, calore, capitis dolore, &c. pulsu aliquo critico, aut evacuationibus criticis, vires artuum parum sunt minutae, vires contra vitales multum auctae, criticae; absolvitur 4 diebus.

## G. II. HUMORARIÆ.

317

Cognoscitur haec febris pulsu irritationis, incremento successivo usque IV. V. VII. vel IX diem, duratione morbi usque VII. IX.

XI. vel XIV. diem, notabili debilitate artuum, vehementibus symptomatibus, et humorum augmento, aut vitio, unde notatur.

### 318 G. III. FRIGERARIA.

Est febris continuæ genus, quæ decurrit ad XVII. XXI. vel XXX. diem, incrementum habet longius præcedente; ingruit cum pulsu irritationis; pulsu et respiratione auctis, viribus artuum multum minutis; notabili frigore sæpe et rigore, unde *Frigeraria*; lingua est sordida, excreta omnia foetida, a statu naturali multum distantia; hæc est febris proprie *putrida*.

### 319 G. IV. TYPHUS.

Est febris continuæ genus, quæ plerumque ultra tres septimanas durat, cum calore jam magno, jam nullo, urina et pulsu sanorum similibus, artuum summa debilitate; pulsus quandoque rarior est quam pulsus sanus, color cutis pallidus, squalidus, exanthemata varia huic morbo superveniunt epigenomena.

## G. V.      HECTICA.

320

Est febris continua, quae chronicorum morborum more sensim extendi suevit per plures septimanas, imo menses, sine notabili virium prostratione, cum exigua pulsus frequentia; urina saepius est turbida, pelliculam innatantem pinguem gerit; pulsus est subdurus, post partum frequentior, calor ad contactum est mordens; sudores nocturni; febris haec, nullam habens exacerbationem notabilem, differt ab omni amphimerina, phthisi, et tabe, quia suppurationem pro causa non habet; aegri sunt plerumque orthostadii.

## O. II. FEBRES REMITTENTES.

Sunt febres continuae cum exacerbationibus quotidianis, tertianis, quartanis, &c

## G. VI.      AMPHIMERINA.

321

Est febris continua, cum exacerbationibus quotidianis sibi similibus.

## G. VII.      TRITÆOPHYA.

322

Est febris continua, cum exacerbationibus tertianis.

## 323 G. VIII. TETARTOPHYA.

Est febris continua, cum exacerbationibus quartanis, seu quartanae typum fervantibus.

## O. III. FEBRES INTERMITTENTES

Pyrexia in decursu aegritudinis pluries penitus deserit aegrum, et redit cum intervallis mediis lucidis servata periodo.

## 324 G. IX. QUOTIDIANA.

Febris intermittens, cujus paroxysmi similes redeunt nycthemeris singulis.

## 325 G. X. TERTIANA:

Est febris intermittens, cujus paroxysmi alternis diebus sibi similes repetunt, seu circuitum servant; urinae lateritiae sunt optimum signum febrium intermittantium.

## 326 G. XI. QUARTANA.

Est febris intermittens, cujus paroxysmi sibi similes quarta quavis die abeunt, et revertuntur; inter quoslibet duos paroxysmos intercedunt duae dies apyretae.

G. XII.

ERRATICA.

327

Haec febris distinguitur ab aliis generibus per accessus similes pluribus diebus ab invicem distantes quam duobus, nec proinde ad priora genera referri potest.

U u



# CLASSIS XIII. VESANIÆ.

CHAR. CLASSIS. Morbus mentis, seu error in imaginatione, appetitu, iudicio, vel memoria.

## ORDO I. HALLUCINATIONES

Imaginationes deceptivæ ex errore organi vel mentis natae.

### 328 G. I. VERTIGO.

Est hallucinatio, qua objecta, licet quiescentia e loco moveri, nutare, vel in gyrum verti fari, nobis videntur, ipseque aeger quandoque sibi nutare videtur; dicta phaenomena etiam clausis oculis plerique patiuntur.

### 329 G. II. SUFFUSIO.

Est genus morbi imaginarii, cujus praecipuum symptoma est hallucinatio visus cir-



ca objecta videntis corpora, quorum prototypus extra oculos non existit; suffusio repraesentat corpora quae non sunt, et vertigo motum corporum, quo actu non aguntur.

### G. III. DIPLOPIA.

330

Est hallucinatio, qua affecti idem objectum geminatum, aut multiplicatum, videntur sibi videre.

### G. IV. SYRIGMUS.

331

Est error imaginationis sonos, qui extra aurem non sunt, sibi repraesentantis, a commotione vibratoria organorum acoustico-  
rum per principia in aure latentia natos.

### G. V. HYPOCHONDRIASIS.

332

Est delirium circa propriam valetudinem, natum ex philautia, salvo ratiocinio de reliquis, delirant et desperant de sua valetudine recuperanda ob ructus, borborygmos, palpitationes, tremorem praecordiorum, fugaces vertigines, flatulentiam, &c. Hinc hi persuasi fatum lethale sibi imminere, omnia symptomata et minimas mutationes

in corpore suo scrupolose observant, narrant, et describunt medicis, suisque querulis, alios mox et alios defatigant, ingenio caeterum et appetitu pollentes.

### 333 G. VI. SOMNAMBULISMUS.

Est dormientium hallucinatio, somniantes, nempe, ob imaginationem vividissimam, sopitis somno sensibus, motus musculares exercent, surgunt e lecto, variis periculis sese exponunt, tecta scandunt, iter suscipiunt.

## O. II. MOROSITATES.

Cupiditates, vel aversiones depravatae.

### 334 G. VII. PICA.

Est alimentorum inassuetorum, vel rerum indigestibilium, appetitus, cum assuetorum aversione.

### 335 G. VIII. BULIMIA.

Est appetitus majoris alimentorum digestibilium et solitorum copiae, quam quae a viribus ventriculi digeri potest.

## G. IX. POLYDIPSIA. 336

Est potulentorum appetitus immodicus.

## G. X. ANTIPATHIA. 337

Est averfatio quorundam objectorum tanta, quod homo ex eorum visu, odoratu, auditu, &c. gravia symptomata patiatur.

## G. XI. NOSTALGIA. 338

Est desiderium videndi parentes, cognatos, solumque natale adeundi adeo ardens, ut hac sola anhelatione occupati penitus langueant; horumque animae commercium cum corpore ferme sublatum sit; unde languent omnes sensus, et appetitus alii; hectica febris hos miseros consumit, et ad lethum ducit, si adeundi patriam cognatos copia denegetur; olim in Croatia Crisis laboravi hoc malo cum apositia, et obstipatione, intumueram ex anasarca pervigil et debilis; redux ad patriam sine omni pharmaco convalui; desideramus varia ardentissime.

## G. XII. PANOPHOBIA. 339

Est summus pavor inter dormiendum sine causa evidenti ortus; clamant hi, gemunt,

## 346 SYSTEMA MORBORUM

tremunt, sudant; hoc genus non multum differt ab ephialte.

### 340 G. XIII. SATYRIASIS.

Est morbus proprius viris, cujus praecipuum symptoma est effraenis impudensque veneris cupiditas, cum libidinosa penis tentione; priapismus caret cupiditate libidinosa.

### 341 G. XIV. NYMPHOMANIA.

Hujus generis character est effraene, audax, et impudens in foeminis veneris desiderium.

### 342 G. XV. TARANTISMUS.

Hic morbus scribitur in Apulia esse endemius, cujus praecipuum symptoma est inexplicabilis saltandi, choreas agendi cupiditas; a tarantulae morfu excitari hunc morbum judicat Baglivius, quod Ill. Serao et experimenta Romana inficiantur.

### 343 G. XVI. HYDROPHOBIA.

Est morbus, cujus praecipuum symptoma est incredibilis potulentorum omnium averfa-

tio, impossibilis deglutitio ; vitant insuper lucem et aëris motum.

G. XVII. R A B I E S.

344

Est morbus in lupis et canibus observatus, cujus praecipuum symptomata est effraenis cupiditas mordendi obvios omnes, licet innocuos, sine hydrophobia ; constat enim repetita apud Gallo-Provinciales experientia canes luposque rabidos bibisse, manducasse, et flumen transisse ; hic nihilominus morbus saepius est symptomata hydrophobiae : Vide dissertationem Ill. de *Sauvages* de Rabie. Rabies porro datur *canina*, *maniaca*, et *daemonomaniaca* : Vide *Hydrophobiam*.

O. III. D E L I R I A.

Delirium est ortus idearum non respondens objectis in sensus incidentibus, sed internae cerebri dispositioni a qua nascuntur ideae delirantium.

G. XVIII. P A R A P H R O S Y N E.

345

Est delirium fugax a veneno, vel alio morbo dependens, cujus comes et symptomata est.

## 346 G. XIX. AMENTIA.

Est infania chronica, universalis, mitis, seu ineptitudo ad recte ratiocinandum et iudicandum, cum sensu et perceptione objectorum, aut sine attentione.

## 347 G. XX. MELANCHOLIA.

Est infania chronica partialis, moesta, meditata; delirant melancholici sine furore, et sine febre, de uno potissimum objecto constanter, delirant circa semetipsos, aut suum statum, de reliquis objectis adhuc sat bene ratiocinantes; mihi videtur causa hujus morbi latere in abdomine, ganglia semilunaria afficere, et plexus nervorum abdominales.

## 348 G. XXI. DÆMONOMANIA.

Est delirium sine febre reipsa tale, vel tantum simulatum, quo magi, sagae, praestigiatorese se tanquam a daemone obsessos ostentant, varia phaenomena leges naturales excedentia praestare, exhibere volunt.

## 349 G. XXII. MANIA.

Est delirium apyretum circa quaevis objecta, cum furore, audacia, ac robore; maniaci



habent plerique lucida intervalla ; subin est mania periodica ; unde Lunatici ; sanguis maniacorum viscidus, seroque carens, fibrae musculares rigidae.

## O. IV. VESANIAE ANOMALAE.

Morbi prioribus affines.

### G. XXIII. AMNESIA.

349

Est memoriae imminutio aut plenaria abolitio.

### G. XXIV. AGRYPNIA.

350

Pervigilium immodicum vel continuum, ex quo vires imminuuntur; anxietas, inquietudo, anorexia, cephalalgia, aliaque molesta sympomata, oriuntur.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911



S Y N O P S I S

NOSOLOGIÆ METHODICÆ,

EXHIBENS

*Tho. Dale M.D.*

CLARISS. VIRO RUM

*1780-*

SAUVAGESII, LINNÆI, VOGELII, ET SAGARI,  
SYSTEMATA NOSOLOGICA.

EDIDIT

SUUMQUE PROPRIUM SYSTEMA NOSOLOGICUM

ADJECIT

GULIELMUS CULLEN,

MED. D. ET IN ACAD. EDINB. MED. PRACT. PROF.

MEDICUS REGIUS APUD SCOTOS PRIMARIUS,

ET COLL. REG. MED. EDINB. SOCIUS;

NEC NON SOCIETATUM REG. LOND. PHILOS. EDINB.

PHILOS. PHILADELPH. MED. REG. PARIS.

MED. HAUNIENS. ET MED. EDINB.

SODALIS.

EDITIO TERTIA,

EMENDATA ET PLURIMUM AUCTA,

DUOBUS TOMIS.

T O M. II.

E D I N B U R G I:

Prostant venales, apud GULIELMUM CREECH;

et LONDINI, apud THOMAM CADELL,

et JOANNEM MURRAY, Bibliopolas.

---

M, DCC, LXXX.



P A R S Q U I N T A.

G E N E R A

M O R B O R U M

P R Æ C I P U A

D E F I N I T A,


A D D I T I S S P E C I E B U S

C U M H A R U M E X S A U V A G E S I O S Y N O N Y M I S,

A

G U L I E L M O C U L L E N,

Edinburgi 1780.



## PROLEGOMENA.

**R**ES est inter medicos satis nota, morbos quosdam natura sive causa proxima diversos, externa tamen facie, sive symptomatis, adeo similes esse, ut alii ab aliis difficillime internoscantur. Cum autem morbi natura diverſi remedia diversa, quandoque etiam contraria, postulent, summi est momenti ut medicinam facientes morbum quemque, a quovis alio, certo dignoscant.

Dum medici vero, in ipso artis usu verſati, de morbis distinguendis saepe incerti sunt, merito queruntur, in scriptis de re medica, non semper inveniri quae hanc ambiguitatem solvere valeant. Saepe quidem observatum est, descriptiones, sive historias,

A

quas

quas vocant, morborum, in scriptis medicorum reperiundas, plerumque mancas et imperfectas esse; et nemo est, ut opinor, qui non facile agnoscat, historias morborum pleniores, magis exactas, et characteribus melius distinctas, quam quas adhuc habuimus, desideratas esse.

PUTARUNT quidem multi, medicos veteres, Graecos et Romanos, in observandis et notandis morborum phenomenis, diligentes et solertes fuisse, atque in horum scriptis historias morborum complures quae nobis utiles esse possint exstare. Mihi vero videtur vel ineptam et superstitiosam antiquitatis venerationem, vel quandam eruditionis ostentationem, scriptis medicorum veterum in hac re aestimationem nimiam conciliaffe. Minime quidem dissimulandum, in scriptis illis quaedam quae morborum characteres vere delineant subinde reperiri. Quae autem ejusmodi ibi occurrunt, quantumcunque a recentioribus aestimata, parum profecto nos docuissent,

docuissent, et attentionem nostram penitus fortassis effugissent, nisi res eadem nobis ex propria observatione prius innotuissent. Revera, neoterici libros veterum raro, ad primam rerum notitiam comparandam, evolvunt, sed plerumque, ut propria tantum inventa et observationes horum autoritate suffulciant, perscrutantur. Mihi quidem persuasum est, vel historias morborum pleraque, quae in scriptis veterum jam inveniuntur, ad morbos regionis a nostra plurimum diversae pertinere, ideoque nobis parum utiles esse; vel scripta eorum adeo mutilata et corrupta ad nos pervenisse, ut ad usus nostros parum conferre queant. Fatendum saltem, notitiam morborum ex scriptis veterum hauriendam multo minorem esse, quam qua opus est ad illam, de qua diximus, ambiguitatem eximendam.

Nec nisi sero admodum et lente ad hanc rem expediendam progressi sunt recentiores. Seculo enim decimo sexto, Galeni sequaces,  
in

in instauranda veterum doctrina, tanta cum laude versati, in horum scriptis explicandis et illustrandis fere solum occupati; parum omnino ad emendandam vel amplificandam morborum historiam contulerunt.

NEC ejusdem aevi medici chemici, Galenicorum adversarii acerrimi, in illa re plus fecerunt. Medicamentis enim inveniendis, et promiscue adhibendis, solum intenti, a morborum studio hominum animos prorsus avertabant.

HINC quidem factum est, quod ab instauratis literis seculo decimo quinto, usque ad tempora Sydenhami, nullae fere morborum historiae plenae vel accuratae conscriptae sint. SYDENHAMUS vero, sagacitate et judicio quibus maxime pollebat, majorem in notandis et describendis morborum phaenomenis diligentiam adhibendam esse protinus sensit, et in hunc finem ad sedulam observationem se accinxit, qua plures tandem  
et



et meliores, quam antea quisquam, morborum descriptiones protulit.

Ad hujus exemplum, et ad normam methodi, per observationes et experimenta, philosophandi, tunc temporis invalescentis, evenit, ut ab eo tempore plures medici, in historiis morborum augendis et accuratius reddendis, operam collocaverint.

A tempore igitur Sydenhami in hac re multum laboris nec frustra impensum est; rem tamen minime adhuc absolutam efficeo. Multa parum accurata, multa erronea, multa denique prorsus falsa, historiis morborum, quas jam habemus, inesse, novit quisque in his aliquantulum versatus; et novit etiam ex variis causis haec vitia subrepisse. Scriptores enim, alii ad theorias sibi placentes stabiliendas, alii ad fidem remediis ab ipsis sive inventis sive multum laudatis conciliandam; vel veritatem, praeconceptis occaecati, non percipiebant, vel etiam fictis

et falsis corrumpebant. Plures, re omnino quovis modo mirabili capti, quod ipsi facile crediderunt, alios credere cupientes, rem omnem praeter modum amplificaverunt. Plures denique, ut observationibus, hodie adeo expetitis, famam sibi compararent, historias in museo fictas, pro veris tradiderunt. Haec omnia, si specialius indigitarem, de imperfecta haecenus morborum historia satis clare constaret; sed haec omnia impraesentiarum praetermitto, et unum solummodo, in historiis morborum conscribendis, vitium, ad rem nostram maxime pertinens, indicatum volo.

MULTI optimae etiam fidei medici, in morbis observandis diligenter versati, in historiis eorum conscribendis saepe nimium fecerunt. Non solum enim symptomata morbi cujusvis semper praesentia et inseparabilia, sed plura etiam, et cuncta quidem quovis tempore morbum comitantia, recensuerunt. Ita symptomata rarius, nec necessario cum morbo conjuncta, et plura omnino adventitia et fortuita

fortuita, notarunt; dum simul illa inusitata  
et fortuita ab usitatoribus et inseparabilibus  
distinguere penitus neglexerunt. Hinc, hi-  
storiā morborum plenissimā reddere co-  
nantes, quae ad distinctionem cuiusque ab  
alio quovis conferre possent, omiserunt, im-  
mo difficiliorem reddiderunt.

DE hacce in historiis morborum redun-  
dantia saepe conquesti medicinam facientes,  
pathognomonica quae dicuntur desidera-  
unt; hoc est, ut notentur symptomata illa  
paucā, quae cuique morbo adeo propria  
sunt, ut ab illis solis quisque morbus ab alio  
quovis illico et certo dignoscatur. Hujus-  
modi autem pathognomonica in scriptis  
medicis nondum data, neque unicuique  
morbo assignata sunt; nec, quantum video,  
nisi per Nosologiam methodicā, rite insti-  
tutam, assignari queunt.

DUDUM quidem SYDENHAMŪS et solers  
BAGLIVIVS, quo facilius et certius morbi  
distinguerentur,

distinguerentur, morbos omnes, per normam  
 methodi botanicae, ad genera et species, ap-  
 positis characteribus idoneis, referri volue-  
 runt: Id est, ut institueretur Nosologia  
 methodica. Hoc etiam consilium alii sum-  
 mae famae medici comprobarunt, et quisque,  
 ni fallor, in artis usu occupatus factum fuisse  
 vehementer optaret. Nihil tamen hujus-  
 modi protinus tentatum fuit; an quidem  
 ex fructu inde capiendo parum perspecto,  
 an vero ex difficultate operis praevisa, non  
 constat; sed revera nihil omnino tentatum  
 fuit, donec celeberrimus FRANCISCUS BO-  
 ISSIER DE SAUVAGES, circa annum 1732  
 rem aggressus sit.

QUAE quidem, exēunte seculo decimo  
 sexto, FELIX PLATERUS in morbis secundum  
 symptomata ordinandis conatus est, quo-  
 dammodo huc referri possunt; conatus autem  
 isti inconditi adeo et imperfecti erant, ut  
 quenquam eosdem prosecuturum esse vi-  
 deo expectandum fuit; et revera ante Sauva-  
 gesium

GESIUM nemo, quantum novimus, ulla ex parte profecutus est. Haud dissimulandum quidem, PLATERUM SAUVAGESIO quaedam fugcessisse; pauca tamen, nec fausta admodum, et quae nemini usui fuissent, nisi SAUVAGESIUS, cum meliore spe, opus multo longius provexisset.

IPSE quidem SAUVAGESIUS primum lente et titubanter progrediebatur; et, re iterum atque iterum tentata, non nisi post multam lectionem, et assiduam per triginta annos meditationem, Nosologiam methodicam suam, anno 1762 editam, protulit.

INTEREA, duo alia, in Nosologia methodica, tentamina facta sunt; alterum a celeberrimo viro, et in distributione rerum methodica plurimum exercitato, CAROLO a LINNE; alterum ab erudito Professore Gottingensi, RUDOLPHO AUGUSTO VOGEL. A neutro tamen, utpote vestigiis SAUVAGESII presse nimis insillente, opus multum promotum fuisse videtur.

CUM de utilitate hujusmodi tentaminum, jamdudum mihi persuasum sit, simulac ad medicinae praxin docendam in hac alma Academia admotus fui, mei officii esse putavi alumnos nostros ad Nosologiae methodicae studium allicere; et, quo facilius hoc efficerem, libellos quotquot ad id conferre possent, hic edendos, et in discipulorum manus tradendos, curavi.

Ex opere SAUVAGESII, aliis rebus non admodum utilibus referto, ea tantum quae ad genera et species morborum distinguendas pertinerent excerpti, et cum his LINNAEI et VOGELII libellos integros conjunctos edidi.

AUCTORES hi aliquid laudis sine dubio merentur; quanquam enim eorum opera, rem ex toto confecisse minime videantur, nec multum utilitatis tyronibus inexpertis afferre queant; in arte tamen versatis, et in dignoscendis morbis aliquatenus exercitatis, nonnihil commodi exinde oriri possit.



DIFFICILE quidem erit, hanc rem pro-  
 inus perfectam reddere, nec, ut opinor, nisi  
 entaminibus repetitis fieri potest. Non  
 solum igitur mihi licitum, sed mei muneris  
 esse, opus hoc Nosologicum, quantum pos-  
 sem, promovere arbitratus sum; eoque con-  
 silio methodum quodammodo novam ten-  
 tavi, et una cum supra dictis edidi. Hanc,  
 etsi nequaquam omnibus numeris absolu-  
 tam, prioribus tamen in quibusdam magis  
 accuratam inventam fore spero.

QUI ante nos huic studio operam de-  
 derunt, minus consulto, ut mihi videtur,  
 rem aggressi sunt; morborum enim species  
 parum perspectas habentes, ad suprema clas-  
 sium et ordinum genera constituenda illico  
 se accinxerunt. A natura vero, species so-  
 lum datae sunt; et generum constitutio est  
 mentis humanae excogitatio, quae, donec  
 species omnes bene notae et perspectae fu-  
 erint, fallax et incerta erit; et in generibus  
 quidem constituendis, nisi ad species semper  
 respiciamus,

respiciamus, labor noster vanus et futilis evadet.

CONSTITUTIO generum supremorum, in quovis rerum systemate, neutiquam adhuc absoluta est. Classēs enim, vel etiā ordines, omnino naturales, vel in systemate vegetabili, vel in animali, nondum ubique constitutae sunt. De fossilibus methodus etiam difficilior, et de morbis fortassis omnium difficillima erit. Videamus igitur quomodo hanc rem quam optime tractare possimus.

Cum res distinguendae, numero quam plurimae sint, tum ad investigationem, tum ad reminiscentiam, utilissimum et necessarium esse videtur, ut ad genera quaedam summa referantur; cum vero species rerum non admodum numerosae sint, et quarum singillatim recensitarum reminisci, memoriae in plerisque hominibus vires non excedat, eas, summa sollicitudine, ad classes et ordines referre vix opus esse videtur.



ITA Illustris DE BUFFON quadrupedia, quorum species numero paucae sunt, ad classes et ordines referre haud necessarium esse censuit, et quae in hunc finem alii tentarunt, frivola esse, et ad denominationem studiosos plurimum turbantem duxisse, putavit.

ILLUSTRI tamen et egregio viro prorsus assentire nequeo. Etiam si enim institutio classium et ordinum morborum, neque pro investigatione eorum satis perfecta reddi queat, neque pro numero valde necessaria sit; quodammodo tamen tentandam, et ad maiorem accurationem diligenter perducendam esse, puto.

ENIMVERO, si ab illusione quae ex characteribus classium et ordinum oriri queat, cavemus, et, ni fallor, cavere plerumque licet, etiam classium et ordinum institutionem, in multis ad plenioram et magis exactam specierum distinctionem conferre posse contendo. Etsi enim ejusmodi institutionem, ubique certam et accuratam semper

per assequi haud liceat, ipsos tamen conatus ad illam assequendam magnopere ex re for-  
putarem, quippe qui ad disquisitiones utiles tum in pathologia, tum in morborum histo-  
ria, saepe obvenientes, subinde ducant. Certe, cum de natura morborum disquirere velimus, distinguendi sunt, tum per sympto-  
mata cuique propria, tum per illa cum aliis quibusdam communia, quod nihil aliud est quam morbos, uti alia quaecunque in re-  
rum natura distingui debent, per genera et species distinguere, et hujusmodi distinctione generum, tum supremorum tum proximorum, notationem necessario exigit.

QUANTACUNQUE tamen ex instituen-  
dis morborum classibus et ordinibus utilitas provenire possit, certe fatendum est, Nosologos, huic rei praecipue intentos, successus optatos nondum obtinuisse; et ex hujusmodi studii adeo imperfecti conspectu, ni fallor, accidit, quod totam rem Nosologicam alii despexerint, alii vero impossibilem judicaverint.

QUI impossibilem putant, certe falluntur. Distinctionem morborum aliquando difficilem esse, fatentur omnes; possibilem autem in plerisque esse, fateri etiam oportet; nam, si quis hoc negaverit, idem fecerit, ac si nullam esse artem medicam dixisset. Si revera tamen medici morbos a se invicem distinguere possint, certe quibus indiciis id faciant, etiam dicere queunt. Haec autem indicia nulla alia esse possunt, quam quae morbum quemque per genus et speciem definiant, quae rursus per methodum Nosologicam, rite institutam, solummodo exponi queant.

DISTINCTIONEM itaque morborum, hactenus saepe dubiam, per Nosologiam methodicam magis certam fieri posse, affirmare nullus dubito. Porro observandum, quoties hujusmodi distinctionem morborum exponere conati fuerimus, id commodi orturum, quod hujus distinctionis vel defectus, vel errores, facillime percipientur, et cum percepti, vel ad observationes jam factas accuratius considerandas, vel ad observationes

servationes postea diligentius faciendas, dicent; quin et plurimum valebunt, tum ad Nosologiam methodicam, tum ad distinctionem morborum, tandem perfectiorem recedendam.

QUAMVIS morborum characteres hactenus propositi saepe erronei, saepe deficientes sunt; tentamina tamen omnia jam facta exhibere cupiens, in hac tertia Synopsis editione ex systemate symptomatico CL. MICHAELIS SAGAR, quae ad genera morborum definienda pertineant, excerpti, et caeteris super memoratis subjunxi. Haec autem tentamina omnia simul edita sunt, ut juxta posita facilius conferri possint, et ut collata vel optimos et maxime idoneos characteres indicent, vel ad erroneos corrigendos, et ad distinctiones magis exactas obtinendas lectores ducant.

HUJUSMODI studium plurimis medicis necessarium fore facile credo; nam morborum titulis inhaerentes, notiones parum accurate

curatas et determinatas habent ; et, quantum video, ad magis exactas, nisi nosologiae methodicae studio, duci vix possunt.

Ex iis quae jam diximus, tum utilitatem tum necessitatem Nosologiae Methodicae manifestam fore spero ; et simul patebit, quare antehac, et nunc etiam, eandem colere allaboravi. Proximum est, ut in hisce prolegomenis, quas in hoc studio regulas ipse observavi, et ab aliis observandas vellem, nunc exponam.

PRIMA et praecipua nostra cura fuit, ut morborum species in ipsis aegris praesentes detegerentur et dignoscerentur. Cum vero species nisi simul genus indicaretur, vix recte definiri possint ; et cum genera plurima a Nosologis indicata unius tantum speciei sint, inde factum est, quod nostri etiam labores, in generibus praesertim distinguendis, impensi videantur. Ad species tamen semper respeximus ; et ad eas dig-  
C
nosendas,

noscendas, characteres generum a nobis datos ubique utiles fore speramus.

IN generibus morborum recensendis, pauciora, quam in aliis systematibus dicta sunt, recensui ; quod si recte feci, id studiosis multitudine rerum contemplanda facile turbatis imprimis commodum esse puto. Etiam si enim numerum generum minuens aliquando erraverim, id tamen tuto tentatum fuisse censeo ; cum enim discipuli nostri genera facile et satis certo distinguenda recte perspexerint, illos genera forte omissa facile postea agnituros esse, credo.

GENERA morborum vero apud nos, quam apud alios Nosologos, necessario pauciora sunt ; quia plura, pro diversis ab aliis habita et recensita, a nobis, utpote nulla, quantum nobis videtur, re diversa, sub uno titulo comprehensa sunt ; et hujus rationes postea locis idoneis tradendae venient. Interea notandum, plura genera, quae primo intuitu omissa videantur, nequaquam ex oculis



oculis studioforum subblata esse, cum generis illius, ad quod pertinere nobis videntur, uti synonyma recenscantur, et locum suum in indice adhuc retineant.

DEINDE, genera morborum a nobis, quam ab aliis enumerata et definita, pauciora sunt; quia nulla, nisi idiopathica et primaria, notanda esse duximus; dum plura ab aliis memorata, sympathica tantum sunt, sive symptomata nusquam per se existentia; et neutiquam igitur pro morbis primariis agnoscenda. Ita *Carphologia*, *Pandiculatio*, *Rigor*, *Sternutatio*, *Oscedo*, *Singultus*, *Stertor*, *Anxietas*, *Lassitudo*, *Stupor*, *Pruritus*, *Algor*, et *Ardor*, a SAUVAGESIO, et alia ab aliis, pro generibus recensita, a nobis penitus omittuntur; et recte, ni fallor, nisi quot symptomata, totidem genera morborum, ponere velimus.

DENIQUE, genera morborum apud nos pauciora sunt; quia, ex classibus VITIORUM et DEFORMITATUM, plura a nobis omittuntur;

tuntur ; vel quod morbi adeo leves sint, ut medicorum attentionem et curam non mereantur ; vel quod congeniti et immutabiles medicorum artem penitus eludant. Ita *Lentigo, Leuce, Cyasma, Seline, et Cicatrix*, ex classe VITIORUM ; et *Phoxos, Gibber, Rhyssmata, Canities, Coloboma, Naevus, Monstrositas, Rhicnosis, Varus, Valgus, Leipedes, Saniodes, Cripsorchis, Hermaphroditus, Dionysiscus, Galiancon, Galbulus*, et alia ex classe DEFORMITATUM apud VOCELIUM recensita, recte a nobis omissa putamus. Ejusmodi vitia et deformitates, fortassis in pathologia, sive historia generali, mutationum quas, quavis occasione, subit corpus humanum notari possent ; Nosologiam autem methodicam iis adeo frivolis onerare, vel eandem tam multis novis et inutilibus appellationibus turbare, minime idoneum videtur. Judicet itaque lector, quam merito gloriatur cl. SAGAR, se generum numerum auxisse.

QUOD,



QUOD, modo memorata omiserim, venia forsitan mihi facile dabitur. Sunt autem alii morbi, memoratu quidem digni, quos omisso non adeo facile condonabit studiosus. Hujusmodi omissiones agnosco, et quidem doleo; sed variae rationes, ut quidam morbi hic omitterentur, effecerunt. Primo, fieri potest, ut quidam observationem nostram penitus effugerint; dein, sunt alii satis noti, quibus, in nostro systemate, locus idoneus nusquam inventus est; denique, sunt alii quorum historia apud medicos adeo sit imperfecta, ut nec locus nec character idoneus iis assignari queat. Ne tamen ejusmodi genera penitus omitterentur, ad calcem operis, omissorum, quotquot noverim, catalogum subjunxi, ut posterius perspicaciores, ea diligentius perpendentes, characteres et locum iis assignent.

EODEM consilio, ne scilicet tyronibus contemplanda praeter necessitatem multiplicarentur, non genera solum, sed species morborum etiam ad minorem numerum  
redeg.

redeggi. Hoc magis periculofum videri potest, cum nullam speciem, quae revera existat, recte omittere liceat. Ne quidem ad recensionem specierum ipse accederem, difficultas operis me dubium, et timidum antehac diu cohibuit; et id tantum tentare ausus sum, ut species, a SAUVAGESIO recensitas, serie paulo luculentiore et emendatiore traderem: Re autem amplius, et curatius perpenſa, species jam recensurus, numerum earum, apud SAUVAGESIUM recensitarum, multum minuendum esse, arbitratus sum.

SOLUS quidem SAUVAGESIUS, nomen SAGARUM nihil moror, in recensione specierum quicquid praestitit; et, licet egregius vir, plurimis observationibus undique collectis, multum de re medica meritis sit; haud tamen diffimulandum, illum in multis graviter errasse, dum species revera easdem, sub diversa appellatione repetitas, pro diversis ponebat; et praesertim dum species sympathicas, tam saepe idiopathicis immiscebat, qua ratione earum numerum totum praeter modum auxit. Hos ut tolle-

rem

rem errores, quod potui feci, numerosis nempe apud SAUVAGESIUM speciebus, recte, quantum ego judico, ad pauciores reductis.

QUOD ut efficerem, primo species plures, uti diversas a SAUVAGESIO recensitas, pro una eademque habui, et sub uno titulo posui; atque hujus rei rationes locis suis idoneis posthac tradendae sunt.

DEINDE, cum species idiopathicas solum pro veris et genuinis enumerare velim, quotquot pro symptomaticis habere potui, totidem ex numero specierum apud SAUVAGESIUM sustuli. Cum autem, in recensione specierum symptomaticarum aliquis usus sit, earum recensionem, seorsum tamen, denuo apposui.

DENIQUE, alia et praecipua ratio, qua specierum, a SAUVAGESIO recensitarum, numerum minuendum esse censui, ea est, qua plures ab eo pro diversis positas, pro  
specierum

specierum varietatibus, tantum habui et enumeravi.

Hoc autem est, quod in Nosologia Methodica maxime difficile videtur, dicere nimis, quid pro ipsa specie morbi, quid pro ejusdem speciei varietate, tantum habendum sit. Cum autem criteria illa, quae in Zoologia et Phytologia, ad species a varietatibus certius distinguendas adhiberi possint, in Nosologia Methodica nequaquam invenienda sint; varietates morborum a speciebus distinguere ubique difficilius erit. Quamobrem varietates plures recensere, tutissimum et fere necessarium esse duxi. Ejusmodi vero distinctionem, in artis usu utilissimam fore ratus, illam adhibere ubique annifusus sum; quod si non in omnibus, cum aequae certa cognitione, cum aliqua saltem verisimilitudine, diligenter quae sequuntur pensitatis, saepe fecisse videor.

Cum morbus aliquis, quo plures homines laborant, symptomata cujusdam speciei characteristica

characteristica omnia et sola, in unoquoque ostendit; quantumvis haec in alio minus, in alio magis vehementia sint, hoc speciem diversam exhibere non putamus; et, in universum, morbos gradu solum differentes, non nisi ejusdem speciei varietates praebere censemus.

TUNC igitur de varietate a specie distinguenda quaestioni tantum locus est, cum in diversorum hominum morbis, vel ex solitis cujusvis speciei symptomatis, quaedam absint, vel iisdem quaedam addita sint.

CUM ex symptomatis solitis quaedam absint, quoties inter symptomata, quae magis, et ea quae minus, essentialia sunt distinguere liceat, ex horum absentia non nisi varietatem adesse concludimus.

CUM vero symptomatis characteristicis alia quaedam addita sint, si addita pro symptomatis symptomatum, potius quam pro

D                      symptomatis

ſymptomatis cauſae haberi queant, varietatem tantum conſtituunt.

DENUO, cum ſymptomata addita, in ſpecie data, prorſus inſolita ſint, et ſimul conditiones morbi praecipuas parum vel nihil mutari videantur, haec quoque varietatem tantum praebere cenſenda.

CUM morbi genus quoddam, ex principiis diverſis oriri queat, idem, ex diverſitate principii, ſpecie diverſum evadere poteſt, nec ſemper tamen; nam, quotieſcunque diverſitas illa parva fuerit, et ſimul ſymptomata parum ab ea fuerint mutata, hoc etiam non niſi varietatem exhibere, putamus.

MORBI genus itidem, pro diverſa ejus fede, diverſae ſpeciei fieri poteſt; quotieſcunque vero ſedes diverſa, neque partis ſtructurae, neque functionis ratione differat, hujusmodi ſedis diverſitas etiam pro varietate tantum habenda eſt.

PORRO,

PORRO, cum de morbis invicem distinguendis hic agatur, observari vellem, res duas esse, quae ad similitudinem et affinitatem morborum, in diversis hominibus indicandam, plurimum facere possint.

ALTERA est, quod principii quaedam similitudo, morborum inde in diversis hominibus genitorum similitudinem arguit ; ita, quando morbi diversorum hominum, ex uno eodemque principio oriuntur ; quando, etiam principium illud, ad morbum gignendum, in unoquoque necessarium sit ; denique, quando idem principium, ubique fere ejusdem qualitatis et vis esse videatur, tum demum morbos, ex ejusmodi principio genitos, ejusdem vel simillimae naturae esse, judicare licet.

Hoc de morbis contagiosis plerisque valere mihi videtur. Ex his enim sunt, qui in pluribus hominibus ab eadem specifica contagione oriuntur ; nec, in eorum aliquo morbus, nisi ab illa contagione applicata,



plicata, oriri unquam observatur; et simul illius contagionis vires et qualitates, ubique fere, eadem esse videntur. Quod ad proxime dictum spectat, id quibusdam dubium videri potest; sed, cum ejusdem contagionis effectus, per secula plura jam observati, semper et ubique admodum similes sint, eam qualitate et viribus eandem esse, merito concludimus; et, ob hoc praesertim, quod effectus isti, quatenus diversi videantur, plerumque hominis infecti conditioni cuidam, potius quam contagioni, qualitate vel viribus diversae, tribui possunt.

MORBOS, itaque, eadem contagione specifica ortos, simillimae naturae esse credendum; ejusmodi morbos etiam vix, nisi unicam ejusdem generis speciem, praebere; immo, earum diversitatem quandam aliquando observatam, non nisi ejusdem speciei varietatem indicare, suspicandum est.

HAEC



HAEC omnia, non solum de exanthematibus contagiosis, sed etiam de plerisque febribus epidemicis, dicta velim. Hanc autem opinionem, de similitudine febrium epidemicarum proferens, a gravis auctoritatis viro SYDENHAMO, hujusmodi febres specierum plurium esse statuente, dissentire cogor. Recte quidem, an secus, multum dubito; et posteris litem dirimendam relinquo, hoc simul praemonito, plurimum medicinam facientibus inter futurum, de alterutrius sententiae veritate sibi satisfacere, vel potius quas limites utrique sint ponendae, statuere.

ALTERA res, quae similitudinem morborum, in diversis hominibus, ostendere possit, est similitudo remediorum quibus fiantur. Similitudo quidem morborum in similitudine causae eorum proximae, qualiscunque sit, revera consistit; cum remedia vero morbis medeantur, tantum quatenus causas eorum proximas tollant, morbos, qui

qui iisdem omnino remediis sanantur, ejusdem naturae esse oportet.

HUJUSMODI ratiocinatio, tum ad phlegmasiarum missione sanguinis, tum ad februm intermittentium cortice Peruviano sanatarum, similem naturam indicandam, plurimum certe facere potest. Hanc autem doctrinam, utcumque in praxi medica aliquando utilem, fallacem tamen, neque in praxi, neque in Nosologia methodica, nisi caute admodum, adhibendam esse censeo. Apud vulgus medentium quidem, remedia eadem quibusque fere ejusdem generis, speciebus, et harum varietatibus adhiberi, et hinc genera plura nullo modo specie differre, videantur. Sed peritiores norunt, morbos, aliquo modo diversos, rarius quam putatur, ab iisdem prorsus remediis sanari: Bene etiam norunt, ex promiscua remediorum adhibitione fieri, quod eadem remedia adeo saepe frustranea, sanationes saltem minus perfectae sint. Porro, norunt expertissimi, ad recte medendum, omnino opus

us esse, ut remedia, non solum generi, sed speciei cuique, et saepe etiam varietatibus quibusdam, apprime sint accommodata.

AD artem medicam breviorē, et exinde faciliorem, reddendam, species morborum quascunque, a varietatibus suis distinguendas esse, arbitratus sum. Hanc tamen distinctionem in pluribus quodammodo incertam esse fateor, et, in nosologia methodica, tutissimum fore puto, varietates morborum plerasque notare et recensere. Hoc itaque praestare ubique annisus sum, aliis sapientioribus, qui posthac huic operi se immiscere velint, relinquens, discriminationem magis certam statuere.

EXPOSITA jam qua ratione morborum, tum generum, tum specierum, numerum minuere laboravi; superest, ut quo modo morborum, quae admisi, characteres constituenti sunt, nunc exponam.

IMPRIMIS igitur, notas externas, sensibus nostris facile obvias, ubique selegi, neglectis, vel potius rejectis, de statu corporis interno conjecturis quibuscunque. Porro, ex notis quae sensibus sunt obviae, illas medici potius quam aegri sensibus percipiendas, semper praetuli; quum tamen has, utcunque fallaces, penitus negligere vel omittere non liceat.

SECUNDO, ea symptomata pro notis characteristicis praecipue seligenda putavi, quae perpetuo cum morbo praesentia sunt, et hoc quidem semper annitendum esse puto. Cum vero plurimi morbi sub eorum decursu, aliam atque aliam omnino formam capiant, in his, ex serie rerum, et symptomatum sibi invicem succedentium, character saepe necessario petendus est.

IN hac re autem tractanda, duplex quaestio exoritur. Prima est, An ex morbi principio characteris partem desumere liceat?

AD

AD hanc responderi possit, quod, etiamsi de principiis morborum apud medicos iudicium saepe fallax, et prorsus falsum sit, nec temere idcirco ad morbos distinguendos adhibendum; cum eadem tamen aliquando satis certe nota sint, et facile observanda, huiusmodi principia in nosologia, pro notis characteristicis recte adhiberi posse censeo.

ALTERA quaestio hic exoriens est, quatenus ex serie symptomatum, sub decursu morbi occurrentium, characterem ejus petere liceat? Ad hanc etiam possit responderi, quod, cum plures morbi, uti exanthemata et febres intermittentes, nisi post decursum aliquot dierum, ex serie symptomatum sibi invicem succedentium, nullo modo dignosci queant; ut huiusmodi morbi distinguantur, ex serie illa character necessario sumendus est. Characteres autem, non nisi post longum morbi decursum, fortassis non nisi post morbum finitum, statuendi, nequaquam in nosologia usurpari  
E debent.

debent. Ita apud Ill. LINNÆUM *Febrorum continentium*, quas vocat, characteres a diuturnitate totius morbi desumpti prorsus inepti sunt.

IN constituendis morborum characteribus, regula tertia est, quod, cum quisque fere morbus, ex plurium symptomatum concursu solum dignoscatur, ex iis pro notis characteristicis quot sufficiant; nec plura tamen adhibenda sunt. Priores nosologi mihi videntur, in characteribus quos dederint, plerumque nimis breves et deficientes fuisse; et forsan mihi vitio verti potest, quod aliquando sim in iisdem nimis longus et redundans. Nusquam quidem volens fui redundans; ut vero essem copiosus ubique me conatum fateor, prudentissimum fore ratus etiam ad redundantiam appropinquare, quippe posteris multo facilius erit, quod nimium est tollere, quam quod deficiat supplere.



IN characteribus denique morborum constituendis, quaeritur etiam, an ex defectu functionis cujuslibet, quae in sano unoquoque exercetur, vel ex absentia symptomatum, in aliis generibus vel speciebus apparentium, notas quasdam desumere liceat? SAUVAGESIUS quidem defectus functionum, utpote nihil positivum indicantes, pro morbis noluit admittere; plures igitur, qui a LINNAEO sub ordine *constrictiorum*, et a VOGELIO sub classe *epischesium*, recensentur, penitus omisit.

SED, pace tanti viri, dixerim, quanquam defectus, si strictius loqui velimus, nihil positivum indicet; defectum tamen functionis, quam exercet quisque sanus, statum corporis humani exhibere, quem ut distinguamus utilissimum est, atque etiam necessarium, et ejusmodi status pro morbo recte haberi potest. Porro, etiam si in quibusdam defectus isti aliquando sine molestia vel morbi symptomate observentur; in plerisque tamen magnam molestiam, et sympto-

mata

mata plurima pariunt. In his igitur, defectum functionum, saepe symptomatum causam manifestam, pro morbo haberi licet, et ex ejusmodi defectu, in plurimis morbis horum notas characteristicas petere licet, et oportet. SAUVAGESIUS ipse in hac re parum sibi constare videtur, *Debilitatum* classem instituens, et *Amnesiam*, *Agrypniam*, *Ischuriam*, et alia etiam tanquam genera recensens.

QUOD notas ex absentia symptomatum, in aliis congeneribus apparentium, spectat; eas nequaquam bonas, et, ubicunque fieri potest, evitandas censeo. In pluribus vero vitari, quantum video, non possunt; nec a quovis nosologo adhuc fuerunt vitatae.

CUM, secundum has regulas, characteres morborum constituendi sint, plurimum refert, eosdem sermone accurato et luculento exprimere; nec minus, morbum quemque apto nomine insignire.



NORUNT eruditi, Ill. LINNÆUM methodum plantarum perfectiorem reddidisse, eo, quod botanices linguam, usurpatis ubique vocibus maxime idoneis et definitis, magis accuratam effecit; nec quidem dubito quin delineatio morbi, ad instar delineationis plantae, a LINNÆO exhibitae, in nosologia multum profutura sit. In nosologia autem, ac in botanice, non aequè necessarium esse videtur; tum quod tam multae rerum circumstantiae, in nosologia, ac in botanice, notandae non veniunt; tum quod symptomatologia, in quibuscunque fere Pathologiae generalis systematibus exhibita, plurimum in hac re jam praestitit. Fatendum quidem, symptomatologias vulgo prolatas, nec adeo plenas esse, nec adeo exactas, ac optandum esset; et, si pleniores fierent, atque ubique voces magis idoneae et accurate definitae usurpatae essent, ad nosologiam perficiendam certe plurimum conferre posset. In hujusmodi vero tentamine cavendum est, ne distinctiones nimium subtiles et dubiae adhibeantur, uti ab auctore *Observationum*

*servationum Clinicarum*, quae Warfaviae annis 1767 et 1768 prodierunt, factum fuisse opinor. Ipse quidem hujusmodi nihil tentavi, tum quod plus exegisset, quam per longum tempus mihi suppetivit otii, tum quod mihi minus necessarium videtur, qui vocem apud medicos usitatissimas, et in sensu vulgo recepto, ubique fere usurpandas curaverim.

Quod ad denominationem morborum attinet, in *Classium*, *Ordinum*, et *Generum* nominatione, eas, quantum potui, regulas observavi, quae in LINNAEI *Criticis Botanicis*, et in ejusdem *Philosophia Botanica*, ab ill. auctore traduntur.

Quando notiones novae sunt proferendae, etiam nova nomina imponenda sunt, et ejusmodi aliquando, parcius licet, adhibuimus. Cum vero nomenclaturam medicam, diuturno usu confirmatam, sine gravi causa mutare non liceat; ne factum esset ubique curavimus; quod tamen ill. LINNAEUM saepe, nulla urgente necessitate, fecisse, et VOGELIUM, appellationibus

bus novis, frivolis, ineptisque, Nosologiam deturpasse, observavimus.

UT clarior et certior habeatur morborum notitia, appellationibus selectis, synonyma, tum aliorum nosologorum, tum auctorum maxime celebrium, ubique apposuiimus. Hoc diligentius feci, ut inde norint studiosi, ex quibus praecipue scriptis, morborum scientia optime obtineri possit.

IN recensendis specierum synonymis, appellationes, quibus SAGARUS usus sit, omisi, tum quod ipse aliorum auctorum synonyma ubique omittens, nos de speciebus, quas indicare voluit incertos, saepe reliquit; tum quod, in recensione specierum, illum profecto minus peritum fuisse, et regulas nosologiae methodicae optimas quasque neglexisse, nobis videtur.

SYNONYMA veterum medicorum adhuc omisi, non quod eorum scripta prorsus negligenda esse putaverim, sed quod ego, neque satis certo, neque cum fructu, synonyma eorum indicare potuerim.



# S E R I E S

## CLASSIUM et ORDINUM \*.

CLASSIS I. PYREXIÆ. — 43 —

ORDO I. FEBRES. — 44 —

II. PHLEGMASIÆ. — 82 —

III. EXANTHEMATA. — 130 —

IV. HÆMORRHAGIÆ. — 153 —

V. PROFLUVIA. — 171 —

CL. II. NEUROSES. — 181 —

O. I. COMATA. — 182 —

II. ADYNAMIÆ. — 197 —

III. SPASMI. — 209 —

IV. VESANIÆ. — 252 —

\* Classium institutionem primo a SAUVAGESIO datam, LINNÆUS, VOGELIUS, et SAGARUS, in omnibus fere, secuti sunt. Cum vero ex eorum classibus plures sint, uti VITIORUM, ANHELATIONUM, DOLORUM, et FLUXUUM, neque naturales, nec quovis modo idoneae, ejusmodi institutionem sequi non potui. Aliam itaque simpliciore, et in unum, ut

ut

## CL. III. CACHEXIÆ.

O. I. MARCORES. —

H. INTUMESCENTIÆ.

III. IMPETIGINES. —

## CL. IV. LOCALES.

O. I. DYSÆSTHESIÆ. —

~~II. DYSOREXIÆ.~~

III. DYSCINESIÆ. —

III. APOCENOSES. —

IV. EPISCHESES. —

VI. TUMORES. —

VII. ECTOPIÆ. —

VIII. DIALYSES. —

ut mihi videtur, aptiorem, hic protuli. Haec fortasse etiam minus absoluta videri possit, quod inter morbos totius systematis, in primis tribus classibus recensitos, et illos partis singularis, sive LOCALES, in classe quarta collocatos, distinctio non ubique facilis erit. Hoc quidem, rarius licet, aliquando fieri posset concedimus. Sed nihil praestantius nobis nunc suppetit; et, ob rationes in Prolegomenis, pag. xii. allatas, de perfecta classium institutione non admodum solliciti sumus.

## CL. I. PYREXIÆ.

CHARACTER. Post horrorem pulsus frequens, calor major, plures functiones laesae, viribus praesertim artuum immixtis \*.

SYNONYMA. Morbi febriles *Auctorum.*

\* Quod hic, et pluribus quae sequuntur locis, nobis forsitan vitio verti possit, quodammodo hic obiter excusare liceat. Ita, dici potest, pyrexias aliquando videri, quas nullus praecesserat horror, et pyrexias in quibus neque pulsus frequentior, neque calor major, quam in sanis esse solet; characterem ideo datum neque verum, neque ubique adhibendum. Istiusmodi pyrexias, rarissime licet, aliquando videri negare nolo; sed, in characteribus classium, ad species dignoscendas adhibendis, ut singulae classis notae in unaquaque specie conspiciantur, haud necessarium videtur, et sufficit, si earum pleraeque in specie quavis adsint.

Character idoneus quisque, plurium notarum five symptomatum concursum notare debet, et male quidem  
cum



## ORDO I. FEBRES.

Praegressis languore, lassitudine, et aliis debilitatis signis, pyrexia sine morbo locali primario.

Febres *Auctorum* S. Cl. II. V. Cl. I. *Sag.* Cl. XII.

Morbi febriles critici L. Cl. II.

cum veteribus VOGELIUS calorem auctum solum, et recentiores SYLVIVS et Cel. BOERHAAVIUS pulsuum velocitatem solum, pro charactere pyrexiae, sive febris, ut vocant, posuerunt. Certe, qui dicunt febrem adesse, etsi pulsus nihilo naturali frequentior sit, ex aliis quam velocitate pulsuum signis febrem adesse iudicant; quod etiam plurium symptomatum notationem, in quovis charactere necessariam esse, ostendit.

Porro, hic obiter observari velim, pulsuum velocitatem solum, pyrexiam vel febrem adesse nequaquam semper indicare; cum a causis externis plurimis pulsus sit naturali velocior, sine morbo, sive quavis functionum laesione. Hisce de pyrexiae charactere quaestionibus, in charactere a nobis hic dato, quantum potuimus, prospectum est. Sed, in aliis classium et ordinum characteribus adeo felicem esse vix licet; et in characteribus plerisque, si ad species plerasque characteres recte adhiberi possit, paucas exceptiones non moror. Utilem plerumque fuisse mihi sufficit, ubique perfectum fore non spero.



## SECT. I. INTERMITTENTES.

Febres, miafmate paludum ortae, paroxyfmis pluribus, apyrexia, faltem remiffione evidente interpofita, cum exacerbatione notabili, et plerumque cum horrore redeuntibus, conftantes : Paroxyfmo quovis die unico tantum \*.

Intermittentes *Auētorum* S. Cl. II. O. III. L. Cl. II.

O. II. V. Cl. I O. I. *Sag.* Cl. XII. O. III.

Remittentes *Auētorum* S. Cl. II. O. II. *Sag.* Cl. XII.

O. II. †.

\* Qui perpenderit quae de febribus *remittentibus*, quae videntur continuae, a *continuis*, ftrictius dictis diftinguendis, mox dicenda funt, facile videbit quamobrem, tum intermittantium tum continuarum charactērem antea datum, hic mutare neceffarium habui.

† Februm *remittentium*, quafi a febribus *intermittentibus* exquisitis prorfus differentium, ordinem feparatum inftituerunt Noſologi SAUVAGESIUS,

LIN.

Exacerbantes L. Cl. II. O. III.

Continuae V. Cl. I. O. II. \*.

Continuae periodicae *Sennert.* de febr. Lib. II. cap. 13.

Continuae remittentes, *Boerb.* Aph. 727.

Compositae ex acuta periodo, *Junk.* Tab. 82.

Continuae remittentes, proportionatae, *Torti.* Therap. Spec. L. V. cap. I.

Continentes *Mortoni*, Exerc. II.

LINNAEUS, et SAGARUS; minus recte tamen, si mihi judicare fas sit. *Remittentes* enim, quae dicuntur, ex eodem principio, miasmate nempe paludum, ac *intermittentes*, oriuntur; iisdem in locis, et eodem anni tempore, utraque simul epidemice grassatur; utraque iisdem prorsus remediis sanatur; et saepissime in eodem homine idem, qui videtur, morbus, nunc intermittens nunc remittentis typum exhibet, Morbi idcirco, causis, sanatione, et typo simillimi, nec ad ordinem, nec ad sectionem diversam distrahendi erant.

\* Magis inconsulto adhuc VOGELIUS *remittentes* omnes cum *continuis* sociavit. *Continuae*, quas vocamus, omnes quidem remissiones et exacerbationes ostendunt; sed a *remittentibus* ad *intermittentes* merito referendis, plurimum aliis multis differunt, ut mox dicetur.

## GENUS. I. TERTIANA.

Paroxyfmi fimiles intervallo quadraginta octo circiter horarum : Acceffionibus meridianis.

*Tertiana Auctorum*, S. G. 88. L. 16. V. 2: *Sag.* p. 704. *Hoffm.* Tom. II. pag. 11. *Stabl.* de tertiana febris genium univerfum manifestante, Hae-  
lae 1706. Ejusd. *Casual. magn. Caf.* 21. *Casual.*  
*min. Caf.* 96. *Cleghorn's diseases of Minorca*,  
cap. III. *Senac*, de recond. febr. natura.

TERTIANA est vel

I. Interposita apyrexia, quae

1. Variat paroxyfmi duratione.

A. Tertiana paroxyfmis haud ultra horas duodecim extensis.

*Tertiana legitima*, S. sp. 1. *Sennert.* de febr. L. II.  
cap. 18. *Hoffm.* Tom. II. p. 12.

*Tertiana vera*, *Clegh.* Min. p. 140.

B. Tertiana paroxyfmis ultra horas duodecim extensis.

## 48 GENERA MORBORUM

Tertiana notha sive spuria, S. sp. 2. *Sennert.* de febr. L. II. c. 18. *Clegh.* Min. p. 140. *Hoffm.* Tom. II. p. 12.

2. Variat paroxysmorum recurfu.

C. Tertiana quotidie revertens, paroxysmis inaequalibus, alternis similibus.

Tertiana duplex, S. sp. 13. *Sennert.* de febr. L. II. c. 21. V. G. 12. *Clegh.* Min. p. 141.  
 Duplicana L. 18.

D. Tertiana alternis diebus revertens, paroxysmis eodem die binis.

Tertiana duplicata, S. sp. 14. *Jones,* de febr. interm. P. II. cap. 6. *River.* Cent. IV. obs. 16.

E. Tertiana quotidie revertens, paroxysmis altero die binis, altero unico tantum.

Tertiana triplex, S. sp. 15. *Clegh.* Min. p. 142. Semitertiana *Hoffm.* II. p. 40.

Semitertiana primi ordinis *Galen,* *Spig.* de semitertiana, L. II. cap. 4.

F. Tertianæ quotidie revertens, interposita remissione inter diem imparem et parem magis, inter parem et imparem minus, notabili.

Hemitritæus, *Celsi* L. III. cap. 3.

Semitertiana, *Glegb.* Minorc. p. 143. \*.

Semitertiana secundi ordinis, *Galenii, Spig.* L. II. c. 5.

Amphimerina hemitritæus, S. sp. 8.

Amphimerina pseudo hemitritæus, S. sp. 9. \*.

G. Variat symptomatibus.

G. Tertianæ affectibus soporosis stipata.

Tertianæ carotica, S. sp. 10. *Wertholf.* de febribus, et auctores ab eo allegati, p. 6.

Tertianæ hemiplegica, S. sp. 20. *Wertholf* ibid.

Quotidiana soporosa, S. sp. 8 *Car. Pis.* obl. 175. 176.

Febris caput impetens, *Sydenh.* Ep. ad R. Brady.

H. Tertianæ spasmodicis et motibus convulsivis stipata.

\* Fortassis hemitritæa quævis ad remittentes relegari possit; et, licet affines separare nolui, limites non satis certe ponendos esse fateor.

## 50 GENERA MORBORUM

Tertiana asthmatica, S. sp. 6. *Bonet. Polyalth. Vol.*  
I. p. 250.

Tertiana hysterica, S. sp. 8. *Wedelii A. N. C. Dec.*  
I. A. II. obs. 193.

Hysteria febricosa, S. G. 135. sp. 8. *A. N. C. Dec.*  
Ann. II. obs. 193.

Tertiana epileptica, S. sp. 16. *Calderae Trib. me*  
p. 225. *Lautter. Hist. med. bienn. Cap.*  
cas. 2.

Quotid. epileptica, S. sp. 3. *Edinb. Essays, Vol. V.*  
II. art. 49.

Ecclampsia febricosa, S. G. 133. sp. 17.

Epilepsia febricosa, S. G. 134. sp. 9.

Tertiana tetanodes *Medici Beobacht. I. Band. p. 24*

Tetanus febricosus, S. G. 122. sp. 10. *Stork, An*  
Med. II. p. 163.

### I. Tertiana efflorescentia cutis stipata.

Tertiana petechialis, S. sp. 3. *M. Donati, L. II*  
Cap. 14. *Lautter. Hist. Med. cap. II. cas. 10.*

Tertiana scorbutica, *Wedel. A. N. C. Dec. I. A.*  
Obs. 193.

Tertiana urticata, S. sp. 22. *Planchon. Journ. c*  
med 1765. *Glegh. Minorc. p. 157.*

Tertiana miliaris, S. sp. 21. *Walthieri de me*  
German. apud *Roncalli Europ. med. p. 151.*



## K. Tertianā phlegmasia stipata.

Tertianā pleuritica, S. sp. 4. *Valesii* in epid. L. 1.

Seçt. 3 *Lautt.* hist. med. cap. II. cas. 5 9.

Pleuritis periodica, S. G. 103 sp. 14.

Tertianā arthritica, S. sp. 5. *Morton.* Exerc. I. cap.

IX. hist. 22. *Lautt.* loc. cit. cas. 19.

## 4. Variat aliis morbis complicata.

Tertianā scorbutica, S. sp. 9. *Etmuller,* prax. L. I.

Seçt. XVI. cap. 2. *Timaei* L. VIII. cas. 15.

Tertianā syphilitica, S. sp. 17. *Deidier* de morb.

vener. Seçt. IV.

Tertianā verminosa, S. sp. 18. *Stiffer.* in act. Helm-

stad. *Lancis* de noxis palud. L. II. cap. 5. et 6.

Illust. *Pringle* Diseases of the army, p. 98. *Ra-*

*mazzini* const. epidem. rural. ann. 1690. Seçt.

XI. *Van den Bosch.* Const. epid. verminos. ann.

1760, &c.

## 5. Variat ratione principii \*.

\* Nullum quidem febrium intermittentium prin-  
cipium sufficiens praeter miasma paludum agnosci-  
mus ; sed, cum miasma hoc non semper validum sit ad  
morbum arcessendum, nisi aliæ potestates excitantes

Simul

Tertiana accidentalis, S. sp. 12. *Sydenham*, cap. 5.

Tertiana a scabie S. sp. 11. *Juncker*, tab. 80. *Hoffm.* II. p. 12.

## II. Interposita remissione tantum \*.

Tritaeophya, S. G. 85. *Sag.* p. 695.

Tritaeus, L. 21.

Hemitritaea, L. 23.

Tertianae remittentes et continuae *Auctorum*.

Tertianae subintrantes, proportionatae, subcontinuae *Torti* Therap. Special. Lib. III. cap. 1.

simul agere concurrant; has potestates excitantes; pro parte principii hic admittimus, licet neutiquam morbum excitassent, si miasma paludum non antea applicatum fuisset.

\* Tertianae Remittentes variant adeo, tum typi tum symptomatum ratione, et formae earum diversae adeo saepe in eodem homine inter se commutantur, ut in iis denominandis nihil fere quod perpetuum sit efferri possit. Tertianas autem, quas comitatas dixit *TORTI*, eas scilicet quae symptomate quodam peculiari et gravi comitantur, recensui; dein, ut caetera ad hanc rem pertinentia intelligantur, auctores plures qui de tertianis remittentibus optime scripserunt, et exempla earum praecipua exhibuerunt, enumeravi.



- Tertiana subcontinua, S. sp. 19.  
 Quotidiana deceptiva, S. sp. 2.  
 Amphimerina femiquintana, S. sp. 24.  
 Tritaeophya deceptiva, S. sp. 10.

x tertianis comitatis *Torti* loc. cit. prae-  
 cipuae sunt :

1. Tertiana cholERICA sive dysenterica, *Tort.* ibid.  
*Lautter*, Hist. med. cas. 6. 16. 17. 20. *Morton*,  
 App. ad Exerc. II.
2. Tertiana subcruenta sive atrabilaris *Tort.* ibid.  
 Haec a *Cleghornio* nunquam visa est.
3. Tertiana cardiaca *Tort.* ibid. *Lautter*, Hist. med.  
 cas. 15. 18. 23.  
 Amphimerina cardiaca, S. sp. 5. \*.  
 Tritaeophya affodes S. sp. 6.  
 Febris continua affodes, V. 27.

\* Amphimerinas inter et Tritaeophyas, uti inter  
 quotidianas et tertianas duplices, distinctio saepe dif-  
 ficilis. Sed quotidianas tertianis multo rariores,  
 et oeconomiam animale in febres typi tertiani  
 maxime proclivem esse norunt experti, hinc plures  
 amphimerinas ad tertianas remittentes retuli. Judi-  
 cent autem autoptae.

D. Tertianæ diaphoretica, *Tort. ibid.*

*Tritaeophya typhodes*, S. sp. 4.

*Tritaeophya elodes*, S. sp. 5. †.

Febris continua elodes, V. 21.

E. Tertianæ syncopalis *Tort. ibid. Lautter, cas. 11.*

12. 13. 15. 16.

*Tritaeophya syncopalis*, S. sp. 1:

*Amphimerina syncopalis*, S. sp. 4.

*Amphimerina humorosa*, S. sp. 6.

Febris continua syncopalis, V. 29.

F. Tertianæ algida; *Tort. ibid. Lautter, cas. 13.*

*Amphimerina epiala*, S. sp. 3.

*Amphimerina phricodes*, S. sp. 7.

*Tritaeophya leipyria*, S. sp. 9.

Tertianæ leipyria, S. sp. 23. *Valcarenghi Med. Ration. p. 18.*

Febris continua epiala et leipyria. V. 19. et 24.

G. Tertianæ lethargica, *Tort. ibid.*

*Tritaeophya carotica*, S. sp. 7. *Lautter, 1. 7. 14.*

Tertianæ apoplectica *Morton. Exerc. 1. cap. IX. Hist. 25.*

Tertianæ soporosa *Werlholf. de febr. p. 6.*

Febris epidemica Urbevetana *Lancif. de noxiis pal. effluv. I. II. c. 3.*

† De typo febris sudatoriae *Boyeri Meth. à suivre dans les malad. epidem.* quam huc retulit Sauvage-  
fius, ex ipsius Boyeri descriptione mihi non liquet, et  
ad typhum referri mallet.

Tertianarum remittentium exempla praecipua, nobis nota, sunt sequentia.

Causos *Hippocratis*. De Morb. Vulg. L. III. sect. 3.

Tritaeophya caufus, S. sp. 2.

Febris ardens *Boerhaavii*, Aph. 738 ?

Tertiana perniciofa, quae simulata tertiani circuitus effigie lethalis, et mille accidentibus periculofiffimis implicata, existit. *Lud. Mercatus* de febribus, Lib. VI.

Tertiana pestilens, *P. Sal. Diverfus* de febris pestilenti, cap. X.

Tertiana maligna pestilens *Riverii*, L. XVII. Sect. II. c. 1. et Sect. III. c. 3.

Morbus Hungaricus *Lang. Lemb.* L. I. Ep. 4. *Sennert.* de febr. L. IV. cap. 14. *Jordan.* de pestis phaen. cap. 19.

Languor Pannonicus *Cober.* obs. castr. Hung. 1. obs. 6. &c.

Amphimerina Hungarica, S. sp. 10.

Vide postea, notas ad Typhum.

Hemitritaeus pestilens, *Schenck* obs. L. VI. ex *Corn. Gemma.*

Febres pestilentes *Aegyptiorum*, *Alpin.* de med. Aegypt. L. 1. cap. 14.

Febris tertiana epidemia, *Bartholin.* Hist. anat. cent. II. 56.

Febres epidemicae Autumni ann. 1657 et 1658, *Willis* de febr. cap. 16.

## 56 GENERA MORBORUM

Febris syneches epidemica ab ann. 1658 ad 1664  
et postea ab ann. 1673 ad 1691. *Morton*. App. an  
*Exerc.* II.

Febres Autumnales incipientes, *Sydenh.* de morbo  
acut. ad ann. 1661—1664, et in epist. ad *H. Parn-*  
*man* ad 1678, et seq.

Affectus epidemicus Leidenfis, *Fr. Sylvii* Prax. medd  
app. tract. X. et oratio de affectus epidemici  
causis.

Morbus epidemius Leidenfis 1669, *Fanois*, Diss.  
apud *Haller*. Disp. tom. V.

Tertianae perniciosae et pestilentes et febres castren-  
ses epidemiae *Lancisi* de nox. palud. effluv.

Febres intermittentes anomalae et mali moris, *Hoffm.*  
II. p. 38.

Febris cholERICA minus acuta, *Hoffm.* II. p. 112.

Febris epidemica Leidenf. ann. 1719. *Koker* apud  
*Haller*, Disp. tom. V.

Amphimerina paludosa, S. sp. 19.

Febris paludum Illustr. *Pringle* Diseases of the army,  
Ed. 4ta, 8vo, p. 179.

Bononienfis constitutio hiemalis 1729, *Beccari* in  
A. N. C. Vol. III. Obs. 48.

Amphimerina biliosa, S. sp. 22.

Febris Castrenfis, Illustr. *Pringle* loc. cit. p. 174.

Febris putrida epidemica, *Huxham* de aëre ad ann.  
1729.

Febris biliosa Lausanensis, *Cl. Tissot*. de febr. bilios.

Tritaeophya Wratislavienſis, S. ſp. 3. *Hahn.* Epidemia verna Wratislav. in app. ad A. N. C. vol. X.

Tritaeophya Americana, S. ſp. 12 ?

Febris anomala Batava, *Grainger* de febr. anomala.

Morbus Naronianus *Pujati* de morb. Naron.

Febris continua remittens, *Hillary's* Diſ. of Barbadoes.

Febris remittens Indiae Orientalis, *Lind.* Med. Edin. Diſſ. Inaug. 1768.

Febris critica et febr. bilioſa aeſtatis, *Rouppé* de morb. navig.

Febris remittens regionum calidarum, Cl. *Lind.* Med. Haſlar. Eſſay on the diſeaſes of hot climates.

Tertiana remittens ſymptomatica eſt.

Tritaeophya lactea, S. ſp. 8.

Febris lactea, *Etmulleri* Coll. conſult. caſ. 57.

## II. Q U A R T A N A.

Paroxyſmi ſimiles intervallo ſeptuaginta duarum circiter horarum : Acceſſionibus pomeridianis.

## 58 GENERA MORBORUM

Quartana *Auſtorum* S. G. 89. L. 17. V. 3. *Sag.* 711.  
*Hoffm.* II. p. 23. *Junck.* tab. 81.

Eſt vel,

I. Interpoſita apyrexia.

1. Variat typo.

A. Quartana paroxyſmis quarto quoque  
die ſingulis ; aliis diebus nullis.

Quartana legitima, S. ſp. 1. *Sydenham* de morbo  
acut. cap. V.

B. Quartana paroxyſmis quarto quoque  
die binis ; aliis diebus nullis.

Quartana duplicata, S. ſp. 4. *Bonet.*

C. Quartana paroxyſmis quarto quoque  
die tribus ; intermediis diebus nul-  
lis.

Quartana triplicata, S. ſp. 16.

D. Quartana quae ex quatuor diebus ter-  
tium tantum a febre vacuum habet,



paroxysmis quarto quoque die similibus.

Quartana duplex, S. sp. 3. V. 13.

Quartana quotidie accedens, paroxysmis quarto quoque die similibus.

Quartana triplex, S. sp. 5. V. 14. *Barthel. H. anat. c. 1. 95.*

Variat symptomatibus,

Quartana cataleptica, S. sp. 7. *Bonet. Polyalth. vol. 1. p. 805.*

Quartana comatosa, S. sp. 15. *Werthof. de febr. C. Pisonis Observ. de morbis a colluvie serof. obs. 166. 167. 168. 169. 171. 172. 173. 174.*

Quartana epileptica, S. sp. 8. *Scholzii Conf. 379. 380.*

Quartana hysterica, S. sp. 10. *Morton. Pyret. Exerc. I. cap. IX. H. 10. 11.*

Quartana nephralgica, S. sp. 9.

Quartana metastatica, S. sp. 17.

Quartana amens, S. sp. 12. *Sydenham de morb. acut. cap. V.*

Quartana splenetica, S. sp. 2. *Etmuller. Coll. consult. cas. 25.*

## 3. Variat aliis morbis complicata.

Quartana syphilitica, S. sp. 6. *Plateri* obs. L. III. p. 676. *Edinb. Eff.* art. XLVII. obs. 8.

Quartana arthritica, S. sp. 11. *Musgr.* de arthr. sympt. cap. IX. H. 4 et 5.

Arthritis febrifequa, S. sp. 10.

Arthritis febricosa, S. sp. 10. *Werlhof.* de febr. *Cockburn* de morbis navigantium, obs. 19.

Quartana scorbutica, S. sp. 14. *Barthol.* de med. Dan. diss. IV. *Tim.* L. VIII. cas. 18.

## II. Interposita remissione tantum.

Tetartophya, S. G. 85. *Sag.* 323. L. 22.

Quartana remittens *Auctorum.*

## Varietates sunt,

Tetartophya simplex, S. sp. 1. \*.

\* Quartanam continuam morbum rarissimum esse, testantur scriptores medici omnes; sed illius exemplum ex *Franc. Joelis* operum tomo 3. citat. *SAUV.* In loco autem citato, nihil ad rem pertinens inveni; sed tomi quinti pag. 63. haec verba proferuntur.



*Amphimerina femiquartana*, S. sp. 23.

*Tetartophya semitertiana*, S. sp. 5.

*Tetartophya maligna*, S. sp. 6. *Lautter.* Hist. med. cas. 21. *M. Donat.* L. III. cap. 14. ex *M. Gatenaria.* *Horst.* L. 1. obs. 15.

*Tetartophya carotica*, S. sp. 4. *Werlhof.* de febr. *Bianchi* Hist. hep. pars III. const. ann. 1718. p. 751.

*Tetartophya splenalgica*, S. sp. 2. \*.

runtur. Febris quartanae “ Species veteres duas constituunt. *Quartanam continuam*, (quae mihi septuagenario nunquam visa est, et ideo eam aut rarissimam aut nullam esse judico), et *Interpolatam*, quae frequentissima est.

\* Huc febrem Fernelianam *Raym. Fortis* refert *SAUV.* et vult febrem ita a *Forte* dictam fuisse, quod ea mortuus sit ipse Fernelius : Sed quodammodo hic errasse *SAUVAGESIUS* mihi videtur. Nam febres quasdam Fernelianas vocat *Fortis*, Tom. II. cent. II. obs. 35. et 36. non quod e genere remittentium fuerint, sed quod visceris cujusdam, hepatis praefertim, laeae comitatae sint ; et mortuus quidem est Fernelius ex inflammatione lienis. Sed quod hic morbus quartanae typum unquam exhibuit, non dicitur a *Plantio*, qui in vita Fernelii, operibus ejus praefixa, de eo morbo narrat.

Tetartophya hepatalgica, S. sp. 3. *Car. Pif.* in  
 praefat. p. 33.

Amphimerina spasmodica, S. sp. 16.

## E R R A T I C Æ.

Ad Tertianam vel Quartanam ERRATICASS  
 S. pertinere putamus\*; et hic ideo earum  
 varietates subjunximus.

Erratica quintana, S. sp. 1. *Tulp.* L. III. 52.  
*Forest.* L. III. obs. 43. ex quartana ill. *Van*  
*Swieten*, Comm. p. 505.

Erratica septana, S. sp. 2. *Boerh.* apud ill. *Van*  
*Swieten* ibid. *M. Don.* L. 3. 14.

Hebdomadaria *Schenckii* ex *Gibalto*.

Septimana, ill. *Morgag.* XLIX. 36.

Erratica octana, S. sp. 3. *Etmuller* prax. L. I.  
 Sect. XV. cap. 2. *Cyrilli* in *Etmuller*, p. 187.  
 188. 365. *Valles* Controv. L. V. c. 25. *P. Sal.*  
*Div.* in not. ad D. A. de *Altomari*, cap. XII.  
*Zacut.* *Luf.* P. M. L. III. obs. 34. *Schult-*  
*zius* in E. N. C. D. I. ann. IV. et V. ob. 70.  
*Arnold.* de febr. Stomach. epid. § IV. apud  
*Haller.* Diff. Pract. Vol. V. *De Haen* de divis.  
 febr. div. iv. p. 9.

\* Vide Senacum de recondita febrium natura,  
 L. I. Cap. 1.

Hemicrania lunatica, S. sp. 10.

Erratica nonana, S. sp. 4. *Zac. Luf. ibid.*

Erratica decimana, S. sp. 5. *Zac. Luf. ibid.*

Ephemera dichomene, S. sp. 11. *M. Don. L. III.*

14. ex *Gentili.*

Erratica vaga, S. sp. 6. *River. cent. III. obs. 32.*

*Etmuller, L. I. S. XV. c. 2.*

### . III. QUOTIDIANA.

Paroxyfmi fimiles intervallo viginti quatuor circiter horarum : Paroxyfmis matutinis.

Quotidiana *Auctorum*, S. G. 87. L. 15. V. 1.

*Hoffm. II. 33. Junck. tab. 79.*

Interposita apyrexia.

Variat folitaria.

. Universalis.

Quotidiana eadem hora matutina re-  
diens.

Quotidiana simplex, S. sp. 1.

Quotidiana legitima, *Sennert de febr. cap. 18.*

## B. Partialis.

- Quotidiana partialis, S. sp. 10. *Cnoffel. E. N. C.*  
 D. I. A. III. obs. 205. *Edinb. Med. Eff.* vol. I.  
 art. 31. vol. II. art. 19.
- Quotidiana cephalalgica, S. sp. 6. *Morton Pyret.*  
 exerc. I. Hist. 27. *Van Swieten in Boerh.* p.  
 534.
- Cephalalgia intermittens, S. sp. 7.
- Cephalaea febricosa, S. sp. 4.
- Quotidiana ophthalmica, *Morton*, *ibid.* hist. 17.  
*Van Swiet.* *ibid.*
- Ophthalmia febricosa, S. sp. 23.

## 2. Variat comitata.

- Quotidiana ischiadica, S. sp. 5. *Edinb. Eff.* vol.  
 V. art. 49.
- Ifchias intermittens, S. sp. 1.
- Quotidiana nephralgica, S. sp. 7. *Morton*, *ibid.*  
 hist. 28.
- Nephralgia febricosa, S. sp. 13.
- Quotidiana uretico-sputatoria, *B. Scharf. E. N.*  
 C. D. II. A. II. obs. 104.
- Quotidiana epileptica, S. sp. 4. *Edinb. Eff.* loc.  
 cit.
- Hysteralgia febricosa, S. sp. 9.

Vespertinae vel symptomaticae videntur frequentes.

Quotidiana hysterica, S. sp. 3.

Quotidiana catarrhalis, S. sp. 9.

Quotidiana stranguinosa, S. sp. 11.

## II. Interposita remissione tantum.

Amphimerina, S. G. 84. L. 20. *Sag. Gr. 321.*

Quotidiana continua, V. 15.

Quotidianae remittentes et continuae *Auclorum.*

Amphimerina laticia, S. sp. 1.

Febris continua lymphatica, *Etmuller Coll. conf. cas. 32. River. obs. cent. I. obs. 57.*

Amphimerina singultuosa, S. sp. 14.

Febris continua Lyngodes, V. 26.

Amphimerinae S. caeterae vel ad tertianas pertinere, quorsum plures supra retuli, vel symptomaticae et vespertinae esse videntur. Hujusmodi sunt,

Amphimerina catarrhalis, S. sp. 2.

Amphimerina anginosa, S. sp. 12.

Amphimerina tussiculosa, S. sp. 13.

Amphimerina peripneumonica, S. sp. 15.

Amphimerina variolosa, S. sp. 20.

Amphimerina miliaris, S. sp. 11.

Amphimerina arthritica, S. sp. 21.

De Amphimerina mimosa *Bontii* et phrenitica  
ejusdem, S. sp. 17. 18. non liquet.

## SECT. II. CONTINUÆ\*.

Febres, sine intermissione, nec miasmatis

\* *Quae sine exacerbatione partiali, et sine accessu, non pluries quam semel vel bis in mense revertens, ad usque finem acgritudinis perseverat, Febrem Continuumam esse, dixit SAUVAGESIUS; et hujusmodi febres, cum scholis medicis plerisque, Continentes vocat LINNAEUS. Hujusmodi autem febrem in quadraginta annorum praxi satis frequenti, vix unquam certo vidi, et fere semper in febribus, maxime continuis, exacerbationes et remissiones, etiam quotidie, satis manifestas observavi. Mecum quidem sentire videtur VOGELIUS, uti ex ejus continuarum charactere satis patebit; nec dissentit expertissimus DE HAEN, uti videre est in libro ejus de divisione februm, Divis. IV. Schol. 1.; et apprime sententiam nostram confirmat BRENDELIUS, verbis sequentibus: “ Omnes namque febres nostrae, acutae, et inflammatoriae, et exanthematicae, et malignae, reliquaevae hujus generis, sunt continuae remittentes, et lucu-*



paludum ortae, sed cum remissionibus et exacerbationibus, parum licet notabilibus, perstantes: Paroxyfmis quovis die binis \*.

*luculenta intensio- rum remissionumque spatia integrant."* Brendel. Opuscul. P. II. Diff. XI. sect. 5.

Porro, etsi in febribus quibusdam exacerbationes et remissiones parum notabiles, et perinde observatu difficiles sint, easdem tamen revera fieri censeo; et ob hoc praesertim, quod in febribus quibuscunque, ex paroxyfmis pluribus manifesto constantibus, paroxyf- mus quisque, inter nycthemerae spatium, cursum suum, ex exacerbatione et remissione constantem, semper absolvat, ita ut in his rebus oeconomiam animalem circuitus diurni legi cuidam subjici videatur. Huic etiam in sanitate parere solet, et huic in febribus hecticis quibusque ad amissum subjicitur. Verisimillimum itaque videtur, eundem circuitum, quem toties observavimus, in febribus quibuscunque locum habere; nec febrem quamcunque continen- tem revera in rerum natura dari.

\* Cum continuam quamque ex paroxyfmis repetitis consistere ponimus, saepe ambiguum fieri possit,



Continuae, S. Cl. II. O. I. V. Cl. I. O. II. *Sag.*

*Cl. xij O. i - 316. Boerb. 727.*

Continentes, L. Cl. II. O. I. *Stabl. Cas. magn.*

35. *Cas. min. 87. Junk. 58. Sennert. de*

*febr. L. II. cap. 2. et 10.*

possit, utrum febris data ex continuarum fit, an ex remittentium ordine, et ut rite determinetur, tum intermittentium, ad quas omnes auctorum remittentes pertinere putamus, tum continuarum, definitionem aliam quam antea nunc dedi. In plerisque casibus, ut opinor, definitiones nunc datae sat facile et certo adhiberi possint. Sed sagacioribus quibusvis examinandum relinquo, an vel definitiones nostrae recte dentur, vel si quid rectius dari queat. Febrem quamque continuam ex paroxysmis quovis die binis constare credimus; cum autem in quibusdam tum intermittentibus tum remittentibus, itidem paroxysmi duplicati videantur, ex illa nota sola febre continuae dignosci non possunt. Ex illa nota soliquidem ut dignoscantur nequaquam volui; nam in casu quovis ambiguo, vel a principio, vel a typo, vel ortu ab intermittentibus, remittentem quamvis cognosci posse puto. Videant porro in his rebus verum fati, annon a principio, saepe manifesto et maximifrequenti, contagione nimirum humana, febre continuae saepe certe cognosci possint.

## G. IV. S Y N O C H A \*.

Calor plurimum auctus ; pulsus frequens, validus, et durus ; urina rubra ; sensorii functiones parum turbatae.

\* Februm continuarum divisio, a GALENI temporibus, in hunc usque diem, eadem fere usitata est, et vel ex putredinis gradu parum accurate definito, vel ex duratione morbi, desumpta fuit ; utraque tamen nota, posterior praesertim, qua praecipue usi sunt Nosologi SAUVAGESIUS, LINNÆUS, et SAGARUS, manifesto inepta est. Vide *Prolegomena*, pag. XXV. et pag. XXXIII. et XXXIV. Aliam itaque divisionem a differentia symptomatum, et a natura morborum, quantum de ea judicare liceat, desumptam, institui ; secutus simul illam apud Britannos nunc maxime usitatam divisionem februm continuarum in *Inflammatorias* et *Nervosas*. Has autem appellationes, utpote quodammodo theoreticas, vitavi. Nomina quibus usus sum apud medicos dudum recepta sunt ; et si forsitan sensu vulgo recepto, in quo medici ipsi parum constantes fuerunt, iis non usus sum, parum curo, dum definitiones subjunctae ab errore quovis praecavere possint.

Synocha, S. G. 80. L. 12. *Junck.* 58.

Synocha, five febris acuta sanguinea, *Hoffm.* II.  
105.

Synochus, V. 16.

Continua non putris, *Boerh.* 729.

Ephemera, S. G. 79. *Boerh.* 728. *Junck.* 57.

Diaria, L. 11.

Febris inflammatoria *Auſtorum.*

### Varietates sunt,

Synocha plethorica, S. sp. 1.

Synocha sanguinea, *Sennert.* de febr. L. II.  
cap. 11.

Ephemera plethorica, S. sp. 1.

Ephemera a frigore, S. sp. 3.

Ephemera a calore, S. sp. 4.

Synochus pleuritica, S. sp. 5.

Febris pleuritica Ann. 1765. *Sydenh.* sect. V.  
c. 1. 5.

Synochus rheumatifans, S. sp. 7. *Sydenh.* sect. V.  
c. 2.

Synochus hiemalis, S. sp. 8. *Sydenh.* in P. S. ad  
tractat. de hydropse.

### Symptomaticae sunt,

Ephemera nauseativa, S. sp. 2.

Ephemera a phlogosi, &c. S. sp. 6.

Synocha dolorum, S. sp. 7.

Ephemera lactea, S. sp. 5.

Ephemera menstrua, S. sp. 8.

Synocha catarrhalis, S. sp. 5.

Synocha scorbutica, S. sp. 6.

Synochus scorbutica, S. sp. 13.

Synocha cephalalgica, S. sp. 8.

## G. V. T Y P H U S.

Morbus contagiosus ; calor parum auctus ; pulsus parvus, debilis, plerumque frequens ; urina parum mutata ; sensorii functiones plurimum turbatae ; vires multum imminutae.

Typhus, S. G. 82. *Sag.* 677.

Species sunt,

(*petechialis*)

I. Typhus <sup>^</sup>plerumque cum petechiis.

Variat gradu \*.

\* Morbos gradu solum differentes nominibus diversis insignire nequaquam convenit; cum autem  
nuperis

## 1. Typhus mitior.

Febris maligna hectica five lues *νευρανδης* convulsiva,  
*Willis* de morb. convulsiv. cap. 8. \*.

nuperis temporibus apud medicos usitatum sit, febrem quandam, quasi ab aliis quibuscvis differentem, nomine Febris *Nervosae* appellare; huic opinioni quodammodo morem gerens, sub titulo *Typhi mitioris*, variorum auctorum febres ad recentiorum nervosas aliquomodo referendas recensui. In hac re autem, cum limites neutiquam accurate ponendi sunt, me accuratum fuisse non dixerim.

Minus adhuc placuit, ad mentem vel veterum vel recentiorum inter febrium genera aliquod sub nomine Febris *Putridae* recensere. In omni *typho* humorum in putredinem proclivitatem adesse puto; sed vario tantum gradu adest, ita ut major minorve putredo speciem variare, nequaquam mutare, potest. Sufficiat sub titulo *Typhi gravioris* eas, quae praefertim putridae adpellatae sunt, febres indigitasse, uti ex apposis variorum auctorum appellationibus satis patebit.

\* Hoc est exemplum, ni fallor, primum appellationis *Νευρανδης*, vel nervosae, febribus quibuscvis datae; quam

Febris pestilens *Fracaſtor.* de morb. contag. L.

II. cap. 4.

Febris pestilens sine charactere veneni *Foreſt.* L.

VI. obſ. 26.

Febris hectica pestilens *Foreſt.* L. VI. obſ. 32.

Febris nova ann. 1685. *Sydenham.* Sched. monitor.

Febris putrida nervosa *Wintringh.* Comm. Noſolog. ad ann. 1720, 1721.

Febris lenta nervosa. *Huxham* on fevers, chap. 8.

Febris contagiosa. *Lind* on fevers and infection *paſſim.*

Typhus nervosus, S. sp. 2.

Typhus comatosus, S. sp. 3.

Tritaeophya typhodes *Mangeti*, S. sp. 11. *Raym.* *Fort.* de febribus, p. 24.

## 2. Typhus gravior.

Febris pestilens, *P. Sal. Diverſ.* de febre pestilenti.

quam protinus Angli, non tamen niſi nuper admodum aliarum regionum medici, uſurpati ſunt.

Febris pestilens Ægyptiorum *Alpin.* de med. Ægypt. L. I. cap. 14.

Typhus Ægyptiacus, S. sp. 6.

Febris pestilens maligna *Sennert.* de febribus, L. IV. cap. 10.

Febris maligna pestilens *River.* L. XVII. sect. III. cap. 1.

Febris pestilens maligna, ann. 1643. *Willis,* de febribus, cap. 14.

Typhus carcerum, S. sp. 1.

Febris nautica pestilentialis *Huxham* de aëre ad ann. 1740.

Miliaris nautica, S. sp. g.

Febris putrida contagiosa in carceribus genita, *Huxham* de aëre ad ann. 1742.

Miliaris purpurata, S. sp. h.

Febris carcerum et nosocomiorum. Ill. *Pringle,* Diseases of the army, p. 294. Ill. *Van Swieten,* Maladies des armées, p. 136.

Typhus castrensis, S. sp. 5.

Febris castrensis, quam vulgo cephalalgiam epidemicam vocant *Henr. Maii* et *A. Ph. Koph.* Dis. apud *Hallerum,* tom. V.

Febris Hungarica five castrensis *Juncker.* 74. et *plurium Auctorum* \*.

\* Morbum five febrem Hungaricam ad tertianas remittentes, cum SAUVAGESIO et Ill. PRINGLE, supra



Febris castrensis Gallorum in Bohemia, ann. 1742 *Scrinci*. Diff. apud *Haller*. tom. V.

Febris petechialis, *Sennert*. L. IV. cap. 13. *River*. prax. L. XVII. sect. III. cap. I. *Hoffm*. II. p. 84. *Juncker*. 73. *Huxham* on fevers, chap. 8. *Ludwig*. Infl. med. clin. No. 146. *Schreiber* von erkenntniss, und cur der Krankheiten. p. 126. *Monro*, Diseases of military hospitals, p. 1.

Febris catarrhalis maligna petechizans, *Juncker* 72. *Hoffm*. II. 75. *Eller* de cogn. et cur. morb. Sect. VI.

Exempla febrium petechialium sunt frequentia.

Febris quae lenticulas, puncticula, aut peticulas vocant, *Fracaſtorius* de morb. contag. L. II. cap. 6.

supra retuli; nec dubium est quin morbus Hungaricus dictus saepius sub forma remittentis apparuerit; sed simul constat febrem in castris Hungaricis primo ortam, et per milites inde redeuntes per totam fere Germaniam dispersam, ex genere continuarum fuisse, (*Vide Ruland. de morbo Hungarico, cap. VIII. quæst. 39.*), et plerumque eandem esse quam nunc in Nosocomiis quibuscvis saepe exorientem bene novimus. Ad hunc locum igitur etiam apponendam esse putavi.

Febris peticularis Tridenti, ann. 1591. *Roboretus*,  
de febr. peticul.

Febris petechialis epidemica Coloniae ann. 1672.  
*Donckers*, Idea febris petechialis.

Febris petechialis epidemica, Posonii 1683, *C. F.*  
*Loeu* in App. ad A. N. C. Vol. II.

Febris petechialis epidemica Mutinae, 1692.  
*Ramazzeni*. Const. Mutinensis, Oper. pag. 187.

Febris maligna petechizans, ann. 1698. *Hoffm.*  
II. p. 80.

Febris petechialis Wratislaviae, ann. 1699. *Hel-*  
*wich*, Ephem. Germ. D. III. A. VII. et VIII.  
obs. 132. p. 616.

Febris epidemia Lipsiae 1718. *M. Adolph. A.*  
N. C. III. Obs. 131. p. 296.

Febris endemica et epidemica Corcagiensis, ann.  
1708, 1718, et seq. *Rogers*, Essay on epidemic  
diseases.

Febris continua epidemica Corcagiensis ann. 1719.  
et seq. *M. o Connel* Observ. de morbis.

Febris petechialis epidemica, Cremonae 1734.  
*Valcharengki* Med. ration. Sect. III.

Febris petechizans Petropoli 1735, *Weitbrecht.*  
Diff. apud Haller. tom. V

Febris petechialis, ann. 1740, 1741, in Hassia,  
*Ritter*. A. N. C. vol. VII. obs. 4.

Febris maligna petechialis Rintelii 1741. *Furstenau*. A. N. C. Vol. VII. obs. 5.

Febris petechialis epidemica Silesiae 1741 et seq. *Brandhorst*. Diss. apud *Haller*. tom. V.

Febris petechialis epidemica Viennae 1757, *Häsenohrl*. Hist. med. cap. 2.

Febris petechialis epidemica Lipsiae 1757. *Ludvig*. Adversar. tom. I. pars 1.

Febris petechialis epidemica variis Germaniae locis ab ann. 1755 ad 1761. *Strack* de morbo cum petechiis.

(*icterodes*)

## II. Typhus cum flavedine cutis.

Typhus icterodes, S. sp. 7.

Febris flava Indiae Occidentalis *Warren*. Malignant Fever of Barbadoes. *Hillary's* Diseases of Barbadoes. *Linning* on the Yellow Fever of South Carolina. *Edinb.* Phys Litter. Essays, Vol. II. *Mackittrick* de febre flava Indiae Occidentalis, *Edinb.* 1766.

Typhi etiam species esse videtur

Ephemera sudatoria, S. sp. 7.

Ephemera Britannica, *Caius* de ephem. Brit.

## 78 GENERA MORBORUM

Sudor Anglicus, *Sennert.* L. IV. cap. 15.

Hydronofus, *Forest.* L. VI. obs. 8.

An eodem pertinet,

Miliaris sudatoria, S. sp. e.

Febris sudatoria, *Le Suetie Gallorum, Meyseray*  
*Meth. aisé, &c. Ejusd. Maladies des Armées*  
250. *Boyer* Methode a suivre dans les mala-  
dies epidemiques ?

De Typho hysterico verminoso, S. sp. 4.

Typho exhaustorum, S. sp. 8.

Typho a manipuera, S. sp. 9.

Nobis non liquet.

### G. VI. S Y N O C H U S \*.

Morbus contagiosus. Febris ex syno-  
cha et typho composita, initio syno-  
cha, progressu et versus finem ty-  
phus.

Synochus, S. G. 81. L. 13.

Lenta L. 14.

Phrenitis, V. 18.

Febris continua putrida, *Boerh.* 730.

\* Cum plures febres nec inflammatoriae nec  
nervosae ex omni parte sint, neque idcirco vel ad

Sy-

Varietates ex Sauvagesio sunt.

*Synochus sanguinea*, S. sp. 1.

Febris depuratoria, ann. 1661 ad 1664. *Sydenh.* de morb. acut.

*Synochus fudatoria*, S. sp. 2.

Febris continua epidemica, ann. 1665 ad 1667. *Sydenh.* ibid.

*Synochus foporosa*, S. sp. 12.

Febris continua epidemica, ann. 1673. *Sydenh.* ibid.

Febris continua putrida annor. variorum. *Wintringham* Com. nosologicum.

*Synochus ardens*, S. sp. 6.

*Synochus miliaris*, S. sp. 14.

*Synocha miliaris*, S. sp. 6.

*Synocham* vel ad *Typhum* facile referendae ; genus *Synochi*, cujus typus hisce regionibus frequens conspicitur, hic inserui. Inter *Typhum* tamen et *Synochum* limites accuratos ponere non possum ; et an revera pro diversis generibus habenda, vel positis diversis, utri eorum *Synonyma* auctorum referenda, sunt, dubito. Quae vero hic subjunguntur, a SAUVAGESIO species dictae, ad *Synochum* satis recte, ut mihi videtur, referri possunt.

## 80 GENERA MORBORUM

De synocho variolode, S. sp. 3. et  
Synocha dysenteriode, S. sp. 4.

Nobis non satis liquet, et minus adhuc de

Syncho anniverfaria, S. sp. 9.

Syncho fpermatice, S. sp. 10.

Syncho tarantata, S. sp. 11.

Complicata est

Synochus fcorbutica, S. sp. 13.

Et fymptomatica est

Synochus a fcabie, S. sp. 15.

## H E C T I C A.

Febris quotidie revertens ; acceffionibus  
meridianis et vefpertinis ; remiffione,  
rarius apyrexia, matutina ; plerumque  
fudoribus nocturnis, et urina fedimen-  
tum furfuraceo-lateritium deponente \*.

Hectica, S. G. 83. L. 24. V. 80. Sag. 684.

\* Cum febrium in numerum, hecticam receperint  
Nofologi omnes, eam etiam cum caractere hic  
apponendam duxi. Ejufmodi autem febrem, cum  
nun-

Ex Sauvagesio species sunt,

Hæctica chlorotica, S. sp. 3.

Hæctica syphilitica, S. sp. 4.

Hæctica scrophulosa, S. sp. 5.

Hæctica a calculis, S. sp. 6.

Hæctica hydropum, S. sp. 7.

Hæctica verminosa, S. sp. 9.

Hæctica cachectarum, S. sp. 10.

Hæctica fluxuum, S. sp. 11.

Hæctica infantilis, S. sp. 1. Characterē caret, et nobis vel rachitica, vel scrophulosa, vel verminosa videtur.

Hæctica vespertina, S. sp. 2. vix pro morbo haberi potest.

De hæctica lymphatica, *Baglivi* S. sp. 12. et

Hæctica nervea, *Cl. Lorry*, S. sp. 13.

Nobis non liquet.

nunquam nisi symptomaticam observaverim, in numerum idiopathicarum, quas solas enumerare licet, admittere nolui. In plerisque exemplis, hæcticam revera symptomaticam esse, ex SAUVAGESII speciebus, quas vocat, hic recensitis, satis manifestum fiet. Vide ipsius SAUVAGESII Scholium. Tom. I. pag. 319.



## O. II. PHLEGMASIÆ.

Febris synocha ; phlogosis ; vel dolor topicus, simul læsa partis internae functione ; sanguis missus, et jam concretus, superficiem coriaceam albam ostendens.

Phlegmasiae membranosae et parenchymatosae,  
S. Cl. III. O. I. II. *Sag.* 605. \*.

\* Haec phlegmasiarum in membranosas et parenchymatosas divisio prorsus inepta est ; primo enim, quod de statu partium internarum statuit, de quo in Nosologia statuere non licet ; dein, quod partes membranosae et parenchymatosae non satis certo distinguuntur ; et hinc Metritis, quam inter membranosas recenset SAUVAGESIUS, a LINNAEO et SAGARO inter parenchymatosas collocatur ; denique, quod phlegmasiae quaedam, ut hepatitis, vel membranosae vel parenchymatosae esse possunt.

Nec magis idonea est ordinis phlegmasiarum musculosarum apud LINNAEUM et SAGARUM institutio,

Morbi febriles phlogistici, L. Cl. III.

Febres continuæ compositæ inflammatoriae, V.

Morbi acuti febriles, *Boerb.* 770.

Febres inflammatoriae, *Hoffm.* II. 105. *Junck.* 61.

## G. VII. P H L O G O S I S \*.

Pyrexia, partis externæ rubor, calor, et  
tensio dolens.

Species sunt;

I. Phlogosis (*Phlegmone*) rubore vivido;  
tumore circumscripto, in fastigium  
plerumque elevato, sæpe in apostema  
abeunte; dolore sæpe pulsatili.

*Phlegmone Auctorum*, S. G. 15. L. 39. V. 351.

tutio, in qua neuter quidem satis accuratus est.  
Male enim phlegmone a LINNÆO musculosa dicitur,  
nec bene Cynanche plerumque membranosa, rarius  
musculosa, a SAGARO ad musculosas in universum  
refertur.

\* Pro nomine generis cujus species est Erythema,  
minus recte in priore editione usurpatum fuit phleg-  
mone. Novum nomen necessarium nobis videbatur,  
et nihil aptius quam Phlogosis suppetebat.

## 84 GENERA MORBORUM

Inflammatiō, L. 231. *Boerh.* 370. *Junck.* 20.

### 1. Variat forma.

Furunculus, S. G. 18. V. 352.

Terminthus, V. 381.

Papula, L. 275. S. p. 6.

Varus, V. 436. L. 269. S. p. 7.

Bacchia, L. 270.

Gutta rosea, S. G. 4.

Gutta rosacea, V. 437.

### 2. Variat sede \*.

Hordeolum, S. G. 27. L. 276. V. 434.

Otalgia, S. G. 197. L. 44. V. 148.

Dolor otalgicus, *Höfsm.* II. 336.

Parulis, V. 362.

Mastodynia, S. G. 210. V. 153.

Paronychia, S. G. 21. L. 258. V. 345.

Arthrocace, S. G. 78. L. 256.

Paedarthrocace, V. 419.

Spina ventosa, *Boerh.* 526.

Phimosis, S. G. 22. L. 297. V. 348.

Paraphimosis, V. 349.

\* An sequentes pro totidem speciebus recenseri possint, judicent peritiores.

Proctitis, L. 30.

Proctalgia, S. G. 214.

Clunefia, V. 167.

II. Phlogosis (*Erythema*) colore rubicundo, pressione evanescente; ambitu inaequali, serpente; tumore vix evidente, in cuticulae squamulas, in phlyctae-nas vel vesiculas abeunte; dolore urente.

Erythema, S. G. 11.

Erysipelas *Auctorum*, V. 343.

Hieropyr, V. 344.

I. Variat vehementia.

Anthrax, S. G. 19. L. 272. V. 353.

Carbo et carbunculus *Auctorum*.

Erythema gangraenosum, S. sp. 7.

2. Variat causa remota.

Erythema a frigore.

Erythema pernio, S. sp. 4.

Pernio, L. 259. V. 350.

Erythema ambustio, S. sp. 2.

Erysipelas ambustio, S. sp. 4.

Combustura, L. 245.

Combustio, *Boerh.* 476.

Encaufis, V. 347.

Erythema ab acri alieno applicato;

Erysipelas Chinense, S. sp. 7.

Erythema ab acri inquilino,

Erythema intertrigo, S. sp. 5.

Intertrigo, L. 247. V. 502.

Erythema a compressione,

Erythema paratrima, S. sp. 6.

Erythema a punctura, S. sp. 9.

Erysipelas a vespis, S. sp. 19.

Psydracia a vespis, S. sp. 2.

### 3. Variat complicata:

Erythema cum phlegmone,

Erysipelas phlegmonodes *Auctorum*:

Erythema cum oedemate,

Erysipelas symptomaticum, S. sp. 6.

Phlogosis sequelae sunt,

## A P O S T E M A.

Post phlogosin, remittentibus dolore et

pulsatione, tumor albescens, mollis, fluctuans, pruriens.

Apoſtēma, S. G. 39. *Sag.* 55.

Abſceſſus, L. 132. V. 354. *Boerh.* 387. 402.

Puſtula, L. 274.

## G A N G R Æ N A.

Post phlogosin, pars livens, mollis, parum sensibilis, saepe cum vesiculis ichorosis.

Gangraena, S. G. 314. L. 233. V. 327. *Sag.* 203. *Boerh.* 388. 419.

## S P H A C E L U S.

Post gangraenam pars nigricans, flaccida, facile lacerabilis, sine sensu vel calore, et cum foetore carnis putridae; vitio celeriter serpente.

Sphacelus, L. 234. V. 328. *Boerh.* 419. 457.

## 88 GENERA MORBORUM

### G. VIII. O P H T H A L M I A.

Rubor et dolor oculi ; lucis intolerantia  
plerumque cum lachrymatione.

Ophthalmia, S. G. 196. L. 43. V. 341. *Sag.* 2311  
*Junc.* 24.

Chemosis, V. 46.

Ophthalmites, V. 47.

Inflammati oculorum, *Hoffm.* II. 165.

Ophthalmiae species et varietates sunt,

#### I. Idiopathicae.

1. Ophthalmia (*membranarum*) in tunica  
adnata, et ei subjacentibus membranis  
five tunicis oculi.

#### A. Variat gradu phlogosis externae.

Ophthalmia Taraxis, S. sp. 1.

Ophthalmia humida, S. sp. 8.

Ophthalmia chemosis, S. sp. 12.

Ophthalmia Erysipelatosa, S. sp. 7.

Ophthalmia pustulosa, S. sp. 6.

Ophthalmia phlyctenodes, S. sp. 21.



## B. Variat affectis tunicis internis.

Ophthalmia choroideae, S. sp. 13.

Ophthalmia tenebricosa, S. sp. 10.

2. Ophthalmia (*Tarfi*) cum tumore, erosione, et exudatione glutinosa tarfi palpebrarum.

Ophthalmia trachoma, S. sp. 4.

Ophthalmia sicca, S. sp. 5.

## II. Symptomaticae.

## 1. A morbo ipsius oculi.

Ophthalmia angularis, S. sp. 14.

Ophthalmia tuberculosa, S. sp. 3.

Ophthalmia trichiasis, S. sp. 2.

Ophthalmia cancrofa, S. sp. 15.

Ophthalmia a synechia, S. sp. 16.

Ophthalmia a lagophthalmo, S. sp. 17.

Ophthalmia ab elcomate, S. sp. 18.

Ophthalmia ab ungue, S. sp. 19.

Ophthalmia a corneae fistula, S. sp. 20.

Ophthalmia uveae, S. sp. 22.

## 2. A morbis aliarum partium vel totius corporis.

Ophthalmia metastatica, S. sp. 24.

Ophthalmia scrophulosa, S. sp. 9.

Ophthalmia syphilitica, S. sp. 11.

Ophthalmia febricosa, S. sp. 23.

## G. IX. P H R E N I T I S.

Pyrexia vehemens ; dolor capitis ; rubor faciei et oculorum ; lucis et soni intolerantia ; pervigilium ; delirium ferox vel typhomania.

Phrenitis, S. C. 101. L. 25. *Sag. G. 301. Boerb.*  
771. *Hoffm. II. 131. Junck. 63.*

Phrenismus, V. 45.

Cephalitis, S. G. 109. *Sag. G. 310. \**

\* Cum symptomata nulla dentur quae semper phlegmasiam cerebri a phlegmasia membranarum ejus, sive meningum, certo distinguere possint ; neque sectiones cadaverum distinctiones a SAUVAGESIO, LINNAEO, et SAGARO, adhibitas confirment ;

*Cepha-*

Sphacelismus, L. 32.

Siriasis, V. 34.

Phrenitidis idiopathicae speciem unicam hic ponere licet, et cujus synonyma sequentia esse putamus.

Phrenitis vera, S. sp. 1. *Boerb.* 771.

Phrenitis idiopathica, *Junk.* 63.

Cephalalgia inflammatoria, S. sp. 9.

Cephalitis spontanea, S. sp. 3.

Cephalitis siriasis, S. sp. 4.

Siriasis, V. 34.

Cephalitis Littriana, S. sp. 5.

## II. Phrenitides Symptomaticae sunt,

Phrenitis synochi pleuriticae, S. sp. 2.

Phrenitis synochi fanguineae, S. sp. 4.

*Cephalitidem*, S. G. 109. *Sag.* G. 310. et *Sphacelismum*, L. 32. pro generibus a *phrenitide* diversis admittere nolui, et ea hic ideo, uti synonyma, sub titulo Phrenitidis, posui.

Recte monet VOGELIUS signa phrenitidis, vel ut vocat phrenismi, hoc est, inflammationis cerebri aut membranarum ejus, admodum ambigua esse.

## 92 GENERA MORBORUM

Phrenitis calentura, S. sp. 11.

Phrenitis Indica, sp. 12.

Cephalitis Ægyptiaca, S. sp. 1.

Cephalitis epidemica, ann. 1510, S. sp. 6.

Cephalitis verminosa, S. sp. 7.

Cephalitis cerebelli, S. sp. 8.

Phrenitis miliaris, S. sp. 3.

Phrenitis variolosa, S. sp. 5.

Phrenitis morbillosa, S. sp. 6.

Phrenitis a plica, S. sp. 8.

Phrenitis aphrodisiaca, S. sp. 9.

Phrenitis a tarantismo, S. sp. 14.

Phrenitis hydrophobica, S. sp. 15.

Phrenitis a dolore, S. sp. 13.

Cephalitis traumatica, S. sp. 2.

## G. X. CYNANCHÆ.

Pyrexia aliquando typhodes ; rubor et dolor faucium ; deglutitio et spiratio difficiles, cum angustiae in faucibus sensu.

Cynanche, S. G. 110. L. 33. Sag. G. 300.

Angina, V. 49. *Hoffm.* II. 125. *Junck.* 30.

Angina inflammatoria, *Boerb.* 798.

Species sunt,

I. Cynanche (*tonfillaris*) membranam faucium mucosam, et praecipue tonsillas, tumore et rubore afficiens, cum febre synocha.

Cynanche tonsillaris, S. sp. 1.

Anginae inflammatoriae, sp. 5. *Boerb.* 805.

II. Cynanche (*maligna*) tonsillas et membranam faucium mucosam afficiens tumore, rubore, et crustis mucosis coloris albescentis vel cineritii, serpentibus, et ulcera tegentibus; cum febre typhode et exanthematis.

Cynanche maligna, S. sp. 3.

Cynanche ulcerosa, S. Var. a. *Journ. de Med.* 1758.

Cynanche gangraenosa, S. Var. b. *Journ. de med.* 1756.

Ulcera faucium et gutturis anginosa et lethalia.

Hispanis *Garrotillo*, *Lud. Mercat.* consult. 24.

Angina ulcerosa, Cl. *Fothergill*, Account of the ulcerous sore throat Edit. 1751, *Huxham* on the malignant ulcerous sore throat, from 1751 to 1753.

Febris epidemica cum angina ulcusculosa, *Douglas* Practical history, Boston 1736.

Angina epidemica, *Russel* Oecon. natur. p. 105.

Angina gangraenosa, *Withering's* Diff. Inaug. Ed. 2. dinb. 1766.

Angina suffocativa, *Bard's* Inquiry, New-York 1771.

Angina maligna, *Johnstone* on the malignant angina, &c. Worcester 1779.

III. Cynanche (*trachealis*) respiratio  
one difficili, inspiratione strepitosa  
voce rauca, tussi clangosa, tumor  
fere nullo in faucibus apparente  
deglutitione parum difficili, et fe  
bre synocha.

Cynanche trachealis, S. sp. 5.

Cynanche laryngea *Auctorum*, *Eller*. de cogn. et curand. morb. sect. 7.

Anginae inflammatoriae, sp. 1. *Boerb.* 801.

Angina latens et difficilis, *Dodon.* obs. 18.

Angina interna, *Tulp.* L. 1. obs. 51.

Angina perniciosa, *Greg. Horst. Observ. L. III.*  
 obs. 1.

N. An haec Sauvagesii synonyma et frequentia ad eundem morbum pertinent, videant experti ; sequentia autem ad morbum characteris dati manifesto pertinere videntur.

Suffocatio stridula, *Scotis the CROUP. Cl. Home*  
 on the Croup.

Asthma infantum, *Millar* on the asthma and  
 chincough.

Asthma infantum spasmodicum, *Russb, Disserta-*  
 tion, London 1770.

Cynanche stridula, *Crauford, Diss. Inaug. Edinb.*  
 1771.

Angina epidemica, ann. 1743. *Molloy* apud *Rut-*  
*ty's* history of the weather.

Morbus strangulatorius, *Starr, Phil. Transf. No.*  
 495.\*.

\* An hic morbus ad cynanchen malignam, an ad  
 trachealem pertinet, mihi non certo constat, et fac-  
 pius de eorundem morborum apud plures auctores  
 descriptionibus itidem incertus sum.



Morbus truculentus infantum, *Francof.* ad Viadrum et in vicinia grassans, ann. 1758. C.

Bergen. A. nova. N. C. tom. II. p. 157.

Angina inflammatoria infantum, *Russel*, *Oeconom.* nat. p. 70.

Catarrhus suffocativus Barbadosis, ann. 1758.

*Hilary's Barbadoes*, p. 134.

Angina polyposa, five membranacea *Michaelis*

Argentorati 1778, et *Auctores* ab ingenioso et erudito *Michaele* allegati.

(*pharyngea*)

IV. Cynanche <sup>^</sup>cum rubore in imis praefertim faucibus ; deglutitione maxime difficili, dolentissima ; respiratione satis commoda, et febris synocha.

Cynanche pharyngea, S. sp. 6. *Eller* de cogn. et cur. sect. 7.

Anginae inflammatoriae, sp. 4ta, *Boerh.* 804.

(*parotidea*)

V. Cynanche <sup>^</sup>cum tumore externo parotidum et maxillarum glandularum magno ; respiratione et deglutitione parum laesis ; febre synocha plerumque leni.

Cynanche parotidæa, S. sp. 14. Gallis OREILLONS et OURLES, *Tiffot* Avis au peuple, No. 116. *Encyclopedie*, au mot OREILLONS.

Angina externa, ANGLIS the MUMPS, *Ruffel*, Oecon. natur. p. 114. SCOTIS, the BRANKS.

Catarrhus Bellinfulanus, S. sp. 4.

Offervazioni di *Girol. Gaspari*, Venez. 1731.

Offervazioni di Targ. Tozzetti, Racolta 1ma, p. 176.

Cynanche purpuro-parotidæa, S. sp. 15.  
vel ad malignam, S. sp. 3. vel ad Scarlatinam pertinere videtur.

Cynanchæ symptomatice sunt,

a. A causis internis.

Cynanche epidemica, S. sp. 2.

Amphimerina anginosa, S. sp. 12.

Febris anginosa, *Huxham* de aëre.

Cynanche prunella, S. sp. 12.

Cynanche exanthematica, S. sp. 4.

Cynanche arthritica, S. sp. 10.

Cynanche hepatica, S. sp. 8.

Cynanche a dysenteria, S. sp. 13.

## b. A causis externis.

Cynanche a deglutitis, S. sp. 9.

Cynanche mercurialis, S. sp. 11.

Cynanche thymica, S. sp. 7. raro inflammatoria est, et vix hujus loci.

## G. XI. P N E U M O N I A \*.

Pyrexia ; dolor in quadam thoracis parte  
respiratio difficilis ; tussis.

Febris pneumonica, Hoffm. II. 136.

\* Ab omni aevo, in hunc fere diem, scriptores medici, et eos secuti Nosologi omnes, phlegmasiarum pectoris interni duo esse genera, peripneumoniam scilicet et pleuritidem, statuerunt. Recentiores autem ex sectione cadaverum didicerunt, veteres de sede, ideoque de differentia horum morborum saepe falso statuisse, et quem in pleura costali sedem habere veteres putabant, saepius in pleura pulmonem investiente situm fuisse invenerunt anatomici recentiores. Novimus, porro, quod, si quidem morbi illi diversam aliquando sedem habuerint, iocamen per symptomata vix certo cognosci posse ; et utcunque sit, morbos illos quatenus, quovis modo distinctos, revera maxime esse affines, plerumque simul conjunctos, et eosdem distinxisse ad usus medicinas

Species sunt,

I. Pneumonia (*peripneumonia*) pulsu non semper duro, aliquando molli; dolore thoracis obtuso; respiratione perpetuo difficili, saepe non nisi trunco corporis erecto exercenda; faciei tumidae colore purpureo; tussi plerumque humida, saepe cruenta.

cinae parum omnino contulisse. Hisce igitur perpen-  
sionis, phlegmasias pectoris interni non nisi genus  
unicum constituere, cum HOFFMANNO expertissi-  
mo putamus; quamobrem hujusmodi genus hic  
sub nomine Pneumoniae posuimus. Symptomata,  
quae pro characteristicis adhibuimus, cum quae in  
omni phlegmasia pectoris interni semper adsint, et  
in qualibet praecipua sint, ea recte characterem  
genericum constituere videntur.

An species diversae vere statuendae sint, anceps  
haereo. Sed, opinionibus et consuetudini medicorum  
aliquid concedere volens, peripneumoniae et pleuri-  
tidis quatenus, vel ex opinione medicorum vel ex pro-  
pria observatione, eas distinguere liceat, characteres  
specificas dedi. Interim tamen observari velim, in-  
ter illos morbos, utcumque aliquando distinctos, li-  
mites accuratos plerumque non ponendos esse.

## 100 GENERA MORBORUM

Peripneumonia, S. G. 112. L. 34. V. 51. *Sag.*  
G. 311. *Boerh.* 820. *Juncker*, 67.

### I. Peripneumoniae idiopathicae simplices,

Peripneumonia pura five vera *Auflorum*, S. sp. 1.

Peripneumonia gastrica, S. sp. 11. *Morgagn.*  
de caus. et sed. Epist. XX. art. 30. 31. \*.

Variat gradu.

Peripneumonia catarrhalis, S. sp. 6.

Peripneumonia notha †, *Sydenh.* sect. 6. cap.  
4. *Boerh.* 867. *Morgagni* de caus. et sed.  
Epist. XXI. 11.—15.

\* Ad peripneumoniam, an ad pleuritidem, potius  
pertinet haec varietas, mihi non certo constat.

† Peripneumoniam *notham* a *vera* gradu tantum  
differre opinor; ideoque uti varietas hic apposui. In  
eo quidem differre puto, quod in peripneumonia  
*notha* inflammatio sit lenior, et affluxus humorum in  
pulmones copiosior, quam in *vera*. Cum autem in  
*notha* symptomata pyrexiae, doloris, dyspnoeae, et  
tussis, vario gradu et varia ratione conjuncta, adesse  
possint, minime mirandum si hujus morbi apud di-  
versos auctores descriptiones parum unitormes sint,  
et necne morbus sub titulo peripneumoniae nothae.

2. Peripneumoniae idiopathicae complicatae febre \*.

Peripneumonia putrida, S. sp. 2. †.

Peripneumonia ardens, S. sp. 3.

Peripneumonia maligna, S. sp. 4.

a diversis auctoribus descriptus idem revera sit, dubia quaedam moverit doctissimus MORGAGNI. Perpen-  
sionis tamen omnibus de hac re dictis, et cum observa-  
tionibus pluribus apud ipsos aegros factis collatis, nihil dubito quin morbus a SYDENHAMO et BOERHAA-  
VIO, sub titulo *peripneumoniae nothae* descriptus, u-  
nus idemque sit, nec ab eo morbum a VALSALVA in  
FRANCISCO CORALLIO, vel morbum in celebri  
ANTONIO VALISNERIO, ab ipso MORGAGNI ob-  
servatum, re ipsa diversum fuisse puto.

\* Cum morbi diversi simul complicati sint, saepe,  
quis illorum pro morbo primario habendus sit dubi-  
tari potest; nec in hac re me ubique recte judica-  
tum iri spondeo. In quibusdam mei ipsius judicio  
usus sum; in plerisque vero SAUVAGESIUM secutus  
sum. Sufficere plerumque ratus ob oculos studio-  
rum complicationes istas quomodocunque ponere.

† SAUVAGESIUM, ut soleo, secutus, hanc et tres  
sequentes species quasi diversas recensui, cum tamen  
pro una eademque habere vellem.



Peripneumonia typhodes, S. sp. 5.

Amphimerina peripneumonica, S. sp. 15.

### 3. Peripneumoniae symptomaticae.

Peripneumonia arthritica, S. sp. 7.

Peripneumonia exanthematica, S. sp. 9.

Peripneumonia phthisicorum, S. sp. 8.

Peripneumonia hydrophobica, S. sp. 10.

Peripneumonia rachialgica, S. sp. 12.

II. Pneumonia (*pleuritis*) pulsu duro ; dolore, plerumque lateris, pungente, sub inspiratione praesertim aucto ; decubitu in latus molesto ; tussi dolentissima, initio sicca, postea humida, saepe cruenta.

Pleuritis, S. G. 103. L. 27. V. 50. Sag. G. 303.  
*Boerh.* 875. *Junck.* 67.

Paraphrenesis, S. G. 102. L. 26. \*.

\* In morbo qui vulgo *paraphrenesis* vel *paraphrenitis*, et rectius a SAGARO *diaphragmitis*, appellatur, pleurae super diaphragma extensae inflammationem adesse, et in ea morbum consistere agnoscunt



Paraphrenitis, V. 55. *Boerh.* 907.

Diaphragmitis, *Sag.* G. 304.

## I. Pleuritides idiopathicae simplices.

Pleuritis vera, S. sp. 1. *Boerh.* 875. *Verna*  
 princeps morb. acut. pleuritis, L. 1. cap. 2. 3.  
*Zeviani* della parapleuritide, cap. 3. *Morgag.*  
 de sed. et caus. morb. Ep. XX, art. 56. XXI.  
 45. *Wendt.* de pleuritide, apud *Sandifort.* Thes.  
 II.

Pleuritis pulmonis, S. sp. 2. *Zevian.* dell. para-  
 pleur. III. 28. &c.

Pleuripneumonia, pleuro-peripneumonia, perip-  
 pneumo-pleuritis *Auctorum.* *Baronius* de pleuri-  
 pneumonia.

agnoscunt medici omnes; non recte igitur uti ge-  
 nus a pneumonia diversum recensuerunt Nosologi.

Nec quidem pro diversa a pleuritide specie recen-  
 feri potest; cum plerumque nulla alia praeter illa  
 pleuritidis symptomata ostendit. Quae a plurimis  
 huic morbo tributa sunt, risus nempe sardonicus,  
 et delirium phreniticum, certe non semper adsunt.  
 Primum, quod nunquam vidi, certe rarissimum est;  
 et posterius, alias etiam pneumoniae species saepe co-  
 mitatur, nec tantum a parte pleurae inflammata,  
 quantum a gradu pyrexiae, vel diathesis phlogisti-  
 cae, pendere videtur.

Ill. *Halleri* opuscul. patholog. obs. 13. *Morgagn.* de sed. et caus. Epist. XX. et XXI. passim. *Cleghorn* Minorca, p. 247. *Triller* de pleuritide, aph. 1. 2. 3. cap. I. 8. *Huxham* Diff. on pleurifies, &c. chap. I. Ill. *Pringle* Dif. of of the army, p. 147.

Pleuritis convulsiva, S. sp. 13. *Bianch.* Hist. hep. vol. 1. p. 234.

Pleuritis hydrothoracica, S. sp. 15. *Morgagn.* de caus. et sed. XX. 34.

Pleuritis dorsalis, S. sp. 3. *Verna*, P. III. cap. 8.

Pleuritis mediastini, S. sp. 4. P. *Sal.* Div. de affect. part. cap. 6. *Friend*, Hist. Med. de Avenzoare.

Mediastina, V. 52.

Pleuritis pericardii, S. sp. 5. *Verna*, P. III. cap. 9.

Parapleuritis *Zeviani* della parapleuritide:

Pleurodyne, parapleuritis, S. sp. 19.

Paraphrenesis diaphragmatica, S. sp. 1. *De Haen*, Rat. med. I. 7. III. pag. 31.

Paraphrenesis pleuritica, S. sp. 2.

Paraphrenesis hepatica, S. sp. 3.

De inflammatione mediastini, pericardii, et diaphragmatis Vide *Morgagn.* de caus. et sed. VIII. 13. XXI. 35. 36. 46. XLV. 16. *Van Swieten* ad *Boerb.* 913.

## II. Pleuritides complicatae.

## 1. Febre.

Pleuritis biliosa, S. sp. 7.

Pleuritis erysipelatoſa, S. sp. 11.

Pleuritis biliosa, *Bianch.* Hiſt. hep. vol. I. p.  
236.

Pleuritis putrida, S. sp. 9.

Synochus pleuritica, S. sp. 5.

Pleuritis peſtilens, S. sp. 16.

Pleuritis miliaris, S. sp. 20.

## 2. Catarrho.

Pleuritis catarrhalis, S. sp. 10.

Pleuritis lymphatica, *Bianch.* Hiſt. hep. I. p.  
233.

## III. Pleuritides ſymptomaticae.

Pleuritis traumatica, S. sp. 6.

Pleuritis verminosa, S. sp. 8. *Verna* pleur. p. I.  
cap. 1. P. III. cap. 11. *Morgagn.* de ſed. et  
cauſ. XXI. 43. 44.

Pleuritis ſtomachalis, *Bianch.* Hiſt. hep. I. p.  
232.

Pleurodyne verminosa, S. sp. 2.

Pleuritis lactea, S. sp. 17.

Pleuritis Polonica, S. sp. 18.

#### IV. Pleuritides falsae.

Pleuritis hepatica, S. sp. 12. *Panarol.* Pentac. I.  
obf. 37.

Pleuritis splenica, S. sp. 19.

Pneumoniae sequelae sunt.

#### V O M I C A.

Post pneumoniam, resolutione quadam non terminatam, dyspnoea et tussis persistentes, cum decubitu in latus sanum difficili, et febre hectica.

Vomica *Boerb.* 835. *Junch.* 35. \*

Pleurodyne vomica, S. sp. 21.

\* Vomicam vocamus quam vomicam clausam appellant medici, et inde character noster. Characteres autem vomicae apud LINNAEUM et VOGELIUM vomicam apertam tantum respiciunt; ideoque ad illos auctores hic non referimus.

## E M P Y E M A.

Post pneumoniam suppuratione terminatam, saepe post vomicam, remissio doloris, dum perstant dyspnoea, tussis, decubitus difficilis, et febris hectica, saepe cum sensu liquoris in pectore fluctuantis, et signis hydrothoracis.

Varietates ex SAUVAGESIO, licet non semper distinguendas, hic subjungimus.

Empyema a peripneumonia, S. sp. 1.

Empyema a vomica, S. sp. 2.

Empyema pleurae, S. sp. 3.

Empyema mediastini, S. sp. 4.

Empyema diaphragmatis, S. sp. 5.

Empyema intercostale, S. sp. 6.

## G. XIII. C A R D I T I S \*.

Pyrexia; dolor in regione cordis; anxietas;

\* Recte omnino dixit VOGELIUS, *Carditidis symptomata fere eadem esse ut in peripneumonia, sed graviora*, et ita etiam sensisse videtur LINNAEUS,  
cum

spiritus difficilis; tussis; pulsus inaequalis; palpitatio; syncope.

Carditis, S. G. III. V. 54.

Pericarditis, V. 53.

## I. Idiopathica.

Carditis spontanea, S. sp. 1. *Senac.* Traité de coeur. L. IV. chap. 7. *Meckel*, Mem. de Berlin, 1756.

Erysipelas pulmonis, *Lomm.* Observ. Lib. II.

## II. Symptomática.

Carditis traumatica, S. sp. 2. *Senac.* ibid. chap. 6.

## G. XIV. PERITONITIS.

Pyrexia; dolor abdominis, corpore erecto auctus; absque propriis aliarum phlegmasiarum abdominalium signis.

cum apud illum neque *Carditis*, neque *Pericarditis*, inter morbos phlogisticos <sup>invenient</sup> ~~reperiatur~~. Certe novimus, pericardium saepe inflammatum fuisse sine alijs praeter peripneumoniae signis.

Si signa darentur quibus dignosci queant  
sequentes, pro speciebus peritonitidis  
recenseri possent.

(*propria*)

I. Peritonitis in peritonæo strictius dicto,  
sive in peritonæo, abdomen intus suc-  
cingente.

Peritonitis, V. 62. *Lieutaud.* Hist. anat. med.  
L. 1. obs. 3. *Raygerus* apud eund. L. 1. obs.  
341. *Morgagn.* de sed. LVII. 20.

(*omentalis*)

II. Peritonitis in peritonæo, per omentum  
extenso.

Epiploitis, S. G. 106. *Sag.* G. 308. \*

Omentitis, V. 61.

Omenti inflammatio, *Boerh.* 958. et Ill. *Van Swie.*  
*ten Comm. Stork* Ann. med. I. 132. *Hulme* on  
the puerperal fever.

\* Tum Epiploitis, tum Mesenteritis, ut Peritoni-  
dis species hic recensetur, non quam quod ejusdem  
continuae membranae sint affectiones, quam quod  
nulla fere signa dari possunt, quibus a peritonitide,  
strictius dicta, dignosci queant.



(*mesenterica*)

III. Peritonitis in peritonaeo, per mesenterium extenso.

Mesenteritis, V. 60.

Enteritis mesenterica, S. sp. 4.

## G. XV. GASTRITIS.

Pyrexia typhodes; anxietas; in epigastrio ardor et dolor, ingestis quibuscumque auctus; vomendi cupiditas, et ingesta protinus rejecta; singultus.

Gastritis, S. G. 104. L. 28. V. 56. Sag. G. 306.

Ventriculi inflammatio, Boerh. 951.

Febris stomachica inflammatoria, Hoffm. II. 120.

### I. Idiopathicae.

#### 1. A causis internis.

A. Gastritis (*phlegmonodea*) dolore acuto pyrexia vehementi\*.

\* Tum gastritis, tum enteritis duarum esse specierum, quarum una phlegmonodea, altera erysipelas tosa.

Gastritis legitima, S. sp. 1. *Eller*, de cogn. et cur. morb. Sect. XI. *Haller*, obs. 14. hist. 3. *Lieut.*

Hist. anat. med. L. 1. 74.

Gastritis erysipelatoſa, S. sp. 4. \*.

Cardialgia inflammatoria, S. sp. 13. *Tralles* de opio, ſect. II. p. 231.

## A cauſis externis.

Gastritis a veneno, S. sp. 3.

Gastritis (*eryſipelatoſa*) dolore, et pyrexia lenioribus, rubore eryſipelatoſo in faucibus apparente.

ſa dici poteſt, mihi ex pluribus obſervationibus ſa-  
certo conſtat; et ejuſmodi ſpecies itaque hic re-  
enſui, etſi fatendum ſit, gaſtritidis eryſipelatoſae, et  
magis adhuc enteritidis eryſipelatoſae, ſigna ſaepe  
ſcura et incerta eſſe. De his vero monere volui  
diligentius inquirant poſteri.

\* Quam hic gaſtritidem eryſipelatoſam dixit  
AUVAGESIUS, omnino phlegmonodeam eſſe mihi  
detur.

II. Symptomaticae.

Gastritis exanthematica, S. sp. 5.

Gastritis herniosa, S. sp. 7.

De gastritide sternocostali, S. sp. 6. non liquet.

G. XVI. ENTERITIS.

Pyrexia typhodes ; dolor abdominis pun-  
gens, tendens, circa umbilicum tor-  
quens ; vomitus ; alvus pertinaciter ad-  
stricta.

Enteritis, S. G. 105. L. 29. V. 57. *Sag. G.*  
307.

Intestinatorum inflammatio, *Boerb.* 959.

Febris intestinatorum inflammatoria ex mesenterio.

*Hoffm.* II. 170.

I. Idiopathicae.

Species sunt,

1. Enteritis (*phlegmonodaca*) dolore acuto  
pyrexia vehementi, vomitu et alvo a-  
stricta.

Enteritis iliaca, S. sp. 1.

Enteritis colica, S. sp. 2. *Boerb.* 963.

2. Enteritis (*erysipelatoſa*) dolore et pyrexia lenioribus, ſine vomitu, et cum diarrhoea.

### Species ſymptomaticae.

Enteritis flatulenta, S. sp. 3.

Enteritis enterocelica, S. sp. 5.

## G. XVII. H E P A T I T I S.

Pyrexia; hypochondrii dextri tenſio et dolor, ſaepe pungens pleuritici inſtar, ſaepe obtuſus; dolor ad claviculam et ſummum humeri dextri; decubitus in ſiniſtrum latus difficilis; dyſpnoea; tuſſis ſicca; vomitus; ſingultus \*.

Hepatitis, S. G. 113. L. 35. V. 58. *Sag.* G. 312.  
*Boerb.* 914. *Hoffm.* II. 14. *Junck.* 66.

\* Inter ſymptomata hepatitis, *colorem faciei flavoſcentem*, poſuit tum SAUVAGESIUS, tum SAGARUS,

*Sauvagesii* species sunt,

Hepatitis erysipelatoſa, S. ſp. 1. \*.

Hepatitis pleuritica, S. ſp. 2. *Bianch. Hiſt. hep.*  
tom. I. p. 388.

Pleuritis hepatica, S. ſp. 12.

Hepatitis cyslica, S. ſp. 4. †.

GARUS, et hic etiam addit, *urinas icteritias, bilioſas, et ſerum ſanguinis miſſi et cruſta ſubſlava*; ſed haec ſymptomata bilis regurgitantis vel reſorptae rectius a LINNAEO et VOGELIO omiſſa fuiſſe cenſeo; nam ejuſmodi ſymptomata non tantum non perpetua, ſed etiam rariffima ſunt.

\* De erythemate vel eryſipelate, quod vocant, viſcerum, minus recte ſenſiſſe medicos cenſeo; nam, me ſaltem iudice, erythema non niſi ſuperficies illas internas quas tegit epithelion et tunica villoſa, epidermidi externae continua et analoga, afficere poſſe teſt. Nullum igitur eryſipelas pulmonis, de quo ſcripſit LOMMIUS, *Obſerv. lib. 2.* agnoſco; nec hepatitis quendam a SAUVAGEſIO hic eryſipelatoſam recte dictam eſſe puto, et hepatitis quidem ex AMATO hic deſcriptam revera phlegmonodeam fuiſſe credo.

† Quin ex contuſione vel aliis cauſis oriri poſſe inflammatio cyslidis felleae, vel ductus choledochi nullu

Hepatitis obscura, S. sp. 5. \*.

Pro specie male recensetur morbus secundarius.

Hepatitis suppurans, S. sp. 6.

Hepatalgia apostematosa, S. sp. 7.

## G. XVIII. S P L E N I T I S.

Pyrexia; hypochondrii sinistri tensio, calor,

nullus dubito; sed quibus signis cognosci queat, nisi in uno casu, non novi. In ictero, scilicet, cum dolore in regione epigastrica acuto, a calculo, ut videtur, in ductu choledochi haerente, inflammationem ductus cystici saepe ortam fuisse, omnino censendum, et ne oriatur semper cavendum.

\* Hepatitis per characterem datum evidens et saepe acuta est; sed alias obscura et chronica; nam, in sectione cadaverum, saepe reperitur apostema hepatis, quando nulla fere, saltem obscura tantum, inflammationis symptomata praecesserint. Recte igitur hepatidem obscuram indicavit SAUVAGESIUS, et omnino optandum est, ut diligentius inquirant medici, quomodo hujusmodi morbus dignosci queat.

tumor, et dolor pressu auctus ; absque signis nephritidis.

Splenitis, S. G. 114. L. 36. V. 59. *Junck.* 67.  
*Sag.* G. 313.

Lienis inflammatio, *Boerb.* 958. et ill. *Van Swieten.* Comm.

Una tantum species recensetur.

Splenitis phlegmonodea, S. sp. 1. *Forest,* L. XX.  
Obs. 5. 6. *De Haen,* apud *Van Swieten,* p.  
958.

Pleuritis splenica, S. sp. 19.

Splenalgia suppuratoria, S. sp. 3.

## G. XIX. NEPHRITIS.

Pyrexia ; dolor in regione renis, saepe ureteris iter sequens ; mictio frequens urinae, vel tenuis decoloris, vel ruberrimae ; vomitus ; cruris stupor ; testiculi ejusdem lateris retractio aut dolor.

Nephritis, S. G. 115. L. 37. V. 65. *Sag.* G.  
314.



## Species

## I. Idiopathica. Spontanea.

Nephritis vera, *S.* sp. 1.

## II. Symptomaticae.

Nephritis calculosa, *S.* sp. 2.

Nephralgia calculosa, *S.* sp. 1.

Nephralgia arenosa, *S.* sp. 2.

Nephralgia purulenta, *S.* sp. 7.

Nephralgia arthritica, *S.* sp. 3.

## G. XX. CYSTITIS.

Pyrexia ; hypogastrii tumor et dolor ; mictio frequens dolorifica, vel ischuria ; tenesmus.

Cystitis, *S.* G. 108. L. 31. V. 66. *Sag.* G. 309.

Inflammatio vesicae, *Hoffm.* II. 157.

Species sunt,

## I. A causis internis.

Cystitis spontanea, *S.* sp. 1.

## II. A causis externis.

Cystitis a cantharidibus, S. sp. 2.

Cystitis traumatica, S. sp. 3.

## G. XXI. H Y S T E R I T I S.

Pyrexia; hypogastrii calor, tensio, tumor;  
et dolor; os uteri tactu dolens; vomitus.

Hysteritis, L. 38. V. 63.

Metritis, S. G. 107, *Sag.* G. 315.

Inflammatiō et febris uterina, *Hoffm.* II. 156.

Species sunt,

Metritis puerperarum, S. sp. 1.

Metritis typhodes, S. sp. 2.

Metritis lactea, S. sp. 3.

## G. XXII. R H E U M A T I S M U S.

Morbus ab externa, et plerumque evidenter  
causa; pyrexia; dolor circa articulos  
musculorum tractum sequens, genua  
et reliquos majores, potius quam p

dum vel manuum articulos, infestans,  
calore externo auctus.

Rheumatismus, S. G. 185. L. 62. V. 138 *Boerh.*  
1490. *Junck.* 19.

Dolores rheumatici et arthritici, *Hoffm.* II. 317

Myositis, *Sag.* G. 301.

Lumbago S. G. 212. *Sag.* G. 169.

Ischias S. G. 213. *Sag.* G. 170. — Pleurodyne.

Species idiopathica, S. G. 148. *Sag.* G. 225.

Rheumatismus acutus, S. sp. 1.

Rheumatismus vulgaris, S. sp. 2.

Variat fede.

A. In musculis lumborum.

Lumbago rheumatica, S. G. 212. S. p. 1.

Nephralgia rheumatica, S. sp. 4.

B. In musculis coxendicis.

Ischias rheumaticum, S. G. 213. sp. 10.

C. In musculis thoracis.

Pleurodyne rheumatica, S. G. 148. sp. 3.

Pleuritis spuria, *Boerh.* 878.

## Species symptomaticae.

Lumbago plethorica, S. sp. 3.

Ischias sanguineum, S. sp. 2.

Pleurodyne plethorica, S. sp. 1.

Rheumatismus hystericus, S. sp. 7.

Ischias hystericum, S. sp. 3.

Pleurodyne hysterica, S. sp. 6.

Rheumatismus saltatorius, S. sp. 8.

Pleurodyne flatulenta, S. sp. 4.

Pleurodyne a spasmate, S. sp. 9.

Rheumatismus scorbuticus, S. sp. 4.

Lumbago scorbutica, S. sp. 5.

Pleurodyne scorbutica, S. sp. 11.

Ischias syphiliticum, S. sp. 7.

Pleurodyne venerea, S. sp. 5.

Lumbago sympathica, S. sp. 13.

*a mesenterii glandulis induratis,*

*a pancreate tumido, purulento, schirroso, putri,*

*ab induratis pyloro, vena cava, pancreate,*

*a rene schirroso, putrefacto,*

*ab abscessu circa venae cavæ bifurcationem,*

*a vermibus intra renes.*

Lumbago a faburra, S. fp. 8.

Pleurodyne a cacoehylia, S. fp. 7.

Rheumatismus saltatorius verminofus, S. fp. 8.

Ifchias verminofum, S. fp. 8.

Pleurodyne verminofa, S. fp. 2.

Rheumatismus metallicus, S. fp. 10.

Lumbago a hydrothorace, S. fp. 14.

Lumbago pfeudoifchuria, S. fp. 16.

Lumbago ex aneurifmate, S. fp. 11.

Pleurodyne ex aneurifmate, S. fp. 10.

Pleurodyne a rupto oefophago, S. fp. 20.

Pleurodyne rachitica, S. fp. 13.

Ifchias a fparganofi, S. fp. 5.

Pleurodyne catarrhalis, S. fp. 14.

Pleurodyne phthifical, S. fp. 8.

Rheumatismus necrofeos, S. fp. 14.

Rheumatismus convulfivus, S. fp. 15.

Ifchias gravidarum, S. fp. 4.

Lumbago partus, S. fp. 7.

Lumbago a nifu, S. fp. 10.

Ifchias a fubluxatione, S. fp. 9.

## Q

Rheumatismus dorsalis, S. sp. 11.

Lumbago a satyriasi, S. sp. 15.

Rheumatismus febricofus. S. sp. 9.

Lumbago febrilis, S. sp. 4.

Pleurodyne febricola, S. sp. 15.

Rheumatismus miliaris, S. sp. 12.

Lumbago miliaris, S. sp. 9.

Pleurodyne miliaris, S. sp. 16.

Rheumatismi sequela est,

## ARTHRODYNIA \*.

Post rheumatismum, nifum violentum, vel  
subluxationem; dolores artuum vel

\* Si, ut quidam statuunt, rheumatismus chronicus ab acuto, genere omnino diversus fit, nomen simplex, uti genus omne, habere oportet, et hujusmodi nec ineptum, ut puto, imposui. Porro, cum pro sequela rheumatismi acuti vel rheumatismi simpliciter dicendi, rheumatismum chronicum dictum semper habeo, et cum inter utrumque morbum saepe limites

musculorum, sub motu praesertim, aucti, plus minusve fugaces, calore lecti vel alio externo levati; artus debiles, rigidi, facile, et saepe sponte frigescentes; pyrexia nulla; tumor plerumque nullus.

*Rheumatismus chronicus Auctorum.*

Lumbago et ischias aliquando morbi acuti, sed cum saepius chronici sint, plerumque ad hunc locum pertinent.

#### G. XXIII. O D O N T A L G I A \*.

tes vix statuendi sint, ideoque pro diverso genere rheumatismum chronicum recensere vix potui; rheumatismus tamen chronicus exquisitus ab acuto natura adeo diversus evadit, et medelam adeo diversam exposcit, ut merito nomine prorsus diverso insigniri possit; et si quis pro genere etiam diverso ponere velit, per me profecto licet.

\* In priori Nosologiae methodicae nostrae editione, Odontalgiam pro rheumatismi specie habui, ac recensui; sed, cum eam a rheumatismo alio quovis causam prorsus diversam, acre, scilicet, membranas sensibiles irritans, habere observaverim, pro genere, a  
rheu-



Rheumatismus vel arthrodynia maxillarum,  
a carie dentium.

Odontalgia, S. G. 198. L. 45. V. 145. *Sag.* G.  
157. *Junck.* 25.

Odontalgia, sive rheumatismus odontalgicus, *Hoffm.*  
II. 330.

Varietates ex Sauvagesio sunt,

Odontalgia cariosa, S. sp. 1.

rheumatismo diverso, etiam habere vellem, et hic  
itaque apti genus diversum posui.

Etiam si odontalgiam a frigore et aliis irrita-  
mentis aliquando suscitari videtur, cariem den-  
tium, diathesin phlogisticam inducentem, semper  
subesse puto. Sunt fortassis alii morbi, ab acri ir-  
ritante orti, qui rheumatismum exacte satis refe-  
runt; sed de iis nobis non constat. Si tamen re-  
vera existeret, ad mentem Clariss. D. COTTUNNII,  
*Ischias nervosa*, rheumatismi ab acri nervos irritante  
orti exemplum aliud haberemus; sed neque phaeno-  
mena a Cottunnio relata, neque ratio medendi, neque  
sectiones cadaverum, ejusmodi morbum unquam ex-  
stitisse mihi probant; ideoque neque hic, neque alibi,  
*Ischiadem nervosam Cottunni* inter rheumatismi  
species recensui.

Odontalgia scorbutica, S. sp. 4.

Odontalgia catarrhalis, S. sp. 3.

Odontalgia arthritica, S. sp. 6.

Odontalgia gravidarum, S. sp. 2.

Odontalgia hysterica, S. sp. 3.

Odontalgia stomachica, S. sp. 9.

#### G. XXIV. P O D A G R A \*.

Morbus haereditarius, oriens sine causa externa evidente, sed praeunte plerumque ventriculi affectione insolita; pyrexia; dolor ad articulum, et plerumque pedis pollicis, certe pedum et manuum juncturis, potissimum infestus; per intervalla revertens, et saepe cum ventriculi, vel aliarum internarum partium, affectionibus alternans.

Podagra, V. 175. *Boerh.* 1254.

Febris podagrica, V. 69.

\* *Arthritis* nomen, utpote apud medicos ambiguum, rejeci, et *podagra* nomine, utpote typum morbi praecipuum notante, cum celebri BOERHAAVIO usus sum.

Arthritis, S. G. 183. L. 60. V. 139. Sag. G. 142.

Dolor podagricus et arthriticus verus, Hoffm. II. 339.

Dolores arthritici, Hoffm. II. 317.

Affectus spastico arthritici, Junck. 46.

Recte forsitan SAUVAGESIUS, more sibi insolito, hujus morbi non nisi unicam esse speciem affirmavit; sed varietates sequentes notari possunt.

- I. Podagra (*regularis*) cum inflammatione artuum satis vehemēti, per aliquot dies persistente, et paulatim cum tumore, pruritu, et desquamatione partis, recedente.

Arthritis podagra, S. sp. 1.

Arthritis rachialgica, S. sp. 11. \*.

Arthritis aestiva, S. sp. 4.

\* Ut solitus sum, SAUVAGESII varietates, sive species quas vocat, hic appono; sed tum quod species ejus non semper bene definitae sint, tum quod podagra

II. Podagra (*atonica*) cum ventriculi vel alius partis internae atonia, et vel sine expectata aut solita artuum inflammatione, vel cum doloribus artuum lenibus tantum et fugacibus, et cum dyspepsia vel aliis atoniae symptomatis, subito saepe alternantibus.

Arthritis melancholica, S. sp. 6.

Arthritis hiemalis, S. sp. 2.

Arthritis chlorotica, S. sp. 5.

Arthritis asthmatica, S. sp. 9.

III. Podagra (*retrograda*) cum inflammatione artuum subito recedente, et ventriculi vel alius partis internae atonia mox infecuta.

IV. Podagra (*aberrans*) cum partis internae inflammatione, vel non praegressa, vel praegressa, et subito recedente, inflammatione artuum.

Podagra regularis et atonica a se invicem non semper prorsus disjungantur, in apponendis loco idoneo SAUVAGESII speciebus, me ubique accuratum fore non spondeo.

Conjungitur aliquando aliis morbis podagra.

Arthritis rheumatica, S. sp. 3.

Arthritis scorbutica, S. sp. 7.

Arthritis syphilitica, S. sp. 8.

Ad podagram nequaquam pertinere videntur sequentes.

Arthritis rachitica, S. sp. 13.

Arthritis Americana, S. sp. 14.

Arthritis Bahamensis, S. sp. 15.

## G. XXV. A R T H R O P U O S I S \*.

Dolores artuum vel partium musculofarum, faepe post contusionem, profundi, obtusi, diuturni; tumor vel nullus, vel

\* Cum neque rheumatismum neque podagram in apostema unquam abire credo, est hic morbus ab utroque certe diversus, ideoque pro genere peculiari recensendus. Utinam character ad eum a rheumatismo, arthrodynia, arthrocace, et phlogosi, distinguendum, ubique satis certo adhibendus, dari posset.

modicus, et diffusus; phlogosis nulla;  
pyrexia primum lenis, tandem hectica;  
et tandem partis apostema.

Lumbago psoadica, S. sp. 6. *Fordyce*, Practice of  
Physic, P. II. pag. 70.

Lumbago apostematosa, S. sp. 12.

Lumbago ab arthrocace, S. sp. 17.

Ischias ex abscessu, S. sp. 6.

Morbus coxarius, *De Haen*, Rat. Med. Vol. I.  
C. xxxii.

## R

## O. III. EXANTHEMATA.

Morbi contagiosi, semel tantum in decursu vitae aliquem afficientes; cum febre incipientes; definito tempore apparent phlogoses, saepe plures, exiguae per cutem sparsae \*.

Exanthemata, *Sag.* Cl. X.

\* Quo caractere recte definiri, et quibus limitibus circumscribi debeat hic ordo, admodum incertum est. Si eruptiones enim a contagione specifica ortae, solae pro exanthematis, et morbis hujus ordinis, habendae sint; certe eruptiones a nulla contagione specifica, sed a quodam febris statu solum, pendentes, inter exanthemata genuina nequaquam recensendae sunt. Ita *petechia* a nobis omittitur, et forsitan tum *miliaria* tum *aphtha* omittenda esset. Dein, cum exanthemata pleraque contagiosa sint, et non nisi semel in decursu vitae aliquem afficiant, omnino idoneum videtur ut haec ab eruptionibus non contagiosis, quae saepe in decursu vitae aliquem afficiant  
vel



Phlegmasiae exanthematicae, S. Cl. III. O. I.

Morbi exanthematici, L. Cl. I. O. II.

Febres exanthematicae, V. Cl. I. O. II.

## G. XXVI. E R Y S I P E L A S \*.

Synocha duorum vel trium dierum, ple-

vel afficere possint, rite distinguantur. Variola igitur et erysipelas minus recte sub eodem ordine collocantur. Denique, cum eruptiones in morbo quodam non semper ejusdem sint formae, nec semper, nec certo quovis morbi die, in illo morbo compareant, an ejusmodi morbus inter exanthemata recensendus sit, merito dubitari potest; ideoque an pestis ad exanthematum, an ad febrium ordinem, referri debeat, dubito.

De hisce omnibus utiliter fortassis disputari potest; de iisdem vero certo statuere vix ausim; quod mihi tamen in Nosologia maxime idoneum esse videtur id ex charactere quem dedi satis patebit.

Cum autem ad characteres generum et specierum, ordinis character non omnino necessarius sit, hunc quodammodo neglexi, et hic morbos a Nosologis pro exanthematis habitos plerisque recensui.

\* Vox Erysipelas tum pro phlogosi erythemate, tum pro febre erysipelacea, a scriptoribus medicis usurpatur,

rumque cum somnolentia, saepe cum delirio.

In aliqua cutis parte, saepius in facie, phlogosis *erythema*, G. VII. sp. 2.

Erysipelas, S. G. 97. L. ro. *Sag.* G. 296.

Febris erysipelacea, V. 68. *Hoffm.* II. 98.

Species sunt,

I. Erysipelas (*vesiculosum*) erythemate, rubedine serpente, latum spatium occupante, et locis ejus quibusdam in vesiculas magnas abeunte.

Erysipelas rosa, S. sp. 1. *Sennert.* de febr. L. II. c. 15.

furpatur, sed recte SAUVAGESIUS vitium cutaneum; quod nullam febrem, nisi symptomaticam, sibi junctam habeat, erythema appellari, et erysipelas, tantum febris illa exanthematica, quam erythema sequitur, vocari velit.

Minus recte forsitan Ill. LINNÆUS erysipelas pro protypo exanthematicorum habuit; inter exanthemata enim, an recte, recensetur ipsum erysipelas dubitari potest.

Febris erysipelatosa, *Sydenham*, sect. VI. cap.

5.

Erysipelas typhodes, S. sp. 2. \*.

Erysipelas pestilens, S. sp. 5. †.

Erysipelas contagiosum, S. sp. 9.

II. Erysipelas (*phlyctænodes* ‡) erythemate ex papulis pluribus, trunci corporis partes praecipue occupantibus,

\* Haec non nisi varietas erysipelatis vesiculosi, gradu solum differens, esse videtur.

† Haec et sequens non nisi febres cum erythemate symptomatico videntur. Hic tamen notandum est, erysipelas saepe aliquid putridae et gangraenofae indolis prae se ferre; nec dubito quin erysipelas, quod in hac regione, plerumque diathesi phlogistica comitatur, aliquando, praesertim in regionibus calidioribus, cum diathesi putrida adsit; et forsitan duas erysipelatis species, inflammatoriam nempe et putridam, indicare potuissemus; sed de posteriori nobis non fatis constat.

‡ An haec species ad idem cum erysipelate vesiculoso genus recte referatur, dubito; sed judicent periti.

et protinus in phlyctaenas, five vesiculas parvas, abeuntibus.

Erysipelas Zoster, S. sp. 8.

Zona, Anglis, The SHINGLES, *Ruffel de tabe gland.* p. 124. Hist. 35.

Herpes Zoster, S. sp. 9.

### Symptomaticum.

Erysipelas a veneno, S. sp. 3.

Caeterae SAUVAGESII species ad erythema pertinent.

### G. XXVII. P E S T I S.

Typhus maxime contagiosa, cum summa debilitate \*.

Incerto morbi die, eruptio bubonum vel anthracum.

Pestis, S. G. 91. L. 2. *Junc.* 78.

Febris pestilentialis, V. 33. *Hoffm.* II. 93.

\* De charactere pestis, lites inter medicos saepe ortae sunt, nec facile dirimendae, ita ut character quibuscunque pestis casibus adhibendus dari possit; sed sufficiat characterem dedisse qui in plerisque adhiberi queat.

Variat gradu.

Pestis benigna, S. sp. 2. Pestis Massiliensis Class.

3. Traité de la peste, pag. 41. Ejusdem pestis,  
Cl. 5ta, Traité, p. 228.

Pestis remittens, S. sp. 9.

Pestis vulgaris, S. sp. 1. Pestis Massil. Cl. 2.

Traité, p. 38. Ejusd. Cl. 2. 3. et 4ta, Traité,  
p. 225. &c. Waldschmidt. de peste Holsatica,  
apud *Halleri*, Diff. pract. tom. V. Chenot de  
peste Transylvanica 1755, 1759. *De Haen*, Rat.  
med. Pars xiv.

Pestis Ægyptiaca, S. sp. 11. *Alpin.* de med.  
Ægypt.

Pestis interna, S. sp. 3. Pest. Massil. Cl. 1.  
Traité, p. 37. 224.

Species dubiae sunt,

Pestis sporadica, S. sp. 4.

Pestis carbunculosa, S. sp. 5.

Pestis Siamaea, S. sp. 8.

Pestis scorbutica, S. sp. 10.

## G. XXVIII. V A R I O L A.

Synocha contagiosa cum vomitu, et, ex epi-  
gastrio pressio, dolore.

Tertio die incipit, et quinto finitur eruptio papularum phlegmonodearum, quae, spatio octo dierum, in suppurationem, et in crustas demum abeunt, saepe cicatrices depressas, five foveolas in cute, relinquentes.

Variola, S. G. 92. L. 3. *Sag.* G. 290.

Febris variolosa, V. 35. *Hoffm.* II. 49.

Variolae, *Boerh.* 1371. *Junck.* 76.

Species sunt,

I. Variola (*discreta*) pustulis paucis, discretis, circumscriptione circularibus, turgidis; febre, eruptione facta, protinus cessante.

Variola discreta benigna, S. sp. 1.

Variolae regulares discretae, *Sydenh.* Sect. III. cap. 2.

Variolae discretae simplices, *Helvet.* obs. sp. 1.

Variola discreta complicata, S. sp. 2. *Helv.* sp. 2.

Variolae anomalae, *Sydenh.* Sect. IV. cap. 6.

Variola discreta dysenteriodes, S. sp. 4. *Sydenh.*

Sect. IV. cap. 1.

Variola discreta vesicularis, S. sp. 5.

Variola discreta crystallina, *Mead* de variol. cap.

2.

Variola discreta verrucosa, S. sp. 6. *Mead* ibid.

Variola discreta filiquosa, S. sp. 7. *Friend. Oper.*  
p. 35<sup>8</sup>.

Variola discreta miliaris, S. sp. 8. *Helvet.* obs.  
sp. 3.

II. Variola (*confluens*) pustulis numerosis,  
confluentibus, circumscriptione irregu-  
laribus, flaccidis, parum elevatis ; febre  
post eruptionem persistente.

Variola confluens, S. sp. 9.

Variolae regulares confluentes, ann. 1667. *Sy-  
denh.* Sect. III. cap. 2.

Variolae confluentes simplices, *Helvet.* obs.  
sp. 1.

Variola confluens crystallina, S. sp. 10.

Variola Japonica, *Kempfer.*

Vesiculae Divae Barbarae, *G. Pis.* obs. 149. \*.

\* Pro specie variolae, has vesiculas hic posuit  
SAUVAGESIUS. Sed vesiculae a Pisone descriptae  
potius ad pemphigum pertinere mihi videntur.

S



Variola confluens maligna, *Helvet.* obs. sp. 1.

Variola confluens cohaerens, S. sp. 11.

Variola confluens maligna, *Helvet.* sp. 2.

Variola confluens nigra, S. sp. 12. *Sydenh. Sect.*

V. cap. 4.

Variola confluens maligna, *Helvet.* sp. 3.

Variola sanguinea, *Mead de variolis*, cap. 2.

Variola confluens corymbosa, S. sp. 13.

Variola confluens maligna, *Helvet.* sp. 4.

## G. XXIX. V A R I C E L L A.

### Synocha.

Papulae post brevem febriculam erumpentes, in pustulas variolae similes, sed vix in suppurationem euntes; post paucos dies in squamulas, nulla cicatrice relicta, desinentes.

Varicella, V. 42.

Variola lymphatica, S. sp. 1.

Anglis, the CHICKEN-POX, *Edinb. Med. Essays*,

Vol. II. Art. 2. near the end. *Heberden, Med.*

*Transact.* Art. 17.

## G. XXX. R U B E O L A.

Synocha contagiosa cum sternutatione, epiphora, et tussi ficca, rauca.

Quarto die, vel paulo serius, erumpunt papulae exiguae, confertae, vix eminentes, et post tres dies in squamulas furfuraceas minimas abeuntes.

Rubeola, S. G. 94. L. 4. *Sag.* 293.

Febris morbillosa, V. 36. *Hoffm.* II. 62.

Morbilli, *Junck.* 76.

I. Rubeola (*vulgaris*) papulis minimis, confluentibus, corymbosis, vix eminentibus.

Rubeola vulgaris, S. sp. 1.

Morbilli regulares, *Sydenh.* Sect. IV. cap. 5.

Variat

1. Symptomatis gravioribus, et decursu minus regulari.

Rubeola anomala, S. sp. 2.

Morbilli anomali, *Sydenh. Sect. V. cap. 3.*

2. Comitante Cynanche.

Rubeola anginosa, S. sp. 4. *Edinb. Essays, Vol. V. art. 2.*

3. Comitante diathesi putrida, *Clar. Watson, Lond. Med. Observ. Vol. IV. Art. XI.*

II. Rubeola, (*variolodes*) papulis discretis eminentibus.

Rubeola variolodes, S. sp. 3. \*.

Scotis the NIRLES.

G. XXXI. M I L I A R I A †.

\* SAUVAGESIUM fecutus, hunc morbum hic indicavi, etsi multum dubito an recte ad rubeolam referendus sit. Non solum enim forma papularum plurimum differt, sed, quod majoris momenti esse videtur, est plerumque absque symptomatis catarrhalibus, rubeolae adeo propriis.

† Inter medicos, speciatim Viennenses, de indole morbi miliaris nuper acriter disputatum est; et imprimis

Synochus cum anxietate, frequenti fufpirio,  
fudore olido, et punctionibus cutis.

primis an unquam idiopathicus, an vero femper  
fymptomaticus fit, certatim quaeritur. Quod nun-  
quam idiopathicus fit, praeter opinionem medico-  
rum, a medio feculî decimi feptimi in hunc fere  
diem, omnium, et contra fententiam medicorum hu-  
jus aevi quorundam fpectabilium, affirmare non au-  
fim; fed cum experientiam in hac re faepe fallacem,  
et medicos plerofque imitatorum fcrvum pecus fuiſſe  
noverim, dubitare cogor; et, utcunque fit, morbum  
miliarem plerumque fymptomaticum fuiſſe, ex  
obfervatione propria, per multos annos frequenti,  
certo novi. Nunquam contagioſum, nec mani-  
feſto epidemicum, quibuſdam licet temporibus  
ſolito frequentiore, vidi. Morbis febrilibus qui-  
buſcunque, tum inflammatoriis tum putridis, a-  
liquando adjungitur; in nullis tamen, niſi regi-  
mine calido et fudoribus praeceuntibus, ortum, et in  
pluribus, regimine temperato, et fudoribus vitatis, mor-  
bum, alias expectandum, prorfus vitatum obſervavi. I  
quibuſdam corporis partibus quaſi arte excitatum ali-  
quoties novi. Denique, cum contagionum specifica-  
rum plerarumque indolem materia, ſi qua datur,  
miliaris nequaquam imitetur, tum quod certo mor-  
bi dic eruptionem non efficiat, tum quod non  
ſemel

Incerto morbi die erumpunt papulae rubrae, exiguae, discretae, per totam cutem, praeter faciem, crebrae, quarum apices, post unum vel alterum diem, pustulas minimas, albas, brevi manentes, ostendunt.

Miliaria, L. 7.

Miliaris, S. G. 95. *Sag.* G. 295.

Febris miliaris, V. 37.

Febris purpurata rubra et alba miliaris, *Hoffm.* II. 68.

Febris purpurea seu miliaris, *Junck.* 75.

semel tantum, sed saepius in vitae decursu, hominem afficiat. De hujus igitur materiae natura specifica, vel ad morbum quemvis idiopathicum gignendum apta, valde dubito. In hac re mecum sentientem experientissimum et peritissimum CAROLUM WHITE habere mihi gratulor. Vide *White on the Management of Lying-in Women.*

Cum autem in hac re me falli potuisse, facile agnosco, ne tamen alios simul fallerem, miliariam inter exanthemata hic recensui, et characterem ejus, quem quivis, hunc morbum pro idiopathico habens, dare voluerit, exhibui; peritis quibusvis hanc rem certius dijudicandam relinquens.

Germanis der FRIESEL. God. Welsch. Hist. med. de novo puerperarum morbo, qui der FRIESEL dicitur, Lips. 1655.

De hoc morbo scriptores praecipui sunt.

*Hamilton*, de febr. miliar. 1710. *Fantonus*, de febr. mil. 1747. *Allioni* de miliar. 1758. *Fordyce*, de febr. mil. 1748. *Fischer* de febr. mil. 1767. *De Haen*, de divis. febr. 1760, et in Ratio med. passim. *Matt. Collin* ad *Baldinger* de miliar. 1764.

Ad Idiopathicam, si qua datur, pertinent,

Miliaris benigna, S. sp. 1.

Miliaris maligna, S. sp. 2.

Miliaris recidivans, S. sp. 3.

Miliaris Germanica, S. sp. 5.

Symptomaticae manifesto sunt,

Miliaris Boia, S. sp. a.

Miliaris Britannica, S. sp. i.

Miliaris nova febris, *Sydenh.* Sched. monit. S. sp. d.

Miliaris sudatoria, S. sp. e.

Miliaris nautica, S. sp. g.

Miliaris purpurata, S. sp. *b.*

Miliaris lactea, S. sp. *c.*

Miliaris puerperarum, S. sp. *k.*

Miliaris scorbutica, S. sp. *l.*

Miliaris critica, S. sp. *b.*

## G. XXXII. S C A R L A T I N A.

Synocha contagiosa.

Quarto morbi die, facies aliquantum tumens; simul in cute passim rubor floridus, maculis amplis, tandem coalescentibus, post tres dies in squamulas furfuraceas abiens; superveniente dein saepe anasarca.

Scarlatina, S. G. 98. V. 39. *Sag.* G. 294. *Junck.*  
75.

Species sunt,

I. Scarlatina (*simplex*) nulla comitante cynanche.



Scarlatina febris, S. sp. 1. Sydenh. sect. VI, ca .

2:

## II. Scarlatina (*cynanchica*) cum cynanche ulcerosa \*.

\* Spatio quadraginta annorum Scarlatinam sexies vel septies in Scotia epidemicam observavi, et in unoquoque exemplo morbus illius speciei erat quam Scarlatinam anginosam vocat SAUVAGESIUS. Nos Cynanchicam appellavimus, ex eo quod ulceribus faucium internarum fere semper comitata fuit. Cum in plerisque aegris morbus cynanchem malignam plurimum, aliquando satis exacte referebat, nec unquam scarlatinam epidemicam in omnibus aegris simplicem esse viderim, saepe dubitavi annon scarlatina omnis sit cynanchica, et semper idem fere morbus ac cynanche maligna, supra inter Phlegmasias relata. Plures autem rationes in hanc sententiam ire non sinunt. Certe enim, testibus SYDENHAMO perspicacissimo et aliis, scarlatina simplex, sive nulla comitante cynanche, aliquando observata fuit, et datur, itaque contagio quaedam specifica efflorescentiam cutis scarlatinam, et hanc absque affectione quadam cynanchica, gignens. Quod, si aliquando etiam contagio sit, fauces afficiens,

Scarlatina anginosa, S. sp. 6. *Withering* on the scarlet fever.

De scarlatina porriginosa, S. sp. 3. Sydenh. Sect. VI. Cap. 6. et Scarlatina variolode, S. sp. 5. nobis non liquet.

afficiens, quae plerumque etiam scarlatinam gignat, hoc nihil praeterea mihi probare videtur, quam quod sit contagionum quarundam natura, ejusmodi ut simul tum fauces, tum cutem, afficere valeat. Cum tamen contagiones istae ita differre possint, ut altera cutem, altera fauces magis et primario afficere proclivis sit, hanc differentiam inter scarlatinae et cynanchis malignae contagionem semper inesse puto. In morbo epidemico, quem pro Scarlatina habui, aliquot aegrotantium sine cynanche quacunque erant; et in iis fere omnibus, quibus adfuit cynanche, haec benigna admodum, ulcera tonsillarum, parva tantum nec serpentina, et plerumque pus bonum fundentia, exhibuit, et morbus raro funestus fuit. In cynanche vero maligna aegrotantes omnes in ipso morbi ingressu, cynanche correpti sunt, et haec fere semper ulcera maligna, foeda, serpentina, gangraenosa, ostendebat. Morbus porro, putredinis et debilitatis indicia plurima prodens, plerumque exitialis evasit.

## G. XXXIII. URTICARIA\*.

Febris amphemerina †.

Die secundo rubores maculosi, urticarum puncturas referentes, interdiu fere evanescentes, vespere cum febre redeuntes, et post paucos dies in squamulas minutissimas penitus abeuntes ‡.

\* Est morbus ab Anglis, *The Nettle Rash* dictus, qui quibusdam Urticaria audit; sed morbus ille, *The Nettle Rash*, ut ab eruditissimo viro G. HERBERDEN, in Coll. Reg. Med. Lond. Actis describitur, et qualem saepius ipsi vidimus, est ab urticaria nosologorum omnino diversus, utpote sine febre chronicus, et ad Impetigines fortassis referendus.

† Hanc in priori editione contagiosam dixi; sed ex propria experientia contagiosam fuisse non novi, et quo auctore contagiosam antea dixi, nunc non invenio.

‡ Ad aliorum potius quam meipsum mentem hic character conscriptus est; nam hunc morbum raro vidi, et nunquam epidemicum, vel regulariter, ut hic describitur, decurrentem, observavi.

Febris urticata, V. 40.

Uredo, L. 8.

Purpura urticata, *Junck.* 75.

Scarlatina urticata, S. sp. 2.

Erysipelatis species altera, *Sydenh. Sect. VI.*  
cap. 6.

Febris scarlatina, et febris urticata, *Meyserer,*

Mal. des armées, 291. et seq.

## G. XXXIV. PEMPHIGUS.

Typhus contagiosa.

Primo, secundo, aut tertio morbi die, in  
variis partibus vesiculae, avellanae  
magnitudine, per plures dies manentes,  
tandem ichorem tenuem effundentes.

Pemphigus, S. G. 93. *Sag.* 291.

Morta, L. I.

Febris bullosa, V. 41.

Species ex SAUVAGESIO sunt \*,

Pemphigus major, S. sp. 1.

Exanthemata serosa, C. Pison. obs. 150.

\* Cum pemphigum, quem pro exanthemate habere possim, nondum ipse viderim, et in scriptis medicorum de ejusmodi morbo paucissima tantum invenerim; quae in Nosologia nostra de eo dicenda essent, omnia fere ex SAUVAGESIO necessario depromenda erant. Eum itaque secutus sum; sed hunc morbum lubenter ipse prorsus omissem, cum omnia fere de eo dicta, dubia, obscura, et ambigua mihi videntur. Quae ex sui ipsius aut CAROLI PISONIS observatione habet SAUVAGESIUS, omnino credere fas est; quae autem ex CHRISTOPHORI SELIGERI, tenuis certe judicii hominis, observatione duxit, parum attentione digna mihi videntur. Quae porro ex D. THIERRY relatione adducuntur meam fidem omnino superant: Nimirum, *quod in morbo admodum exitiali acetum bezoarticum, a medico quodam datum, omnes salvos fecit, interea dum vix unus, aliis medicis commissus, mortem evadebat.* Denique, de morbo admodum ambiguo a D. LANGHANS, in Actis Helveticis descripto, donec aliae observationes rem elucidaverint, nihil concludere



# 150 G E N E R A M O R B O R U M

Febris pemphygodes, Ephem. Germ. D. I. A.  
VIII. obs. 56.

Pemphigus castrensis, S. sp. 2.

Febris syneches, cum vesiculis per pectus et col-  
lum sparsis, *Morton.* app. ad exerc. II.

Pemphigus Helveticus, S. sp. 3. *Langhans* in  
Act. Helvet. vol. 2. p. 260. et in *Beschreibung*  
des Siementhals, Zurich 1753.

De pemphigo Indico, S. sp. 4. et

Pemphigo Brasiliensi, S. sp. 5. non liquet.

## G. XXXV. A P H T H A.

Synochus\*.

Lingua tumidiuscula ; linguae et fauci-

dere vellem. Nihil aliud, fortassis, quam cynanche  
maligna fuit ille morbus, et, ad summum, quod  
pemphigus omnis morbus symptomaticus sit, satis  
verisimile videtur.

• An aphtha inter exanthemata recensenda sit,  
dubito. Aphtha enim quaeque fere quam ego vidi  
sine febre fuit ; et si quando cum aphtha infantum  
febris adfuit, haec fere semper aphthae supervenerat.

Aphtha

cium color purpurascens ; escharae in faucibus et ad linguae margines primum comparentes, os internum totum demum occupantes, albidae, aliquando discretæ, sæpe coalescentes, abrasæ cito renascentes, et incerto tempore manentes.

Aphtha, S. G. 100. L. 9. *Sag.* 298. *Boerh.* 978.

*Hoffm.* II. 478. *Junck.* 137.

Febris aphthosa, V. 44.

Speciem idiopathicam unicam tantum novi.

*Aphtha infantum.*

*Aphtha lactucimen*, S. sp. 1.

Symptomaticæ videntur,

*Aphtha febrilis*, S. sp. 2.

*Aphtha maligna*, S. sp. 3.

*Aphtha adutorum* quidem sæpe feбри supervenit. Sed, febribus diversarum specierum plerumque sub earum finem jungitur, nec, quantum novi, febris quævis aphthæ propria, a medicis nota, vel quidem dicta fuit.



Manifesto symptomatice sunt

Aphtha syphilitica, S. sp. 4.

Aphtha scorbutica, S. sp. 5.

Exanthema symptomaticum est,

PURPURA, S. G. 96. Sag. G. 292. \*

Petechia, L. 5.

\* Cum in quibusvis febribus, vel intermittentibus vel continuis, in quibusvis etiam exanthematibus et profluviis, modo in iis morbis sit quaedam ad putredinem proclivitas, appareant petechiae; has pro efflorescentia symptomatice, potius quam pro exanthemate idiopathico, habere volui.

## O. IV. HÆMORRHAGIÆ\*.

Pyrexia cum profusione sanguinis absque vi externa; sanguis missus ut in phlegmasiis apparet.

Haemorrhagiae, V. Cl. II. O. I. *Hoffm.* II. 194.

*Junck.* 5.

Sanguifluxus, S. Cl. IX. O. I. *Sag.* Cl. V. O. I.

\* Classẽ Fluxuum apud SAUVAGESIUM et SAGARUM, vel Profluviorum apud VOGELIUM, vel morborum evacuatoriorum apud LINNÆUM, cum illa morbos, tum facie, tum natura, omnino dissimiles conjunxerit minime naturalem esse, nec proinde idoneam putavi. In nostram, igitur, Nosologiam ejusmodi classẽ admittere nolui, et morbos in ea recensitos aliorum referendos esse censui. Illi quos pyrexia quaedam semper comitatur, sub classe Pyrexiarum certe recensendi sunt; et hic igitur

## G. XXXVIII. EPISTAXIS \*.

Capitis dolor vel gravitas ; faciei rubor ;  
profusio sanguinis e naribus.

Epistaxis, V. 82.

tur hemorrhagias *activas* quas vocant posui HOFF-  
MANNUM sequor, qui mox post febres de ejusmodi  
haemorrhagiis tractavit, et in praefatione rationem  
reddidit ; quod, scilicet, “ *probe consideratis phaeno-  
menis, et paulo pensiculatiùs subductis rationibus,  
sanguinis eruptiones iisdem propemodum, utut, non  
satis completis motibus quibus febres oriuntur, pro-  
gignuntur.*”

\* Recte tum in Criticis Botanicis, tum in Phi-  
losophia Botanica, No. 233. monuit LINNAEUS,  
“ *Nomina generica, cum classium et ordinum na-  
turalium nomenclaturis communis, omittenda esse.*”

Contra hanc regulam tamen ipse peccat, cum vo-  
cabulo haemorrhagia, classis vel ordinis naturalis  
appellatione satis frequenter usitata, pro nomine  
generico utatur. Nec quidem, cum erraverit, ipse  
HIPPOCRATES imitandus sit. Hujus generis ita-  
que nomen mutandum erat, et a VOGELIO quod  
hic usurpatum est desumpti.

Haemorrhagia, S. G. 239. L. 173. *Sag.* G. 174.

Haemorrhagia narium, *Hoffm.* II. 196. *Junck.* 6.

## I. Idiopathica.

Haemorrhagia plethorica, S. sp. 2. *Hoffm.* II. 198.

Variat ratione aetatis,

Epistaxis (*juniorum*) cum signis plethorae arteriosae.

Epistaxis (*senum*) cum signis plethorae venosae.

## II. Symptomatae.

### 1. A causis internis.

Haemorrhagia febrilis, S. sp. 3.

Haemorrhagia critica, S. sp. 4. *Hoffm.* II. 198.

Haemorrhagia infalubris, S. sp. 5. *Hoffm.* ibid.

Haemorrhagia in chronicis, S. sp. 6.

## 2. A causis externis.

Haemorrhagia passiva, S. sp. 1.

Haemorrhagia a hirudine, S. sp. 7.

## G- XXXVIII. HÆMOPTYSIS.

Genarum rubor; molestiae aut doloris, et aliquando caloris, in pectore sensus; dyspnoea; titillatio faucium; tussis aut tussicula sanguinem floridum, saepe spumosum rejiciens.

Haemoptysis, S. G. 240. L. 179. V. 84. *Sag.*

G. 175. *Junck.* 8.

Haemoptoe, *Boerb.* 1198. †

Sanguinis fluxus ex pulmonibus, *Hoffm.* II. 202.

Species idiopathicae sunt,

1. Haemoptysis (*plethorica*) nulla vi externa applicata, neque praegressa tussi aut evacuationis solitae suppressione.

2. Haemoptysis (*violenta*) a vi externa applicata.

Haemoptysis accidentalis, S. sp. 1.

Haemoptysis habitualis, S. sp. 2.

Haemoptysis traumatica, S. sp. 12.

3. Haemoptysis (*phthifica*) post tussim cum macie et debilitate diuturnam.

Haemoptysis phthifica, S. sp. 9.

Haemoptysis ex tuberculo pulmonum, S. sp. 10.

4. Haemoptysis (*calculosa*) rejectis simul moleculis calculosis plerumque calcareis.

Haemoptysis calculosa, S. sp. 14.

5. Haemoptysis (*vicaria*) post evacuationis solitae suppressionem

Haemoptysis catamenialis, S. sp. 4.

Haemoptysis periodica, S. sp. 5.

Symptomaticae sunt,

Haemoptysis *pneumonica*.

Haemoptysis catarrhalis, S. sp. 8.

Haemoptysis peripneumonica, *Laelii a fonte*.

Haemoptysis *exanthematica*,

*Haemoptysis variolosa*, S. sp. 7.

*Haemoptysis rubeolosa*.

*Haemoptysis hydropica*,

*Haemoptysis ascitica*, S. sp. 15.

*Haemoptysis hydrothoracica*

*Haemoptysis cachectica*.

*Haemoptysis splenetica*, S. sp. 16.

Ineptae et spuriae sunt,

*Haemoptysis a diapedesi*, S. sp. 3.

*Haemoptysis a sphacelo pulmonum*, S. sp. 11.

*Haemoptysis scorbutica*, S. sp. 6.

*Haemoptysis Helvigiana*, S. sp. 17.

*Haemoptysis a hirudine*, S. sp. 13.

*Haemoptyseos sequele est*

P H T H I S I S.

Corporis emaciatio et debilitas, cum tussi,  
febre hectica, et plerumque expectora-  
tione purulenta.

Phthisis, S. G. 276. L. 208. V. 319. *Sag.* 101.

*Junc.* 33.



Phthisis pulmonalis, *Boerb.* 1196.

Affectio phthisica, five tabes pulmonalis, *Hoffm.*  
III. 284.

Species sunt,

I. Phthisis (*incipiens*) sine expectoratione puris.

Phthisis incipiens, *Morton.* Physiolog. L. II. cap.  
3.

Phthisis sicca, S. sp. 1.

II. Phthisis (*confirmata*) cum expectoratione puris.

Phthisis confirmata *Auctorum.*

Phthisis humida, S. sp. 2.

Variat utraque species,

Ratione causae remotae.

Phthisis haemoptoica, S. sp. 6.

Phthisis a peripneumonia, S. sp. 11.

Phthisis asthmatica, S. sp. 5.

Phthisis calculosa, S. sp. 7.

Phthisis exanthematica, S. sp. 14.

Phthisis a febris, S. sp. 13.

Phthisis rheumatico-arthritica, S. sp. 12.

Phthisis chlorotica, S. sp. 10.

Phthisis icteritia, S. sp. 15. *Schacht.* de phthisi  
icterit. 1724.

Phthisis hypochondriaca, S. sp. 16.

Phthisis scrophulosa, S. sp. 3.

Phthisis chylosa, S. sp. 17.

Phthisis scorbutica, S. sp. 4.

Phthisis syphilitica, S. sp. 8.

Phthisis a plica, S. sp. 19.

Phthisis a metastasi puris, S. sp. 9.

### Variat ratione fontis purulentae.

Phthisis a vomica, S. sp. 18.

Phthisis cellularis, S. sp. 20. *De Haen*, Rat. me-  
dendi, vol. I. cap. 7. 11. Ed. Leid. \*.

## G. XL. H Æ M O R R H O I S.

Capitis gravitas vel dolor ; vertigo ; lum-

\* Utrum, de hoc fonte puris, recte an secus judica-  
verit HAENIUS, hujusmodi species vix in Nosologia  
locum habere potest, cum a signis, quibusvis exter-  
nis dignosci non queat.

borum dolor; dolor ani; circa anum tubercula livida dolentia, e quibus plerumque profluit sanguis, qui aliquando etiam, nullo tumore apparente, ex ano stillat.

Haemorrhoids, S. G. 217. L. 192. *Sag.* G. 182.

Haemorrhoidalis fluxus, *Hoffm.* 219.

Haemorrhoides, *Junck.* 11. et 12.

Leucorrhoids, V. 112.

Species sunt,

1. Haemorrhoids (*tumens*) externa a mariscis,

Variat,

A. Cruenta.

Haemorrhoids moderata, S. sp. 1.

Haemorrhoides ordinatae, *Junck.* 11.

Haemorrhoides nimiae, *Junck.* 11.

Haemorrhoids immodica, S. sp. 2.

Haemorrhoides excedentes, *Alberti* de haemorrhoid. pag. 179.

Haemorrhoids polyposa, S. sp. 3.

## B. Mucofa.

Haemorrhoides decoloratae, albae, et mucidae,  
*Junck. 13. Alberti, pag. 248.*

2. Haemorrhoids (*procidens*) externa a procidentia ani.

Haemorrhoids ab exania, S. sp. 4.

3. Haemorrhoids (*fluens*) interna absque tumore externo, vel procidentia ani \*.

\* STAHLIUS, et ejus sequaces, distinxerunt haemorrhoides in internas, quae sanguinem ex ramis venae portarum, et externas, quae sanguinem ex ramis venae cavae profundunt; sed, quantum video, scaturigo sanguinis profusi nullo modo dignosci queat. Huic itaque distinctioni nullus locus esse videtur, nec, si esset, quicquid ad distinguendam morbi naturam, vel effectum, conferre posset; nam arteriae et venae, ad inferiorem intestini recti partem pertinentes, ortu utcunque diversae, tam frequenter inter se invicem communicantur et jungantur, ut uniuscujusvis affectio ad alteram statim communicari, et utriusvis effectus fere idem  
 semper

4. Haemorrhoids (*caeca*) cum dolore et tumore ani, sine profusione sanguinis.

Haemorrhoides caecae, *Junck.* 12. *Alberti*, pag. 274. \*.

## G. XLI. M E N O R R H A G I A.

Dorsi, lumborum, ventris, parturientium instar, dolores; menstruum copiosior,

semper esse oporteat. Non ideo haemorrhoidem, internam et externam ad mentem Stahlianorum distinxi, sed prout scaturigo sanguinis profluentis magis intra vel extra anum fuerit.

\* Haemorrhoids saepe corporis universi morbus est, sive a quodam universi corporis statu pendens; sed saepe etiam morbus est mere localis. Non tamen hujusmodi species ad morbos locales referre volui; quoniam haemorrhoids quaevis, etiam si initio mere localis sit, si saepius, ut solet, redierit, tandem, sicut haemorrhagia alia quaevis saepe rediens, necessario fit universi corporis morbus. Affines itaque separare nolui, et haemorrhoidem quidem omnem hic inter morbos universales recensendam esse censui.

vel sanguinis e vagina praeter ordinem fluxus.

Menorrhagia, S. G. 244. L. 202. V. 96.

Metrorrhagia, *Sag.* G. 179.

Uteri haemorrhagia, *Hoffm.* II. 224.

Haemorrhagia uterina, *Junck.* 14.

Leucorrhoea, S. G. 267. L. 201. V. 119. *Sag.* G. 202.

Cachexia uterina, five fluor albus, *Hoffm.* III. 348.

Fluor albus, *Junck.* 133. \*.

Abortus, S. G. 245. L. 204. *Sag.* G. 180. *Junck.* 92.

Abortio, V. 97.

Fluor uterini sanguinis, *Boerb.* 1303.

Convulsio uteri, five abortus, *Hoffm.* III. 176.

\* Leucorrhoeam, five fluorem album, *auctorum* hic ad menorrhagiae genus retuli, et leucorrhoeam sine vitio locali omnem huc omnino referendum esse censeo. Plerumque enim, et fere semper, leucorrhoea vel cum menorrhagia conjuncta est, vel eam mox secuta, et a temporibus quando apparet leucorrhoea serum sub hac effusum ab iisdem vasis, quae menses profundunt, provenire, et saepe leucorrhoeam  
ab

Species sunt,

1. Menorrhagia (*rubra*) cruenta in non gravidis nec puerperis.

Menorrhagia immodica, S. sp. 3. a *Pasta*. Diff. sopra i mestruì.

Menorrhagia stillatitia, S. sp. 2.

2. Menorrhagia (*abortus*) cruenta in gravidis.

Menorrhagia gravidarum, S. sp. 6. *Pasta* intorno al flusso di sangue dall'utero nelle gravide.

Abortus effluxio, S. sp. 1.

a. Abortus subtrimestris

b. Abortus subsemestris.

c. Abortus octimestris.

Abortus ab uteri laxitate, S. sp. 2.

3. Menorrhagia (*lochialis*) cruenta in puerperis.

ab iisdem causis ac menorrhagiam rubram oriri, satis verisimile est.



Menorrhagia lochialis, S. sp. 8. *Pasta* diff. supra  
citat.

4. Menorrhagia (*vitiorum*) cruenta ex  
vitio locali.

Menorrhagia ex hysteroptosi, S. sp. 5.

Menorrhagia ulcerosa, S. sp. 9.

5. Menorrhagia (*alba*) ferosa sine vitio  
locali in non gravidis \*.

Leucorrhoea, G. ut supra.

Menorrhagia decolor, S. sp. 7.

Leucorrhoea Americana, S. sp. 5.

Leucorrhoea Indica, S. sp. 6.

6. Menorrhagia (*Nabothi*) ferosa in gra-  
vidis.

Leucorrhoea Nabothi, S. sp. 9.

Leucorrhoea gravidarum, S. sp. 8. \*.

\* Hic fortassis lector eruditus mirari possit, quod  
ad clariss. medici Parisiensis RAULIN, de fluore  
albo

Menorrhagiam ferofam, five leucorrhoeam ex vitio locali, ad morbos locales referendam effe cenfeo.

Haemorrhagiae fequentes plerumque, fi non femper, fympomaticae funt.

STOMACACE, S. G. 241. L. 175. V. 85. *Sag.*  
G. 176.

albo librum, *Traité des fleurs blanches*, neque ftudiofos relegaverim, neque fpecies fluoris albi varias ab illuftri auctore indicatas ipfe recensuerim. Recte an fecus fecerim, peritis dijudicandum relinquo; fed quod non fecerim haec caufa fuit. Plura in libro illo ingeniofo subtilius, quam verius dicta, mihi videntur; et vel quomodo fluor albus, ab aliarum praeter uteri partium affectione oriri poffit, non intelligo, vel quod revera oriantur, ex meis faltem obfervationibus, forfan paucioribus, mihi nequaquam conftat. Lectores itaque nostros potius ad auctorem ipfum relegare, quam doctrinam ejus male intellectam, et forfan minus recte traditam, hic exhibere velim.

Vel scorbuti, vel vitii oris, vel injuriæ  
externæ, symptomata est.

Apud SAUVAGESIUM species sunt,

1. Stomacace scorbutica.
2. Stomacace universalis.
3. Stomacace ab hæmorrhoo.
4. Stomacace purulenta.

HÆMATEMESIS, S. G. 242. L. 184. V. 89.  
G. 177.

Plerumque hæmorrhagiæ folitæ vicaria  
est, vel vitii ventriculi localis, vel morbi  
nigri, vel denique vis externæ, sympto-  
mata est.

1. Hæmatemesis plethorica.
2. Hæmatemesis ex aneurismate.
3. Hæmatemesis traumatica.
4. Hæmatemesis ab hirudine.
5. Hæmatemesis catamenialis.
6. Hæmatemesis ex pancreate.
7. Hæmatemesis ex splene.
8. Hæmatemesis scorbutica.

9. Haematemesis cholericæ.
10. Haematemesis simulata.
11. Haematemesis carnosæ cruenta.
12. Haematemesis atra.
13. Haematemesis ab hepate.
14. Haematemesis a veneno.

HEMATURIA, S. G. 243. L. 198. V. 92. *Sag.*  
G. 178.

Plerumque calculi renalis, aliquando februm putridarum symptomata est.

1. Haematuria spontanea.
2. Haematuria violenta.
3. Haematuria deceptiva.
4. Haematuria purulenta.
5. Haematuria calculosa.
6. Haematuria in exanthematicis.
7. Haematuria ejaculatoria.
8. Haematuria stillatitia.
9. Haematuria hæmorrhoidalis.
10. Haematuria spuria.
11. Haematuria nigra.
12. Haematuria catamenialis.
13. Haematuria a transfusione.

14. Haematuria traumatica.

15. Haematuria a verme.

CYSTIRRHAGIA, V. 93.

Plerumque calculi vesicalis, rarius alius  
morbi vesicae, symptomata.

## O. V. PROFLUVIA\*.

Pyrexia cum excretionē aucta, naturaliter  
non fanguinea.

## G. XLII. C A T A R R H U S.

Pyrexia faepe contagiofa; muci, ex glandulis membranae narium, faucium, vel bronchiorum, excretio aucta; faltem hujus excretionis molimina.

Catarrhus, S. G. 186. V. 98. *Sag.* G. 145.

Coryza, L. 174. V. 100. *Sag.* G. 196.

\* Ob eandem rationem qua haemorrhagias, profluvia etiam febrilia quaedam hic in classe pyrexiarum collocavi. Catarrhus quidem, pyrexia et diathesi phlogistica, phlegmasiis maxime affinis est; et dysenteria non solum pyrexia semper comitatur, sed in multis etiam a fluxibus aliis quibuscvis differt.

Rheuma, S. G. 142.

Tussis, S. G. 142. L. 155. V. 205. *Sag.* G. 245.  
255. *Junck.* 30.

Tussis catarrhalis et rheumatica, *Hoffm.* III. 109.

Genera sequentia ad hunc titulum referenda, plerumque symptomatica sunt.

Anacatharsis, S. G. 262. *Sag.* 198,

Expectoratio, L. 178.

Raucedo, L. 146.

Raucitas, V. 252.

Gravedo, L. 42.

Sp. 1. Catarrhus a frigore.

Catarrhus benignus, S. sp. 1.

Catarrhus pectoris, S. sp. 6.

Coryza catarrhalis, S. sp. 1.

Coryza phlegmatorrhagia, S. sp. 2. *Salmuth.*  
obs. cent. 1. 37. *Junck.* 28. *Morgagn.* de fed.  
XIV. 21.

Coryza febricosa, S. sp. 6.

Tussis catarrhalis, S. sp. 1. *N. Rosen* Diff. apud  
*Haller*, disput. pract. tom. II.

Rheuma catarrhale, S. sp. 1.

Amphimerina catarrhalis, S. sp. 2.



*Amphimerina tufficulosa*, S. sp. 13. ?

*Cephalalgia catarrhalis*, S. sp. 10.

Sp. 2. *Catarrhus a contagio*.

*Catarrhus epidemicus*, S. sp. 3.

*Rheuma epidemicum*, S. sp. 2.

*Synocha catarrhalis*, S. sp. 5.

Hujus exempla sunt,

Anno 1323. *Cronica meteorologica della Toscana*,  
apud *Targioni Tozzetti* Osservaz.  
Med. Raccolta I. pag. 175.

1328. Ibid.

1358. Ibid.

1387. Ibid.

*Valefcus de Taranta* apud *Morgagn*.  
de sedibus XIII. 4.

*Marchesi* ibid.

1510. *Valleriola* append. ad loc. com. cap. 2.

1575. *Valeriola*, ibid.

*Riverii* Obs. in biblioth. vet. repert.  
obs. IX.

*Foresti*, L. VI. obs. 1.

1580. *Haenischius* in *Aretacum*, pag. 315.  
396.

*Wieri*, Obs. L. II.

Anno 1580. *P. Sal. Diverfus*, de febre pestilenti,  
cap. XI.

*Forestus*, L. VI. obs. 3.

*Riverii* Obs. in biblioth. vet. repert.  
obs. X.

*Sennertus* de febre, L. IV. cap. 17.

1591. *Sennertus*, ibid.

*Pechlin*, L. II. Obs. 17.

1658. *Willis* de febribus, cap. 16.

1675. *Sydenham*, Sect. V. cap. 5.

*Raygerus* in Ephem. Germ. D. I. A.  
VI. et VII. obs. 213.

*P. de Sorbait*.

1679. *Sydenham*, Ep. resp. ad *R. Brady*.

*Zod. med. Gall. A. I. Decemb.* obs. 6.

1708. *Schroeckius* in Ephem. Germ. Cent. I.  
et II. in append. pag. 14.

1709. *Hoffm.* II. 47.

1712. *Camerarius* in Ephem. Germ. Cent.  
III. et IV. obs. 58.

*Schroeckius*, ibid. in append. pag. 26.

1729. et 1730. *Hoffm.* II. 109.

*G. Fr. Loew.* in append. ad A. N. C.  
vol. III.

*Scheuchzer*, Obs. meteorol. in app. ad  
A. N. C. vol. IV.

*Morgagni* de sed. et caus. XIII. 3. 4.

Anno 1729 et 1730. *Beccarius*, A. N. C. III. obf.  
48. pag. 142.

*Hillary* on weather and difeafes, pag.  
35.

*Winteringham*, Comm. Nofolog. pag.  
319.

*Rutty's* hift. of weather, pag. 17.

1732 et 1733. *Commerc. lit. Norimb.* 1733.  
pag. 6. 52. 108. 267.

*Detharding* de febr. Eyderoftad. apud  
*Halleri* difputat. praët. vol. V.

*Edin. Med. Eff.* vol. II. art. 2.

*Hillary* of weather, &c. pag. 47.

*Winteringham*, Comm. Nofolog. pag.  
354.

*Huxham* de aëre, &c. 1733. M. Febr.

*Rutty's* hift. of weather, pag. 30.

1737. Jan. *Rutty*, ibid. pag. 60.

Octob. *Rutty*, ibid. pag. 60.

Julio. *Comm. lit. Norimb.* 1737,  
pag. 347.

1742. 1743. *Comm. lit. Norimb.* 1743, pag.  
106. 188. 313. 336.

*Juch* et *Zuberbuhler* de febre catar-  
rhali, apud *Haller*. Disp. praët.  
tom. V.

*Huxham* de aëre, 1743. M. April.

*Rutty*, hift. of weather, p. 99.

# 176 GENERA MORBORUM

Anno 1742. 1743. *Targioni Tozzetti*. Raccolt. I. di  
osservaz. Med. pag. 176.

1748. *Gleghorn*, Minorca, pag. 132.

1758. *Rutty*, hist. of weather, pag. 211.

*Whytt*, Lond. Med. Obs. Vol. II. art.  
13.

1762. *Baker* de catarrho, Lond. 1764.

*Monro*, Dis. of mil. hosp. pag. 137.

1767. *Heberden*, Med. transact. art. 18.

1775.

Intercatarrhi, coryzae, et tussis species apud  
SAUVAGESIUM, symptomatice sunt,

Catarrhus rubeolofus, S. sp. 5.

Tussis exanthematica, S. sp. 20.

Coryza variolosa, S. sp. 4.

Coryza virulenta, S. sp. 3.

Coryza purulenta, S. sp. 5.

Tussis accidentalis, S. sp. 4.

Tussis gutturalis, S. sp. 8.

Tussis xerolaryngea, S. sp. 23.

Tussis verminosa, S. sp. 21.

Tussis ficca, S. sp. 3.

Tussis calculosa, S. sp. 22.

Tussis phthifica, S. sp. 17.

Tussis haemoptoica, S. sp. 15.

Tussis a polypo, S. sp. 16.

Tussis a dentitione, S. sp. 12.

Tussis stomachalis humida, S. sp. 6.

Tussis stomachalis sicca, S. sp. 7.

Tussis hysterica, S. sp. 2.

Tussis gravidarum, S. sp. 14.

Tussis hepatica, S. sp. 9.

Tussis rheumatica, S. sp. 13.

Tussis arthritica, S. sp. 19.

Tussis metallicolarum, S. sp. 4.

### XLIII. D Y S E N T E R I A.

Pyrexia contagiosa ; dejectiones frequentes, mucofae, vel sanguinolentae, retentis plerumque foecibus alvinis ; tormina ; tenesmus.

Dysenteria, S. G. 248. L. 191. V. 107. *Sag.* 183. *Hoffm.* III. 151. *Junck.* 76.

Non nisi speciem unicam novi cujus nomina apud SAUVAGESIUM sunt,

Dysenteria epidemica, S. sp. 6. *Sydenham*, sect. IV. cap. 3. *Helwich.* in hist. morb. Wratislav.

ad ann. 1699. *Degner.* de Dysenteria Neomagenſi 1736. *Huxham,* de aëre, &c. ad ann. 1743. *Cleghorn's* Minorca, chap. 5. *Grimm.* hiſt. dysenteriae malign. 1759, &c. in 'append. ad A. Nov. N. C. vol. III. *Baker* de catarrho et dysenteria, Lond. 1762. *Akenſide* de dysenteria, Lond. 1762. *Stark,* Hiſt. et ſeſtiones dysenteric. diſſ. inaug. L. B. 1766. *Zimmerman* von der Ruhr. *Zurich.* 1767.

Dysenteria caſtrenſis, S. ſp. 7. *Ramazzini* de morb. artific. cap. 40. Illuſt. *Pringle,* Diſ. of the army, pag. 224. Cl. *Monro,* Diſ. of mil. hoſpitals, pag. 57.

Dysenteria aequinoctialis, S. ſp. 14. *Bont.* de med. Ind. cap. 3.

Variat,

# 1. Vermibus comitata.

Dysenteria verminosa, S. ſp. 15. *Huxham* de aëre, &c. ad ann. 1743. M. *Màio.* III. *Pringle,* pag. 225. *Monro,* pag. 62.

# 2. Rejectis moleculis carnoſis, vel ſeba- ceis.

Dysenteria carnoſa, S. ſp. 16.

Diarrhoea carnofa, S. fp. 5. *Wedelius* Ephem.  
 Germ. D. II. A. II. obf. 182. *Wagner*,  
 ibid. D. II. A. III. obf. 187. cum fcholio  
*Schroeckii*. *Morgagn*. de fed. Ep. XXXI.  
 17—24. III. *Pringle*, pag. 237. *Monro*,  
 pag. 62.

### 3. Febre intermittente comitata.

Dysenteria intermittens, S. fp. 17. *Morton* in  
 append. ad Exerc. II. *Cleghorn's* Minorca, pag.  
 236. *Lautter*. hift. med. bienn. caf. 17. 20.

### 4. Sine fanguine.

Dysenteria alba, S. fp. 10. *Willis*, Pharm. rat.  
 P. I. Sect. III. cap. 3. *Sydenham*, Ed. Leid.  
 pag. 179. *Morgagn*. de fed. Ep. XXXI. II.  
 III. *Pringle*, pag. 225. Cl. *Monro*, pag. 61.  
*Roederer* de morbo mucofo, Gotting. 1762.

### 5. Miliaria comitata.

Dysenteria miliaris Gruberi, S. fp. 2. Febris  
 exanthematico-dysenterica Tiguri epidemica,  
 1747.



Symptomaticae sunt,

Dysenteria benigna spontanea, S. sp. 1.

Dysenteria catamenialis, S. sp. 2.

Dysenteria gravidarum. S. sp. 4.

Dysenteria atrabilaria, S. sp. 5.

Dysenteria syphilitica, S. sp. 13.

Dysenteria scorbutica, S. sp. 18.

Dysenteria Polonica, S. sp. 19.

Dysenteria a mesenterii vomica, S. sp. 14.

Ad diarrhoeam pertinent,

Dysenteria Parisiaca, S. sp. 3.

Dysenteria a catharticiis, S. sp. 12.

## CL. II. NEUROSES\*.

Sensus et motus laesi, sine pyrexia idiopathica, et sine morbo locali.

\* A tempore celbris quondam apud Anglos medici THOMÆ WILLIS, morbos quosdam ab aliis quibuscvis, sub nomine Nervosorum, distinxerunt Britanni; sed, ni fallor, parum accurate, dum affectiones hystericas et hypochondriacas fere solas sub nomine Nervosarum indigitarunt. Quantum ego quidem video, motus morborum fere omnes a motibus in systemate nervorum ita pendent, ut morbi fere omnes quodammodo Nervosi dici queant. Inter eos tamen distinctionem satis commode adhibere licet, et morbi isti qui nervorum systema fere solum, vel saltem primario, neque simul vel sanguinis circuitum, vel humorum naturam, nisi secundario afficiunt, Nervosi a nobis dicendi sunt. Classem itaque tam a classe pyrexiarum, quam a classe cachexiarum diversam, sub nomine Nervosum recte instituisse mihi videor.

## O. I. COMATA.

Motus voluntarii imminuti cum sopore si-  
ve sensuum feriatiōe.

Comata, S. Cl. VI. O. II. *Sag.* Cl. IX. O. V.

Soporosi, L. Cl. VI. O. II.

Adynamiae, V. Cl. VI.

Nervorum resolutiones, *Hoffm.* III. 194.

Affectus soporosi, *Hoffm.* III. 209.

Motuum vitalium defectus, *Junck.* 114.

## G. XLIV. APOPLEXIA.

Motus voluntarii fere omnes imminuti,  
cum sopore \*, plus minus profundo,  
superstite motu cordis et arteriarum.

Apoplexia, S. G. 182. L. 101. V. 229. *Boerh.*  
1007. *Junck.* 117. *Sag.* G. 288. *Wepfer.* hist.  
apoplecticorum.

\* Apud LINNAEUM vocabulum Sopor, tam  
pro motuum, quam pro sensuum feriatiōe ponitur;  
sed sensu vulgari, tantum pro somno, vel pro statu  
somno simili, eodem utimur.

Carus, S. G. 181. L. 100. V. 231. *Boerb.* 1045.

*Sag.* G. 287 \*.

Cataphora, S. G. 180. L. 99. V. 232. *Boerb.*

1048. *Sag.* G. 286.

Coma, V. 232. *Boerb.* 1048.

Haemorrhagia cerebri, *Hoffm.* II. 240.

Ad hoc genus pertinere mihi videntur,

Catalepsis, S. G. 176. L. 129. V. 230. *Sag.* G.

281. *Boerb.* 1036. *Junck.* 44.

Affectus cerebri spasmodico-ecstaticus, *Hoffm.* III.

44.

Ecstasis, S. G. 177. V. 333. *Sag.* G. 283.

Symptomaticæ esse videntur,

Typhomania, S. G. 178. L. 97. V. 23. *Sag.* G.

284.

Lethargus, S. G. 179. L. 98. V. 22. *Sag.* G.

285.

\* Cum genera *carus*, &c. hic subjuncta non nisi a-  
poplexiae leviores esse videntur, nec vel respiratione  
vel excitatione satis accurate distinguenda sint, ad  
unum genus omnia referenda esse censui.

Apoplexiae idiopathicae species sunt,

1. Apoplexia (*sanguinea*) cum signis plethorae universalis, et praecipue capitis.

Apoplexia sanguinea, S. sp. 1. *Morgagn.* de causis, &c. II. III. LX. *Preysinger*, sp. 1.

Carus spontaneus, S. sp. 2. *Boerb.* 1045.

Asphyxia \* spinalis, *Du Hamel*, Hist. Acad. ann. 1688. cap. 2. *Boerb.* Praelect. ad Instit. 401.

*Morgagn.* de caus. &c. III. 3.

Cataphora coma, S. sp. 2.

\* Genus *asphyxiae* ad *syncopen* olim retuli, et ejusdem species quasdam non nisi gradu a syncope differre, adhuc censeo. Plures vero asphyxiae species ad apoplexiae genus pertinere olim et nunc etiam persuasum habeo; ideoque eas hic recensui. Asphyxia spinalis quidem hic apposita, utpote signis nullis externis dignoscenda, male inter species recensetur; si vero ad causas internas unquam respicere liceret, certe inter apoplexiae species recensenda esset. Cum autem ad causas externas et evidentes omnino respicere liceat, ab his satis perspectis plures asphyxiae species a SAUVAGESIO recensitas inter apoplexiae spe-

2. Apoplexia (*serosa*) in corpore, plerumque fenum, leucophlegmatico.

Apoplexia pituitosa, S. sp. 7. Apoplexia serosa, *Preysinger*, Sp. 4. *Morg.* de causis, &c. IV. LX.

Carus a hydrocephalo, S. sp. 16.

Cataphora hydrocephalica, S. sp. 6.

Cataphora somnolentia, S. sp. 1.

Lethargus literatorum, S. sp. 7. *Van Swieten* in aph. 1010. 2 γ. et 3 α.

species enumeravi ; nec huic obstare velim quod, in quibusdam asphyxiae speciebus, tum pulsus arteriarum tum respiratio, vita etiam superstita, tandem penitus cessant; nam in harum plerisque sub initio, cum motus et sensus fere penitus abolentur, superest adhuc motus quidam tum cordis tum pulmonum; et h tandem omnino cessant, idem aliquando apoplecticis ante mortem accidit. In apoplexia porro, cerebrum, in syncope autem cor, primario affectum esse opinor; et asphyxiae species itaque, prout cerebri vel cor primario afficiant, quatenus id fieri, ex causis earum externis, conjicere liceat, ad apoplexiae vel syncopes genus refero.

3. Apoplexia (*hydrocephalica* \*) paulatim adoriens; infantes et impuberes, primum lassitudine, febricula et dolore capitis, dein pulsu tardiore, pupillae dilatatione, et somnolentia afficiens.

Hydrocephalus interior, S. sp. 1.

Hydrocephalus internus, *Whytt's Works*, pag. 725. *London Med. Observ.* Vol. IV. art. 3. 6. and 25. *Gaudelius* de hydrocephalo, apud *Sandisfort* Thesaur. Vol. II.

Hydrocephalus acutus, *Quin*, *Diff. de hydrocephalo*, 1779.

Asthenia a hydrocephalo, S. sp. 3.

\* In opere nosologico, morbos qui sub suo decursu variam induunt formam, rite collocare, ideoque apoplexiae hydrocephalicae locum maxime idoneum assignare, difficile est. Hunc morbum autem sub apoplexiae potius quam hydrocephali titulo ponere vellem; primo, quia hydrocephalus, qui hic subest, nequaquam sensibus evidens est; dein quia hic morbus symptomatis ab hydrocephalo evidente plurimum differt; denique, quia causa proxima et tandem symptomatis, apoplexiae quam maxime affinis est.



4. Apoplexia (*atrabilaria*) in corpore melancholico.

Apoplexia atrabilaria, S. fp. 12. *Preysinger*, Sp. 6.

5. Apoplexia (*traumatica*) a vi. externa mechanica, capiti illata.

Apoplexia traumatica, S. fp. 2.

Carus traumaticus, S. fp. 5.

6. Apoplexia (*venenata*) a potentiis fedantibus interne vel externe adhibitis.

Apoplexia temulenta, S. fp. 3.

Carus a narcoticis, S. fp. 14.

Lethargus a narcoticis, S. fp. 3.

Carus a plumbagine, S. fp. 10.

Apoplexia mephitica, S. fp. 14.

Asphyxia a mephitide, S. fp. 9.

Asphyxia a musto, S. fp. 3.

Catalepsis a fumo, S. fp. 3.

Asphyxia a fumis, S. fp. 2.

Asphyxia a carbone, S. fp. 16.

Asphyxia foricariorum, S. fp. 11.

Asphyxia fideratorum, S. sp. 10.

Carus ab infolatione, S. sp. 12.

Carus a frigore, S. sp. 15.

Lethargus a frigore, S. sp. 6.

Asphyxia congelatorum, S. sp. 5.

7. Apoplexia (*mentalis*) a pathemate mentis.

Carus a pathemate, S. sp. 11.

Asphyxia a pathemate, S. sp. 7.

Ecstasis catoche, S. sp. 1.

Ecstasis resoluta, S. sp. 2.

8. Apoplexia (*cataleptica*\*) musculis, sub artuum a vi externa motu, contractilibus.

\* Catalepsin nisi simulatam ipse nunquam vidi, et ab aliis visam frequenter simulatam fuisse credo. De morbo itaque rarius viso, varie descripto, et saepe prorsus simulato, pro certo statuere mihi vix liceret; sed genere ab apoplexia neutiquam diversum esse, bene persuasus sum; ideoque hic inter apoplexiae species collocavi.

Catalepsis, S. G. 176. L. 129. V. 230. Sag. G.  
281. Boerh. 1036. Junck. 44.

Species apud SAUVAGESIUM sunt,

- Catalepsis hysterica, S. sp. 1.
- verminosa, S. sp. 2.
- a fumo, S. sp. 3.
- a menostasia, S. sp. 4.
- melancholica, S. sp. 5.
- delirans, S. sp. 6.

9. Apoplexia (*suffocata*) a potentia externa suffocante.

Asphyxia suspenforum, S. sp. 4.

Asphyxia immerforum, S. sp. 1.

Asphyxia flatulenta, S. sp. 12. ad apoplexiae genus pertinet, si a signis externis dignosci possit.

Apoplexia saepe symptomatrica est,

1. Febris intermittens.

Apoplexia febricosa, S. sp. 9.

Carus febricosus, S. sp. 3.

Cataphora timor, S. sp. 8

Typhomania febricosa, S. sp. 1.

Catalepsis quartanaria, S. sp. 7.

## 2. Febris continuæ.

Carus febrilis, S. sp. 2.

Typhomania continua, S. sp. 2.

Typhomania agrypnocoma, S. sp. 3.

Lethargus a febre, S. sp. 1.

## 3. Phlegmasiæ.

Apoplexia inflammatoria, S. sp. 13.

Lethargus cephaliticus, S. sp. 4.

Lethargus pulmonicus, S. sp. 2.

## 4. Exanthematis.

Carus variolosus, S. sp. 8.

Apoplexia metastatica, S. sp. 6.

Carus exanthematicus, S. sp. 18.

Cataphora exanthematica, S. sp. 5.

## 5. Hysteriæ.

Apoplexia hysterica, S. sp. 4.

*Carus hystericus*, S. sp. 9.

*Asphyxia hystERICA*, S. sp. 8.

*Carus myrtagmus*, S. sp. 17.

*Carus hypochondriacus*, S. sp. 13.

## 6. Epilepsiae.

*Apoplexia epileptica*, S. sp. 8.

*Apoplexia suspiriofa*, S. sp. 10.

## 7. Podagrae.

*Apoplexia arthritica*, S. sp. 5.

*Carus arthriticus*, S. sp. 6.

*Cataphora arthritica*, S. sp. 4.

*Lethargus arthriticus*, S. sp. 5.

## 8. Vermium.

*Apoplexia verminosa*, S. sp. 15.

*Carus verminofus*, S. sp. 7.

*Typhomania verminosa*, S. sp. 4.

## 9. Ischuriae.

*Carus Ischuriosus*, S. sp. 4.

## 10. Scorbuti.

Cataphora scorbutica, S. sp. 3.

## G. XLIII. PARALYSIS:

Motus voluntarii nonnulli tantum immi-  
nuti, saepe cum sopore.

Paralyfis, *Boerh.* 1057.

Hemiplegia, S. G. 170. L. 103. V. 228.

Paraplexia, S. G. 171.

Paraplegia, L. 102. V. 227.

Paralyfis, S. G. 169. L. 104. V. 226. *Junck.* 115.

Atonia, L. 120.

## I. Species idiopathicae sunt,

1. Paralyfis (*partialis*) quorundam musculorum tantum.

Paralyfis, S. G. 169. L. 104. V. 226. *Junck.*  
115.

Paralyfis plethorica, S. sp. 1.

Paralyfis serosa, S. sp. 12.

Paralyfis nervea, S. sp. 11.

Mutitas a glossolyti, S. sp. 1.

Aphonia paralytica, S. sp. 8.

## 2. Paralyfis (*hemiplegica*) alterius corporis lateris.

Hemiplegia, S. G. 170. L. 103. V. 228. *Sag.*  
G. 276.

Variat ratione habitus corporis.

### a. Hemiplegia in habitu plethorico.

Hemiplegia ex apoplexia, S. sp. 7.

Hemiplegia spasmodica, S. sp. 2.

### b. Hemiplegia in habitu leucophlegmatico.

Hemiplegia serosa, S. sp. 10.

Male recensetur

Hemiplegia apostematodes, S. sp. 11

Quae signis externis dignosci non potest, et

Hemiplegia ex epilepsia, S. sp. 12.

Recenseri vix meretur.

B b



3. Paralyſis (*paraplegica*) dimidii corporis tranſverſim ſumpti.

Paraplexia, S. G. 171. *Sag.* G. 277.

Paraplegia, L. 102. V. 227.

Paraplexia fanguinea, S. ſp. 2.

Paraplexia a ſpina bifida, S. ſp. 3.

Paraplexia rheumatica, S. ſp. 1.

4. Paralyſis (*venenata*) a potentiis ſedan-  
tibus externe vel interne adhibitis.

Paralyſis metallariorum, S. ſp. 22.

Hemiplegia faturnina, S. ſp. 14.

## II. Species ſymptomaticae ſunt,

Hemiplegia intermittens, S. ſp. 8.

Paraplegia intermittens, S. ſp. 6.

Paralyſis febrilis, S. ſp. 8.

Hemiplegia exanthematica, S. ſp. 6.

Paralyſis rheumatica, S. ſp. 3.

Hemiplegia arthritica, S. ſp. 5.

Paralyſis rachialgica, S. ſp. 2.

Paraplegia rachialgica, S. ſp. 5.

Paralyſis bilioſa, S. ſp. 9.

Hemiplegia transversa, S. sp. 1.

Paralyfis scorbutica, S. sp. 6.

Paralyfis scrophulosa, S. sp. 5.

Hemiplegia scrophulosa, S. sp. 4.

Hemiplegia syphilitica, S. sp. 3.

Paraplegia syphilitica, S. sp. 7.

Paralyfis Polonica, S. sp. 7.

Paralyfis a vomica, S. sp. 10.

Paralyfis traumatica, S. sp. 4.

Hemiplegia traumatica, S. sp. 9.

Paraplegia traumatica, S. sp. 4.

Tremorem, utpote semper symptomaticum, in numerum generum recipere nollem; species autem a SAUVAGESIO recensitas, prout mihi vel Astheniae vel Paralyfios, vel convulsionis symptomata esse videntur, hic subjungam.

## T R E M O R.

Artus alterna, per itus et reditus frequentes, motitatio.

Tremor, S. G. 129. L. 139. V. 184. Sag. 236.

## 1. Species asthenicae,

Tremor a debilitate, S. sp. 1.

Tremor senilis, S. sp. 2.

Tremor a coffea, S. sp. 4.

Tremor a pathemate, metu, ira, gaudio, libidine,  
S. sp. 14.

Tremor typhodes, S. sp. 19.

## 2. Species paralyticae,

Tremor paralytodes, S. sp. 11.

Tremor vertiginosus, S. sp. 7.

Tremor a plethora, S. sp. 13.

Tremor a faburra, S. sp. 12.

Tremor a hydrocephalo, S. sp. 8.

Tremor scorbuticus, S. sp. 10.

Tremor rheumatismalis, S. sp. 18.

Tremor temulentus, S. sp. 3.

Tremor metallurgorum, S. sp. 5.

Tremor traumaticus, S. sp. 17.

## 3. Species convulsivae.

Tremor coactus, S. sp. 6.

Tremor tendinum, S. sp. 9.

Tremor palpitans, S. sp. 16.

## O. II. A D Y N A M I Æ.

Motus involuntarii, five vitales five naturales, imminuti.

Adynamiae, V. Cl. VI.

Defectivi, L. Cl. VI. O. I.

Leipopsychiae, S. Cl. VI. O. IV. *Sag.* Cl. IX.  
O. IV.

## G. XLIV. S Y N C O P E.

Motus cordis imminutus, vel aliquamdiu quiescens.

Syncope, S. G. 174. S. 94. V. 274. *Sag.* 280  
*Junck.* 119.

Leipothymia, S. G. 173. L. 93. V. 273. *Sag.*  
279.

Asphyxia, S. G. 175. L. 95. V. 275. *Sag.* 281.

Virium lapsus et animi deliquia, *Hoffm.* III. 267.

## I. Idiopathicae.

1. Syncope (*cardiaca*) sine causa manifesta saepe rediens, cum palpitatione cordis vehementi in intervallis: *Ex vitio cordis vel vasorum vicinorum.*

Syncope plethorica, S. sp. 5. *Senac*, Tr. de coeur, p. 540.

Syncope a cordiogmo, S. sp. 7. *Senac*, de coeur, 414. *Morgagn.* de sed. XXV. 2. 3. 10.

Syncope a polypo, S. sp. 8. *Senac*, p. 471.

Syncope ab hydrocardia, S. sp. 12. *Senac*, 533. *Schreiber Almag.* L. III. § 196.

Syncope *Lanzoni*, S. sp. 18. *Lanzon.* Op. II. p. 462.

Asphyxia Valsalviana, S. sp. 13.

2. Syncope (*occasionalis*) a causa manifesta oriens: *Ex affectione totius systematis.*

Leipothymia a pathemate, S. sp. 1. *Senac*, p. 544.

Syncope pathetica, S. sp. 21.

Asphyxiae a pathemate, S. sp. 7.

Syncope ab antipathia, S. sp. 9. *Senac*, p. 554.

- Syncope a veneno, S. sp. 10. *Senac*, p. 546.  
 Syncope ab apostematis, S. sp. 11. *Senac*, p. 554.  
 Syncope a sphacelo, S. sp. 14. *Senac*, p. 553.  
 Syncope ab inanitione, S. sp. 1. *Senac*, p. 536.  
 Syncope a phlebotomia, S. sp. 4.  
 Syncope a dolore, S. sp. 2. *Senac*, p. 583.  
 Asphyxia traumatica, S. sp. 14  
 Asphyxia neophytorum, S. sp. 17.

## II. Symptomaticae, five symptomata morborum vel totius systematis, vel aliarum praeter cor partium.

- Syncope febrilis, S. sp. 3. *Senac*, p. 548.  
 Syncope febricosa, S. sp. 17. *Torti Therap. spec.*  
 L. III. cap. 1.

- Syncope exanthematica, S. sp. 19.  
 Syncope metastatica, S. sp. 20.  
 Leipothymia stomachica, S. sp. 2.  
 Syncope stomachica, S. sp. 13. *Senac*, p. 545.  
 Syncope hysterica, S. sp. 6. *Senac*, p. 547.  
 Syncope arthritica, S. sp. 16. *Musgrave de arthr.*  
 anomala, cap. 8.  
 Syncope scorbutica, S. sp. 15. *Lind de scorbuto*,  
 P. II. cap. 11. *Senac*, p. 552.

## G. XLV. DYSPEPSIA.

Anorexia, nausea, vomitus, inflatio, ructus, ruminatio, cardialgia, gastrodynia, pauciora faltem vel plura horum simul concurrentia, plerumque cum alvo adstricta, et sine alio vel ventriculi ipsius, vel aliarum partium morbo.

Dyspepsia, V. 277.

Apepsia, V. 276.

Diaphora, V. 278.

Anorexia, S. G. 162. L. 116. *Sag.* G. 268.

Cardialgia, S. G. 202. L. 48. V. 157. *Sag.* G. 160.

Gastrodynia, S. G. 203. *Sag.* G. 161.

Soda, L. 47. V. 161.

Nausea, S. G. 250. L. 182. V. 159. *Sag.* G. 185.

Vomitus, S. G. 251. L. 183. V. 214. *Sag.* G. 186.

Flatulentia, S. G. 271. L. 165. V. 127. *Sag.* G. 207.

## I. Idiopathicae.

Anorexia pituituosa, S. sp. 2.

Anorexia a saburra, S. sp. 9.



Anorexia exhaustorum, S. sp. 8.

Anorexia paralytica, S. sp. 1

Nausea ex cacochylia, S. sp. 11.

Vomitum pituitosum, S. sp. 26.

Vomitum ruminatio, S. sp. 6.

Vomitum a saburra, S. sp. 2.

Vomitum a crapula, S. sp. 1.

Vomitum lacteus, S. sp. 3.

Flatulentia infantilis, S. sp. 5.

Flatulentia acida, S. sp. 1.

Flatulentia nidorosa, S. sp. 2.

Cardialgia bradypeptæ, S. sp. 9.

Cardialgia a saburra, S. sp. 2.

Cardialgia lactantium, S. sp. 11.

Cardialgia flatulenta, S. sp. 3.

Cardialgia paralytica, S. sp. 7.

Gastrodynia saburræ, S. sp. 1.

Gastrodynia flatulenta, S. sp. 2.

Gastrodynia periodynia, S. sp. 7.

Gastrodynia astringens, S. sp. 9.

Gastrodynia atterens, S. sp. 10.

Gastrodynia a frigore, S. sp. 18.

## II. Symptomaticae,

## I. A morbo ipsius ventriculi.

Cardialgia schirrosa, S. sp. 6.

Vomitus a pyloro calloso, S. sp. 8.

Vomitus a steatmate ventriculi, S. sp. 11.

Nausea ab apostemate circa cardiam, S. sp. 9.

Gastrodynia ulcerosa, S. sp. 5.

Vomitus ab ulcere ventriculi, S. sp. 10.

Cardialgia a veneno, S. sp. 2.

Gastrodynia a veneno, S. sp. 4.

Vomitus a veneno, S. sp. 7.

Flatulentia accidentalis, S. sp. 4.

Gastrodynia a peregrinis, S. sp. 11.

Anorexia biliosa, S. sp. 6.

Nausea biliosa, S. sp. 6.

Gastrodynia biliosa, S. sp. 3.

Vomitus urinosus, S. sp. 2.

Gastrodynia calculosa, S. sp. 8.

Vomitus bezoarticus, S. sp. 13.

Cardialgia verminosa, S. sp. 10.

Nausea a taenia, S. sp. 1.

Vomitus verminosus, S. fp. 5.

Gastrodynia a xiphoide, S. fp. 12.

Gastrodynia Americana, S. fp. 6.

Nausea ex compresso ventriculo, S. fp. 5.

Vomitus a cartilagine xiphoidea, S. fp. 22.

Vomitus ab oesophago obstructo, S. fp. 21.

Gastrodynia gastrocelica, S. fp. 20.

Nausea ex gastrocele, S. fp. 4.

Vomitus gastrocelicus, S. fp. 18.

Cardialgia sputatoria, S. fp. 5.

Cardialgia inflammatoria, S. fp. 13.

Nausea ex gastritide, S. fp. 10.

Vomitus gastriticus, S. fp. 19.

## 2, A morbo aliarum partium vel totius corporis.

Vomitus cephalalgicus, S. fp. 23.

Vomitus a dentitione, S. fp. 4.

Vomitus iliacus, S. fp. 24.

Nausea ex pancreatis schirro, S. fp. 3.

Vomitus a pancreate, S. fp. 17.

Vomitus ab hepate obstructo, S. fp. 16.

Anorexia melancholica, S. fp. 5.

Gastrodynia hypochondriaca, S. fp. 16.

Flatulentia hypochondriaca, S. fp. 3.

- Flatulentia convulsiva, S. sp. 7.  
 Vomitus hypochondriacus, S. sp. 6.  
 Vomitus atrabilarius, S. sp. 15.  
 Anorexia mirabilis, S. sp. 10.  
 Gastrodynia hysterica, S. sp. 14.  
 Gastrodynia pulsatilis, S. sp. 13.  
 Gastrodynia chlorotica, S. sp. 15.  
 Nausea a semine corrupto, S. sp. 8.  
 Nausea gravidarum, S. sp. 2.  
 Vomitus gravidarum, S. sp. 12.  
 Flatulentia lochialis, S. sp. 6.  
 Anorexia arthritica, S. sp. 12.  
 Cardialgia arthritica, S. sp. 8.  
 Nausea nephritica, S. sp. 7.  
 Vomitus nephriticus, S. sp. 20.  
 Anorexia Stewartiana, S. sp. 13.  
 Cardialgia a cardiogmo, S. sp. 12.  
 Anorexia plethorica, S. sp. 3.  
 Anorexia cachectarum, S. sp. 7.  
 Anorexia febrilis, S. sp. 4.  
 Cardialgia febricosa, S. sp. 4.  
 Gastrodynia febricosa, S. sp. 17.  
 Vomitus febricosus, S. sp. 29.  
 Vomitus rabiosus, S. sp. 14.  
 Vomitus haemorrhagicus, S. sp. 28.  
 Gastrodynia metastatica, S. sp. 19.  
 Nausea marina, S. sp. 12.

Vomitus marinus, S. sp. 25.

Anorexia neophytorum, S. sp. 11.

## G. XLVI. HYPOCHONDRIASIS.

Dyspepsia cum languore, moestitia, et metu,  
ex causis non aequis, in temperamento  
melancholico.

Hypochondriasis, S. G. 220. L. 76. V. 218. *Sag.*  
332.

Morbus hypochondriacus, *Boerb.* 1098.

- Malum hypochondriacum, *Heffm.* III. 64. *Junk.*  
36.

Speciem idiopathicam unicam tantum novi.

Hypochondriasis melancholica, S. sp. 3.

De Hypochondriasi algida, S. sp. 10. mihi  
non liquet.

Species sequentes ex FRAECASSINO, ex  
theoria parum certa confictae, mihi  
videntur.

Hypochondriasis biliosa, S. sp. 1.

Hypochondriasis sanguinea, S. sp. 2.

Hypochondriasis pituitosa, S. sp. 4.

Symptomaticae sunt,

Hypochondriasis hysterica, S. sp. 5.

Hypochondriasis phthastica, S. sp. 6.

Hypochondriasis asthmatica, S. sp. 7.

Hypochondriasis calculosa, S. sp. 8.

Hypochondriasis tympanitica, S. sp. 9.

## G. XLVII. CHLOROSIS.

Dyspepsia, vel rei non esculentae desiderium ; cutis pallor vel decoloratio ; venae minus plenae, corporis tumor molli ; asthenia ; palpitatio ; menstruorum \* retentio.

Chlorosis, S. G. 309. L. 222. V. 305. *Sag.* G. 135.

*Boerh.* 1285. *Hoffm.* III. 311. *Junck.* 86.

\* In hoc caractere antea dixi menstruorum  
*saepe* retentio ; quali species chlorosis esset in qua  
menfes

Chloroseos unicam speciem veram agnoscimus, scilicet,

Chlorosis virginea, S. sp. 1.

a. Chlorosis amatoria.

Caeterae SAUVAGESII species spuriae, sive decolorationes, symptomatae sunt.

Chlorosis a menorrhagia, S. sp. 2.

Chlorosis gravidarum, S. sp. 3.

Chlorosis infantum, S. sp. 4.

Chlorosis verminosa, S. sp. 5.

Chlorosis viridis, S. sp. 6.

menfes rite fluxerunt, et cogitavi de specie quadam cachexiae huc referenda. Sed nunc dubito an species cachexiae quaevis sub titulo Chlorosis, vel sub charactere hic dato, recte poni possit; et nullam chlorosis speciem veram, praeter illam quae retentionem menstruorum comitatur, agnoscere vellem. Hinc vocabulum *saepe* in charactere nunc omissum est; sed simul fateri cogor, chlorosin ideo hic minus recte pro genere recensitam esse, cum pro symptomate amenorrhoeae semper haberi possit.



*Chlorosis* ab hydrothorace, S. sp. 7.

*Chlorosis* maculosa, S. sp. 7.

*Chlorosis* Carthagenica, S. sp. 10.

*Chlorosis* Bengualensis, S. sp. 11.

*Chlorosis* rachialgica, S. sp. 12.

## O. III. S P A S M I.

Musculorum vel fibrarum muscularium  
motus abnormes \*.

Spasmi, S. Cl. IV. V. Cl. V. *Sag.* Cl. VII.

Motorii, L. Cl. VII.

Morbi spasmodici et convulsivi, *Hoffm.* III. 9.

Spasmi et convulsiones, *Junck.* 45. 54.

Epilepsia, *Boerh.* 1071. 1088.

SECT. I. In functionibus animalibus.

## G. XLVIII. T E T A N U S.

Totius fere corporis rigiditas spastica.

Tetanus, S. G. 122. L. 127. V. 180. *Sag.* G.  
228.

\* Motus abnormes sunt qui ex causa praeternaturali  
oriuntur, et qui violentia, frequentia, vel diuturni-  
tate

Catochus \*, S. G. 123. L. 128. V. 183. *Sag. G.*  
229.

Opisthotonos, V. 181.

Episthotonos, V. 182.

Hujus species, ut solet, plures recensuit SAUVAGESIUS ; sed omnes, quae idiopathicae dici queunt, ad unam, ni fallor, referri possunt, et cujus forma praecipua apud SAUVAGESIUM appellatur

Tetanus Indicus, S. S. 5. de quo plura haberi possunt apud *Hillary*, Barbadoes, p. 219. *Chalmers*, Lond. Med. Obs. Vol. I. Art. 12. *D. Monro*,

tate contractionis praeter modum fiunt ; et nullus dubito quin hujusmodi motus, in morbis omnibus sub hoc ordine a nobis collocatis, revera fiunt ; plures licet morbi sint, quam sub eodem ordine ab aliis nosologis recensiti fuerunt.

\* Catochus apud SAUVAGESIUM genus est minime naturale, cum genus illud conjunxerit species natura prorsus diversas ; ideoque ejusmodi genus omisi, sed species sub eo recensitas, quae a rigiditate spastica pendeant, ad tetani genus huc retuli.

*Monro*, Edinb. Phys. et Liter. Essays, Vol. III.  
 Art. 30. *A. Monro*, Art. 31. et sub nomine  
 spasmi apud *Bontium* de med. Ind. meth. med.  
 cap. 2.

Necalius morbus est,

Convulsio Indica, S. sp. 9.

Variat autem Tetanus ratione causae re-  
 motae, quatenus nimirum vel a causa  
 interna, vel a frigore, vel a vulnere  
 oriatur. A vulnere, varietas frequen-  
 tissima apud SAUVAGESIUM appella-  
 tur

Tetanus traumaticus, S. sp. 11.

Variat etiam quavis causa ortus Tetanus  
 ratione partis corporis affectae ; hinc

Tetanus tonicus, S. sp. 1.

Tetanus holotonicus, S. sp. 4.

Catochus holotonicus, S. sp. 1. *M. Febr.* in E-  
 phem German. D. II. A. I. Obs. 1.

Catochus cervinus, S. sp. 2. *Stork.* Ann. Med.  
 1758. *M. Julio.*

Tetanus opisthotonicus, S. sp. 3.

Tetanus emprosthotonicus, S. sp. 2.

Tetani species symptomaticae sunt,

Tetanus febricosus, S. sp. 10. *Stork. Ann. Med.*  
759. p. 166.

Tetanus hemiplegicus, S. sp. 9.

Tetanus lateralis \*, S. sp. 6. *Morgagn. de caus.*  
et fed. X. 2. et 3.

Tetanus syphiliticus, S. sp. 7.

Tetanus verminosus, S. sp. 8.

Tetanus hystericus, S. sp. 12.

Tetanus mirandus, S. sp. 13.

Catochus diurnus, S. sp. 6.

## G. XLIX.   T R I S M U S.

Maxillae inferioris rigiditas spastica.

Trismus, S. G. 117. L. 124. *Sag. G.* 223.

Capitulum, V. 208.

\* In exemplo Tetani lateralis quod profert SAUVAGESIUS, adfuit in eodem aegro alterius lateris paralyfis; ideoque hic mox post Tetanum hemiplegicum posui; sed si Tetani lateralis exemplum a MORGAGNIO allatum, sine alterius lateris paralyfi fuit, de quo tamen mihi non constat, idem inter varietates idiopathicas recenseri potuisset.

## I. Species verae sunt,

1. Trismus (*nascentium*) infantes intra duas primas a nativitate septimanas corripens.

Trismus nascentium, S. sp. 1. *Heister*, Comp. med. pract. cap. XV. § 10. *Cleghorn's* Minorca, Introduct. p. 33. *Hofser*. in Act. Helvet. tom. I. p. 65.

2. Trismus (*traumaticus*) omnium aetatum, a vulnere vel frigore.

Trismus traumaticus, S. sp. 2. *Lond. Med. Obs.* Vol. I. Art. 1. 7. Vol. II. 34. Vol. III. 31. Vol. IV. 7.

Angina spasmodica, S. sp. 18. *Zwingeri* act. Helvet. tom. III. p. 319.

Convulsio a nervi punctura, S. sp. 2.

Trismus catarrhalis, S. sp. 15. *Hillary's* Barbadoes, 221. *Lond. Med. Obs.* vol. IV. 7.

- II. Sequentes apud SAUVAGESIUM Trismi species, spurias, vel falsas dicimus ; vel quod non a spasmō, sed ab alio mus-

culorum vitio pendeant, vel quod convulsivae potius quam spasmodicae sint, vel, denique, quod faciei potius quam maxillae inferioris, musculorum affectiones sint.

Trismus inflammatorius, S. sp. 3.

Trismus scorbuticus, S. sp. 4.

Trismus capistratus, S. sp. 11.

Trismus arthriticus, S. sp. 9.

Trismus verminosus, S. sp. 5.

Trismus hypochondriacus, S. sp. 8.

Trismus febrilis, S. sp. 10.

Trismus crepitans, S. sp. 7.

Trismus occipitalis, S. sp. 12.

Trismus maxillaris, S. sp. 13.

Trismus dolorificus, S. sp. 14.

Trismus cynicus, S. sp. 16.

Trismus cynogelos, S. sp. 17.

Trismus fardonicus, S. sp. 18.

Trismus diastrophe, S. sp. 19.



## G. L. CONVULSIO.

Musculorum contractio clonica, abnormis,  
citra soporem.

Convulsio, S. G. 128. L. 142. V. 191. *Sag.* G.

235.

## I. Idiopathicae.

Convulsio universalis, S. sp. 11.

Hieranosos, L. 144. V. 190.

Convulsio habitualis, S. sp. 12.

Convulsio intermittens, S. sp. 16.

Convulsio hemitotonos, S. sp. 15.

Convulsio abdominis, S. sp. 10.

Convulsio ab inanitione, S. sp. 1.

Convulsio ab onanismo, S. sp. 13.

Scelotyrbe festinans, S. sp. 2.

## II. Symptomaticae.

Convulsio a capitis ictu, S. sp. 4.

Convulsio nephralgica, S. sp. 6.

Convulsio gravidarum, S. sp. 14.

Scelotyrbe verminosa, S. sp. 5.

Convulsio febrilis, S. sp. 3.

## G. LI. CHOREA\*.

Impuberes utriusque sexus, ut plurimum intra decimum et decimum quartum aetatis annum adorientes, motus convulsivi ex parte voluntarii, plerumque alterius lateris, in brachiōrum et manuum motu, histrionum gesticulationes referentes; in gressu, pedem alterum saepius trahentes quam attollentes.

Scelotyrbe, S. G. 136. *Sag.* G. 243.

Chorea, L. 139.

Speciem unam tantum videre mihi contigit, quae apud SAUVAGESIUM audit

Scelotyrbe chorea Viti, S. sp. 1

Chorea St. Viti *Sydenham.* Sched. monitoria.

\* In priore hujus libri editione, Choream pro convulsionis specie habui; cum autem ratione tum aetatis quam adoritur, tum motuum quos exhibet, a quavis alia convulsionis specie plurimum differat, hic pro genere diverso posui.

Nec alia est,

Scelotyrbe instabilis, S. sp. 3. et fortassis

Scelotyrbe intermittens, S. sp. 4.

## G. LII. R A P H A N I A.

Articulorum contractio spastica, cum agitatione convulsiva, dolore violentissimo, periodico.

Raphania, L. 145, V. 193. *Linn. Amoen. acad.*  
Vol. VI.

Convulsio raphania, S. sp. 7.

## Germanis DER KRIEBEL KRANKHEIT.

Eclampsia typhodes, S. sp. 1. *Sennert.* de febr.  
L. IV. cap. 16. *Gregor. Horst.* oper. tom. II.  
L. VIII. Obs. 22. *Brunner* in *Ephem. Germ.*  
D. III. A. II. obs. 224. *Willisch.* ibid. Cent.  
VII. obs. 13. *Wepfer* de affect. cap. obs. 120.  
*Breslauer* Sammlung 1717. Julio, Septembri,  
et Decembr. Ibid. 1723. Januar. A. N. C.  
Vol. VII. Obs. 41. *Bruckmann.* Comm. No.  
rimb. 1743, pag. 50.

Convulsio ab ustilagine, S. sp. 8.

An *Convulsio Soloniensis* vel *Necrosis ostilaginea* sit idem morbus ?

Vide *Salerne* in *Memoires* présentés a l'acad. des sciences, tom. II.

### G. LIII. EPILEPSIA.

Musculorum convulsio cum sopore.

Epilepsia, S. G. 134. L. 143. V. 188. *Sag. G.*

24. *Boerb.* 1071. *Hoffm.* III. 9. *Junck.* 54.

Eclampsia \*, S. G. 133. V. 189. *Sag. G.* 240.

\* Eclampsiam quasi morbum acutum, ab epilepsia, quam pro chronico habent, distinguere, et pro diverso genere ponere, voluerunt SAUVAGESIUS et VOGELIUS; sed, cum inter morbos acutos et chronicos limites accuratos ponere ubique difficile sit, et cum eclampsia SAUVAGESII, tum causis tum phaenomenis plerumque cum epilepsia exacte congruat, illam genere ab epilepsia diversam esse nequaquam habere possum,

Species idiopathicae sunt,

1. Epilepsia (*cerebralis*) sine causa manifesta subito adoriens ; praegressa nulla sensatione molesta, nisi fortassis vertiginis vel scotomiae alicujus.

Epilepsia plethorica, S. sp. 1.

Eclampsia plethorica, S. sp. 7.

Epilepsia cachectica \*, S. sp. 2.?

2. Epilepsia (*sympathica*) sine causa ma-

possum. Ejusmodi genus prorsus omisit LINNÆUS, et quae plura ad eclampsiam ab epilepsia distinguendam protulit SAGARUS, speciem tantum non genus distinguere possunt.

\* Epilepsia, apud SAUVAGESIUM *cachectica* dicta, revera duarum specierum esse videtur. Primo enim hanc *cachecticam* cum *serosa* HOFFMANNI et PISONIS eandem esse autor statuit; deinceps, utpote acri repulso orta, eadem esse cum specie sua undecima nimirum *exanthematica*, statui potest. Hinc est quod hanc epilepsiam cachecticam utroque loco posui, sed dubius, et aliis dijudicandum relinquens.

nifesta ; sed praegressa sensatione aurae cujusdam a parte corporis quadam versus caput assurgentis.

Epilepsia sympathica, S. sp. 8.

Epilepsia pedisympomatica, S. sp. 6.

3. Epilepsia (*occasionalis*) ab irritatione manifesta oriens, et ablata irritatione cessans.

Variat pro diversitate irritamenti, et hinc

Ab injuria capiti illata.

Epilepsia traumatica, S. sp. 13.

Eclampsia traumatica, S. sp. 9.

A dolore.

Epilepsia a dolore, S. sp. 10.

Epilepsia rachialgica, S. sp. 14.

Eclampsia a doloribus, S. sp. 4.

a. Rachialgica.

b. Ab otalgia.

c. A dentitione.

Eclampsia parturientium, S. sp. 3.

## A vermibus.

Eclampsia verminosa, S. fp. 2.

## A veneno,

Eclampsia ab atropa, S. fp. 11.

Eclampsia ab oenanthæ, S. fp. 12.

Eclampsia a cicuta, S. fp. 13.

Eclampsia a coriaria, S. fp. 14.

A scâbie, vel alia acris humoris effusione,  
retropulsa.

Epilepsia exanthematica, S. fp. 11.

Epilepsia cachectica, S. fp. 2.

## A cruditate ventriculi,

Epilepsia stomachica, S. fp. 3.

Eclampsia a saburra, S. fp. 5.

## A pathemate mentis.

Epilepsia a pathemate, S. fp. 7.

## Ab hæmorrhagia nimia.

Eclampsia ab inanitione, S. fp. 8.

A debilitate.

Eclampsia neophytorum, S. sp. 15.

Epilepsiae symptomatice sunt,

Epilepsia febricosa, S. sp. 9.

Eclampsia febricosa, S. sp. 17.

Eclampsia exanthematica, S. sp. 10.

Epilepsia uterina, S. sp. 4.

Epilepsia syphilitica, S. sp. 12.

Eclampsia ab hydrocephalo, S. sp. 16.

Eclampsia ab ischuria, S. sp. 6.

SECT. II. In functionibus vitalibus.

In actione cordis.

G. LIV. PALPITATIO.

Motus cordis vehemens, abnormis.

Palpitatio, S. G. 130. L. 132. V. 213. *Sag.*  
237. *Hoffm.* III. 83. *Junck.* 33.

Si palpitationis causae variae externis signis dignosci possent, plures ejus species cum SAUVAGESIO pro diversitate cau-



fae statuere potuiffemus ; fed, cum caufae diverfae nullo modo, quantum novimus, diftingui queant, non nifi fpeciem unicam idiopathicam statuere poffum, et quam chara tere fequenti infigniri vellem.

Palpitatio (*cardiaca*) fere conftans, faltem faepe rediens, fine alio morbo evidente.

Pro fynonimis fequentes SAUVAGESII fpecies recenfere placet.

Palpitatio ab aneurysmate cordis, S. fp. 1. *Senac*,  
Mal. de coeur. p. 484. *Lancifi* de aneurysm.

Palpitatio tremula, S. fp. 4. *Senac* de coeur, p.  
504.

Palpitatio apoftematofa, S. fp. 7. *Lancifi* de aneurysmate, lib. 1. prop. 5. *Senac* de coeur,  
485.

Palpitatio a corde offificato, S. fp. 2. *Senac* de  
coeur. pag. 484. *Morgagn.* de fed. Ep. XXIV.  
17.

Palpitatio calculofa, S. fp. 3.

Palpitatio a polypo, S. sp. 5. *Senac* de coeur.  
lib. IV. cap. 16. p. 484.

Palpitatio polypofa, S. sp. 6.

Palpitatio ex aortae aneurysmate, S. sp. 8.

Palpitatio ex aortae angustia, S. sp. 9. *Lancisi* de  
aneurysf. prop. 53. *Senac*, 484.

Palpitationis species symptomaticae sunt,

Palpitatio a pancreate, S. sp. 10. *Storck*. Ann.  
med. I. p. 245.

Palpitatio arthritica, S. sp. 11.

Palpitatio chlorotica, S. sp. 12.

Palpitatio hysterica, S. sp. 13.

Palpitatio melancholica, S. sp. 14. *Lancisi* de a-  
neurysf. prop. 44.

Palpitatio febricosa, S. sp. 15. *Storck* Ann. med.  
I. p. 75.

In actione pulmonum,

G. LV.   A S T H M A.

Spirandi difficultas per intervalla subiens;  
cum angustiae in pectore sensu, et re-  
spiratione cum sibilo strepente; tussis

sub initio paroxyfmi difficilis, vel nulla,  
verfus finem libera, cum fputo mucii  
faepe copiofo.

Asthma, S. G. 145. L. 161. V. 268. *Sag.* G.  
252.

Asthma convulfivum et fpafmodico-flatulentum,  
*Hoffm.* III. 94.

Asthma fpafticum, *Junck.* tab. 51.

Species idiopathicae funt,

1. Asthma (*fpontaneum*) fine caufa mani-  
festa, vel alio morbo comitante.

Asthma humidum, S. fp. 1. flatulentum, *Floyer*  
on the asthma, chap. 1.

Asthma convulfivum, S. fp. 2. *Willis*, Pharm.  
rat. P. II Sect. 1. cap. 12.

Asthma hyftericum, S. fp. 3. *Floyer* on the asth-  
ma, chap. 1.

Asthma ftomachicum, S. fp. 8. *Floyer*, Scheme  
of the species of asthma. Periodic asthma, 6.

Orthopnoea fpafmodica, S. fp. 3.

Orthopnoea hyfterica, S. fp. 4.

2. Asthma (*exanthematicum*) a scabie, vel  
 alia acris <sup>humoris</sup> effusione, retropulsa.

Asthma exanthematicum, S. sp. 11.

Asthma cachecticum, S. sp. 13.

3. Asthma (*plethoricum*) a suppressa evacuatione sanguinis antea solita, vel a plethora spontanea.

Asthma plethoricum, S. sp. 15.

Species asthmatis symptomaticae sunt,

Asthma hypochondriacum, S. sp. 4.

Asthma arthriticum, S. sp. 5.

Asthma venereum, S. sp. 14. *Junck.* tab. 32.

## G. LVI. DYSPNOEA.

Spirandi difficultas perpetua, sine angustiae, et potius cum repletionis et infarctus in pectore, sensu. Tussis per totum morbi decursum frequens.

Dyspnoea, S. G. 144. L. 160. V. 267. *Sag.* 251.  
*Junck.* 32.

Species idiopathicae sunt,

1. Dyspnoea (*catarrhalis*) cum tussi frequente, mucum viscidum copiosum ejiciente.

Asthma catarrhale, S. sp. 16.

Asthma pneumonicum, *Willis*, Pharm. rat. P.

II. sect. I. cap. 12.

Asthma pituitosum, *Hoffm.* III. sect. II. cap. II.

§ 3.

Asthma pneumodes, S. sp. 17.

2. Dyspnoea (*sicca*) cum tussi plerumque sicca.

Hujus causae variae haud facile dignoscendae sunt ; sequentes autem SAUVAGESII species huc referri possunt.

Dyspnoea a tuberculis, S. sp. 2.

Dyspnoea a steatomatis, S. sp. 5.

Orthopnoea a lipomate, S. sp. 18.

Dyspnoea a hydatidibus, S. sp. 4.

Dyspnoea polyposa, S. sp. 20.

3. Dyspnoea (*aërea*) a minima quavis tempestatum mutatione aucta.

Dyspnoea a pneumatia, S. sp. 12.

4. Dyſpnoea (*terrea*) cum tuſſi materiẽm terreã vel calculoſam ejiciente.
5. Dyſpnoea (*aquofa*) cum urina parca et oedemate pedum, ſine fluctuatione in pectore, vel aliis characteriſticis hydrothoracis ſignis.

Dyſpnoea pituitofa, S. ſp. 1.

Orthopnoea ab hydropneumonia, S. ſp. 12.

6. Dyſpnoea (*pinguedinoſa*) in hominibus valde obefis.

Orthopnoea a pinguedine, S. ſp. 6.

7. Dyſpnoea (*thoracica*) a partibus thoracem cingentibus læſis, vel male conformatis.

Dyſpnoea traumatica, S. ſp. 15.

Orthopnoea traumatica, S. ſp. 14.

Dyſpnoea Galenica, S. ſp. 16.

Dyſpnoea rachitica, S. ſp. 10.

Aſthma a gibbo, S. ſp. 9.

8. Dyspnoea (*extrinseca*) a causis externis manifestis.

- Asthma pulverulentorum, S. sp. 7.
- Asthma metallicum, S. sp. 12.
- Orthopnoea a vaporibus, S. sp. 16.
- Orthopnoea a deglutitis, S. sp. 9.
- Orthopnoea a fungis, S. sp. 25.
- Orthopnoea ab antipathia, S. sp. 15.
- Orthopnoea a bronchocele, S. sp. 10.

Dyspnoeae species symptomaticae sunt symptomata,

1. Morborum cordis, vel vasorum majorum,

- Dyspnoea a corde, S. sp. 11.
- Asthma a polypo cordis, S. sp. 6.
- Orthopnoea polyposa, S. sp. 26.
- Orthopnoea cardiaca, S. sp. 2.
- Dyspnoea aneurysmatica, S. sp. 19.
- Orthopnoea ab aneurysmate, S. sp. 8.
- Dyspnoea ab aortae angustia, S. sp. 22.

2. Tumoris abdominalis,

- Dyspnoea a ptyfconia, S. sp. 7.

- Dyspnoea a graviditate, S. sp. 8.
- Dyspnoea tympanitica, S. sp. 9.
- Dyspnoea a liene, S. sp. 14.
- Dyspnoea a stomacho, S. sp. 13.
- Dyspnoea a gastrocele, S. sp. 17.
- Orthopnoea a gastrocele, S. sp. 11.

### 3. Variorum morborum,

- Asthma febricosum, S. sp. 18.
- Orthopnoea febricosa, S. sp. 20.
- Orthopnoea peripneumonica, S. sp. 1.
- Orthopnoea pseudo-peripneumonica, S. sp. 21.
- Orthopnoea variolosa, S. sp. 24.

- Dyspnoea scorbutica, S. sp. 18.
- Orthopnoea scorbutica, S. sp. 22.

- Orthopnoea a hydrothorace, S. sp. 5.
- Orthopnoea ab empyemate, S. sp. 13.
- Orthopnoea a vomica, S. sp. 7.
- Dyspnoea a vomica, S. sp. 6.

- Orthopnoea a hydrocephalo, S. sp. 23.
- Orthopnoea a vermibus, S. sp. 17.



## G. LVII. P E R T U S S I S.

Morbus contagiosus ; tussis convulsiva,  
strangulans, cum inspiratione sonora,  
iterata ; sæpe vomitus.

Pertussis, *Sydenham*. Ed. Leid. p. 200. 311. 312.

*Huxham* de aëre, ad ann. 1732.

Tussis convulsiva, sive ferina, *Hoffm.* III. 111.

Tussis ferina, S. sp. 10. *Sag.* sp. 10.

Tussis convulsiva, S. sp. 11. *Sag.* sp. 11.

Amphimerina tussiculosa, S. sp. 13.

## III. In functionibus naturalibus.

## G. LVIII. P Y R O S I S.

Epigastrii dolor urens, cum copia humoris  
aquei, plerumque insipidi, aliquando  
acris, eructata.

Pyrosis, S. G. 209. *Sag.* G. 158.

Soda, L. 47. V. 154.

SCOTIS, The WATER-BRASH.

Species unica vera,

Pyrosis Suecica, S. sp. 4.

Cardialgia sputatoria, S. sp. 5.

Caeterae SAUVAGESII species symptomaticae sunt,

Pyrosis vulgaris, S. sp. 1.

Pyrosis a conceptione, S. sp. 6.

Pyrosis biliosa, S. sp. 2.

Pyrosis a phlogosi, S. sp. 3.

Pyrosis ulcerosa, S. sp. 5.

## G. LIX. COLICA.

Dolor abdominis, praecipue circa umbilicum torquens; vomitus; alvus adstricta.

Colica, S. G. 204. L. 50. V. 160. Sag. G. 162.

*Junck.* 106.

Colica spasmodica et flatulenta, *Hoffm.* II. 284.

Rachialgia, S. G. 211. Sag. G. 168.

Ileus, S. G. 252. V. 162. Sag. G. 187.

Iliaca, L. 185.

Dolor et spasmus iliacus, *Hoffm.* II. 263.

Passio iliaca, *Junck.* 107.

Species idiopathicae sunt, .

1. Colica (*spasmodica*) cum retractione umbilici et spasmis musculorum abdominalium.

Colica spasmodica, S. sp. 7.

Colica flatulenta, S. sp. 1.

Ileus phylodes, S. sp. 9.

Colica biliosa, S. sp. 5 \*.

Colica pituitosa, S. sp. 2 †.

Ileus a colo pituita infarcto, S. sp. 5.

Ileus Indicus, S. sp. 8.

Variat symptomatis superadditis ; hinc,

\* Cum vomitus quivis vehemens et saepe repetitus bilem plerumque eliciat, *colicam* quam, ex vomitu bilis solo, *biliosam* appellarunt medici, omnino *spasmodicam* esse censeo.

† Pituita in parte quadam intestinorum congesta non nisi a spasmō obstruente fieri videtur ; ideoque tum *colicam pituitosam*, tum *ileum, a colo pituita infarcto*, hic appotui.

a. Colica cum vomitu stercoreis, vel rerum  
per anum injectarum.

Ileus spasmodicus, S. sp. 3. \*.

Ileus volvulus, S. sp. 7.

b. Colica cum inflammatione superveniente.

Ileus inflammatorius, S. sp. 1.

Colica phlogistica, S. sp. 6.

2. Colica (*pictonum*) praeunte ponderis  
vel molestiae in abdomine, praecipue

\* *Ileus* gradu tantum, nequaquam natura, a *colica* differre mihi videtur; ideoque *ileum* pro varietate *colicae* tantum hic recensui. Multi quidem medici *ileum* omnem inflammatorium esse putarunt. Dolorem autem abdominis, sive colicam, cum vomitu stercoreis sine inflammatione adesse, ipse aliquoties vidi. Sin autem inflammatio aliquando adfit, si eadem *colicae* supervenerit, *colicam phlogisticam* dari recte monuit SAUVAGESIUS; nec ideo epigenomeno genus mutari; et si quidem cum dolore abdominis et vomitu ab initio adfuerit inflammatio, morbum pro *enteritide* habere vellem. Denique, quovis modo dari *ileum* genus a *colica* diversum concedere non possum.

circa umbilicum, sensu ; accedente dolore colico, primum levi, non continuo, et praecipue post pastum aucto ; tandem graviore et fere perpetuo ; cum dolore brachiorum, et dorsi, in paralyfin demum abeunte.

Rachialgia pictonum, S. sp. 1. \*

Colica pictonum *Citesii* et succedentium *Auctorum*.

Variat ratione causae remotae ; et hinc

a. A veneno metallico.

Rachialgia metallica, S. sp. 3.

\* *Rachialgiam* a *colica* genere diversam esse nequaquam video. Symptomata enim *colicae* essentialia in utroque morbo semper adsunt ; et si forte alteri quaedam superaddita sint, haec speciem non genus diversum constituere possunt. Ut medici igitur nuperi fere omnes, ita ego quam *rachialgiam* appellaverunt *ASTRUCIUS* et *SAUVAGESIUS*, pro specie *colicae* habui ac recensui.

Colica pictonum *Tronchin*. Sp. five a causa remota 2da.

b. Ab acidis ingestis.

Rachialgia pictonum, S. sp. 1. *Tronchin*. sp. 3.

c. A frigore.

Rachialgia ab adiapneustia, *Tronchin*. sp. 5.

d. A contusione dorfi.

Rachialgia traumatica, S. sp. 7.

3. Colica (*stercorea*) in hominibus alvi tardae, post diuturnam alvi obstipationem.

Colica stercorea, S. sp. 3.

Ileus a faecibus induratis, S. sp. 2.

4. Colica (*accidentalis*) a materie acri ingesta.

Colica accidentalis, S. sp. 18.

Colica Japonica, S. sp. 10.

Colica lactentium, S. sp. 20.

Ileus a veneno, S. sp. 14.

Cholera sicca auriginosa a fungis venenatis, S.  
sp. 2.

5. Colica (*meconialis*) neophytorum a  
meconio retento.

Colica meconialis, S. sp. 19.

6. Colica (*callosa*) cum sensu in quadam  
intestinorum parte stricturae, et saepe  
ante eam collecti flatus cum aliquo do-  
lore, qui flatus etiam per eandem pau-  
latim transiens evanescit; alvo tarda,  
et tandem non nisi faeces paucas liqui-  
das egerente.

Ileus a callosa coli strictura.

7. Colica (*calculosa*) cum duritie in qua-  
dam parte abdominis fixa; calculis  
quondam per anum dejectis.

Colica calculosa, S. sp. 15.

Ileus calculosus, S. sp. 10.

Colicae symptomaticae sunt,

Colica febricosa, S. sp. 21.

Rachialgia febricosa, S. sp. 2. *Tronchin.* sp. 1.

Colica hysterica, S. sp. 17.

Colica gravidarum, S. sp. 16.

Colica verminosa, S. sp. 4.

Ileus verminosus, S. sp. 13.

Colica Lapponica, S. sp. 9.

Rachialgia arthritica, S. sp. 4. *Tronchin,* sp.

Rachialgia scorbutica, S. sp. 6.

Ileus herniosus, S. sp. 6.

Colica enterocelica, S. sp. 22.

Ileus ab intestino compresso, S. sp. 4.

Colica schirrosa, S. sp. 12.

Colica pancreatica, S. sp. 13.

Colica mesenterica, S. sp. 11.

Rachialgia ab osteosarcomi, S. sp. 3.

Colica plethorica, S. sp. 8.

a Haemorrhoidalis.

b. Catamenialis.



Colica pulsatilis, S. sp. 14.

Ileus imperforatorum, S. sp. 12.

## G. LX. CHOLERA.

Humoris biliosi vomitus, ejusdem simul  
dejectio frequens; anxietas; tormina;  
furarum spasmodica.

Cholera, S. 253. L. 186. V. 110. Sag. G. 188.

Hoffm. II. 165.

Diarrhoea cholericæ, Junck. 112.

Species idiopathicae sunt,

1. Cholera (*spontanea*) tempestate calida,  
sine causa manifesta oboriens.

Cholera spontanea, S. sp. 1. Sydenh. sect. IV.  
cap. 2.

Cholera Indica, S. sp. 7.

2. Cholera (*accidentalis*) a rebus acerbis  
ingestis.

Cholera crapulosa, S. sp. 11.

Cholera a venenis fossilibus, S. sp. 4.

Cholera a veneno animali, S. sp. 5.

Cholerae symptomatice sunt,

Cholera intermittens, S. sp. 6.

Cholera inflammatoria, S. sp. 8.

Cholera arthritica, S. sp. 10.

Cholera verminosa, S. sp. 9.

## G. LXI. DIARRHOEA.

Dejectio frequens ; morbus non contagio-  
fus ; pyrexia nulla primaria.

Diarrhoea, S. G. 253. L. 187. V. 105. *Sag.* G.  
189. *Junck.* 112.

Hepatirrhoea, S. G. 246.

Cholerica, L. 190.

Coeleaca, S. G. 255. L. 189. V. 109. *Sag.* G.  
199.

Lienteria, S. G. 256. L. 188. *Sag.* G. 191. V.  
108.

Pituitaria, V. 111.

Leucorrhoea, V. 112.

Species idiopathicae sunt,

1. Diarrhoea (*crapulosa*) qua stercora naturalibus liquidiora et majori copia deji-  
ciuntur.

Diarrhoea stercorosa, S. sp. 1.

Diarrhoea vulgaris, S. sp. 2.

2. Diarrhoea (*biliosa*) qua faeces flavae  
magna copia dejiciuntur.

Diarrhoea biliosa, S. sp. 8.

3. Diarrhoea (*mucosa*) qua vel ab acribus  
ingestis, vel a frigore, praecipue pedi-  
bus applicato, mucus copiosus deji-  
tur.

Diarrhoea lactentium, S. sp. 19.

Dysenteria Parisiaca, S. sp. 3.

Diarrhoea ab hypercatharsi, S. sp. 16.

Dysenteria a catharticis, S. sp. 12.

Pituitaria, V. 111.

Leucorrhoeis, V. 112.

Diarrhoea pituitosa, S. sp. 4.

H h

Coeliaca mucosa, S. sp. 3.

Diarrhoea serosa, S. sp. 10.

a. Diarrhoea urinosa.

4. Diarrhoea (*coeliaca*) qua humor lacteus specie chyli dejicitur.

Coeliaca chylosa, S. sp. 1.

Coeliaca lactea, S. sp. 4.

5. Diarrhoea (*lienteria*) qua ingesta parum mutata celeriter dejiciuntur.

Lienteria spontanea, S. sp. 2.

6. Diarrhoea (*hepatirrhoea*) qua materies seroso-cruenta, sine dolore dejicitur.

Hepatirrhoea intestinalis, S. sp. 2.

## II. Symptomaticae.

Diarrhoea febrilis, S. sp. 3.

Diarrhoea febricosa, S. sp. 20.

Hepatirrhoea intermittens, S. sp. 7.

Diarrhoea variolosa, S. sp. 6.

Diarrhoea pleuriticorum, S. sp. 21.

- Diarrhoea arthritica, S. sp. 9.  
 Diarrhoea colliquativa, S. sp. 13.  
 Diarrhoea choleriodes, S. sp. 17.  
 Hepatirrhoea vera, S. sp. 1.  
 Hepatirrhoea a vulnere, S. sp. 3.  
 Hepatirrhoea mesenterica, S. sp. 4.  
 Dysenteria a mesenterii vomica, S. sp. 11.  
 Diarrhoea purulenta, S. sp. 11.  
 Coeliaca purulenta, S. sp. 2.  
 Hepatirrhoea scorbutica, S. sp. 5.  
 Dysenteria scorbutica, S. sp. 18.  
 \* Lienteria scorbutica, S. sp. 3.  
 Lienteria ex ulcere ventriculi, S. sp. 1.  
 Lienteria aphthosa, S. sp. 4.  
 Lienteria secundaria, S. sp. 5.  
 Diarrhoea verminosa, S. sp. 14.  
 Diarrhoea a dentitione, S. sp. 15.  
 Diarrhoea chilensis, S. sp. 12.  
 Diarrhoea acrasia, S. sp. 7.

## G. LXII. D I A B E T E S.

Urinae plerumque praeternaturalis, copia immodica, profusio chronica.

- Diabetes, S. G. 263. L. 197. V. 115. Sag. G. 199. Junck. 99. Dobson, Med. Observations, Vol V. p. 298. Home's Clinical Experiments, sect. xvi.  
 Diurelis, V. 114.

Species idiopathicae sunt,

I. Diabetes (*mellitus*) cum urina odoris, coloris, et saporis mellei.

Diabetes Anglicus, S. sp. 2. *Mead* on poisons, Essay 1. *Ejusdem* Monita Med. Cap. IX. sect. 2. *Dobson*, in Cond. Med. Observ. Vol. V, Art. 27. *Myers*, Diss. inaug. de Diabete, Edinb. 1779.

Diabetes febricosus, S. sp. 7. *Sydenh.* Epist. resp. ad *R. Brady* \*.

\* Quaeri potest, an diabetes febricosus SYDENHAMI ad diabete[m] mellitum, an ad insipidum referri debeat? Et simul quaeri potest, an urina in diabete hysterico vel arthritico sit mellita, an insipida, cum SYDENHAMUS ipse nullibi de sapore urinae, in diabete quovis, quicquid dixerit? Ad posterius respondere possum, quod, ex propria observatione, novi, urinam in diabete hysterico et arthritico nequaquam dulcem, et fere prorsus insipidam, esse, et diabete[m] febricosum SYDENHAMI ad diabete[m] mellitum ideo retuli; quod in simili senis, post diuturnam febrem, diabete, urinam omnino dulcem inveni.

## II. Diabetes (*insipidus*) cum urina limpida non dulci \*.

*M. Lister Exerc. medicin. II. de Diabete.*

\* An hujusmodi diabetis species sit frequens, incertum est. In omnibus exemplis, iisque non paucis, quae viderat WILLISIUS, urinam mellitam semper invenit; et observationes nuperae frequentes fere omnes ejusmodi urinam exhibuerunt; ita ut dubium sit, an alia diabetis idiopathicae et permanentis species revera detur. Affirmat autem LISTERUS; et ego ipse inter plures mellitas unicam insipidam observavi. Ejusmodi itaque speciem dari concedo, ideoque recensui; sed, an recte legitima dici queat, vel an diabetes ARETAEI et plurium auctorum ejusmodi fuissent, multum dubito. Ante WILLISIUM quidem, vel prioris aevi, vel extra Angliam, medicorum nemo urinam dulcem annotaverat; sed ejusmodi urinam temporibus WILLISII primo et in Anglia tantum comparuisse, minus verisimile est; omnesque ante WILLISIUM de urina in diabete dulci prorsus siluisse, potius observationi perfunctoriae, vel omnino neglectae, imputarem. Quod observatores, quibus diabetis exempla antea occurrerant, vel negligentes vel malae fidei

Diabetes legitimus, S. sp. 1. *Aretaeus* de morb. diurn. L. II. cap. 2.

Diabetes ex vino, S. sp. 5. *Ephem. Germ.* D. I. A. II. Obf. 122.

Symptomaticae sunt,

Diabetes hystericus, S. sp. 3. *Sydenh.* diff. epist. ad *G. Cole*.

Diabetes arthriticus, S. sp. 6. *Sydenh.* de podagra.

Diabetes artificialis, S. sp. 4. *Malpigh.* de lienc.

### G. LXIII. H Y S T E R I A.

Ventris murmura; sensus globi in abdomine se volventis, ad ventriculum et

fidei fuissent suspicor; cum plurimi eorum tam incredibilia, de potu in diabetis per renes transeunte prorsus immutato, narrant. SYDENHAMUM autem ipsum, adeo perspicacem et diligentem, de statu urinae nihil monuisse, mirum videtur; sed, cum scripta WILLISII, SYDENHAMO fatis nota, urinam semper esse dulcem asseruerint, si diversam invenisset SYDENHAMUS, quin id indicasset, nullus dubito.



fauces ascendens, ibique strangulantis ;  
 sopor ; convulsiones ; urinae limpidae  
 copia profusa ; animus, nec sponte, va-  
 rietur mutabilis \*.

Hysteria, S. G. 135. L. 126. V. 219. Sag. G.

242.

Malum hystericum, Hoffm. III. 50. Junck. 36.

Affectio hysterica, Willis de morb. convulsiv. cap.  
 5. 10. 11. Sydenh. diss. epist. ad G. Cole. Whytt  
 on nervous disorders.

Quatenus specie differat hysteria idiopathi-  
 ca, dicere non possum, nec, ut opinor,

\* Novit quisque, in Nosologia et in Medicina  
 facienda quadantenus exercitatus, quam difficile sit  
 inter dyspepsiam, hypochondriam, et hysteriam  
 semper accurate distinguere. Genera autem vera, et  
 satis a se invicem distincta, indicasse mihi videor :  
 Recte autem, an secus, fecerim, aliis dijudicandum  
 relinquo. Morbos affines facile inter se misceri  
 probe novi ; et, in quocunque casu, quisnam eorum  
 pro primario sit habendus, per characteres nosologi-  
 cos indicare, mihi difficillimum fore agnosco. Poste-  
 ri, ut spero, hanc rem luculentius expositam dabunt.

recte dixit SAUVAGESIUS. Species enim ab eo recensitae non, nisi ratione causae remotae, varietates esse mihi videntur. Ita habet,

A. Ab emanfione mēfium,

Hysteria chlorotica, S. sp. 2. *Raulin.* cap. 13.

B. A menorrhagia cruenta.

Hysteria a menorrhagia, S. sp. 3. *Raulin.* *Sydenham*,  
Diff. epist. ad *G. Cole*.

C. A menorrhagia serosa, five fluore albo.

Hysteria a leucorrhoea, S. sp. 4. *Raulin.* cap. 14.

D. A viscerum obstructione.

Hysteria emphrastica, S. sp. 5. *Raulin.* cap. 5.

E. A vitio stomachi.

Hysteria stomachica, S. sp. 7. *Raulin.* cap. 4.

F. A falacitate nimia.

Hysteria libidinosa, S. sp. 6. \*.

Manifesto symptomatae sunt,

Hysteria verminosa, S. sp. 1. *Delii* Amoenit. A.  
cadem.

Hysteria febricosa, S. sp. 8. *Wedel.* in Ephem.  
German. D. I. A. II. Obs. 193.

## G. LXIV. H Y D R O P H O B I A.

Potionis cujuslibet, utpote convulsionem

\* In speciebus hysteriae recensendis, egregius SAUVAGESIUS RAULINUM, theoriae subtili et fallaci, potius quam observationi, innitentem, secutus fuisse videtur. Nec quidem inter caeteras hysteriae species indicasse videtur SAUVAGESIUS, illam quam maxime exquisitam et frequentissimam, censeo, illam, scilicet, quae foeminas adultas, laute viuentes, sanguineas, plethoricas, valentiores, et a morbo alio quovis immunes, saepe ex pathemate mentis solo adoritur.

pharyngis dolentem cientis, fastidium  
et horror ; plerumque e morfu ani-  
malis rabidi.

Hydrophobia, S. G. 231. L. 86. V. 30. *Sag. G.*  
343. *Boerh.* 1138. *Junck.* 124. *Mead* on poi-  
sons. *Default* sur la rage. *Sauvages* diff. sur  
la rage. *James* on canine madness. *Dalby*,  
Virtues of cinnabar and musk against the bite  
of a mad dog. *Nugent* on the hydrophobia.  
*Choisel*, Nouvelle methode pour le traitement de  
la rage. *Journal de Medecine*, passim. *Medi-  
cal Obs. and Inquiries*, Vol. III. Art. 34. Vol.  
V. Art. 20. 26. and App. *Med. Transact.*  
Vol. II. Art. 5. 12. and 15. *Heycham*, Diff.  
Inaug. de rab. canin. Edinb. 1777. *Parry*,  
Diff. inaug. de rab. contagios. sive canin. E-  
dinb. 1778. *Andry*, Recherches sur la rage,  
1778. *Vaughan*, Cases of hydrophobia, second  
edit. 1778.

Species sunt,

I, Hydrophobia (*rabiosa*) cum morden-

di cupiditate ex morfu animalis rabidi.

Hydrophobia vulgaris, S. sp. 1.

II. Hydrophobia (*simplex*) fine rabie, vel mordendi cupiditate.

Hydrophobia spontanea, S. sp. 2.

## O. IV. VESANIAE\*.

\* *Vesaniarum* ordinem hic instituere velim, quae cum classe VOGELII nona, *Paransiae* inscripta, eadem omnino sit; sed a classe *Vesaniarum* SAUVAGESII et SAGARI in eo diversa, quod horum auctorum ordines *Hallucinationum* et *Morositatum* prorsus excludat; itidemque a classe *Mentalium* apud LINNÆUM diversa, quod hujus auctoris ordines *Imaginariorum* et *Patheticorum* etiam omittat.

A classe *Vesaniarum* autem tum *Hallucinationes* tum *Morositates* exclusas esse velim; quia neque causis, neque symptomatis cum *Vesaniis* strictè dictis ullo modo congruant. Quis enim Syrigmum vel Bulimiam, vel aliam *Hallucinationem* sive *Morositatem*, quae a mentis judicio non pendeat Vesaniam appellare vellet? Verum quidem est, tum hallucinationes, tum morositates, cum vesaniis aliquando conjunctas esse, sed simul adsunt alia vesaniae indicia, quae ejusmodi hallucinationes et morositates affectionis magis generalis symptomata tantum esse ostendunt. Ob has rationes, hallucinationes SAUVAGESII et imaginarios LINNÆI ad morbos

Mentis \* judicantis functiones laesae sine  
pyrexia vel comate.

Paranoiae, V. Cl. IX.

Deliria, S. Cl. VIII. O. III. *Sag.* Cl. XI. O. III.

Ideales, L. Cl. V. O. I.

## G. LXV. A M E N T I A.

Mentis judicantis imbecillitas, qua homines  
rerum relationes, vel non percipiunt,  
vel non reminiscuntur.

Amentia, S. G. 233. V. 337. *Sag.* G. 346.

Morosis, L. 106.

morbos locales olim detuli; et nunc morositates *SAUVAGESII* et pathéticos *LINNÆI*, antea a nobis omnino omisos, ad locales etiam deferendos esse censui.

\* In priore Nosologiae nostrae editione, has functiones simpliciter mentis esse dixi, minus autem recte; nam perceptio falsa sive *hallucinatio*, et appetitus erroneus sive *morositas*, quodammodo ad mentis functiones pertinent; cum vero utrasque ab hac classe exclusas esse velim, oportebat classis characterem nunc mutare, et mentis judicantis functiones dicere.

Stupiditas, morosis, fatuitas, V. 336.

Amnesia \*, S. G. 237. Sag. G. 347.

Oblivio, L. 107. V. 338.

Memoriae debilitas, *Junck.* 120.

Species sunt,

I. Amentia (*congenita*) a nativitate constans.

Amentia morosis, S. sp. 8.

Amentia microcephala, S. sp. 6.

II. Amentia (*senilis*) ex perceptione et memoria, ingravescente aetate, imminutis.

Amentia senilis, S. sp. 1

Amnesia senilis, S. sp. 2.

III. Amentia (*acquisita*) a causis externis

\* Amnesiam cum amentia ad unum genus retuli, tum quia plerumque conjungantur, tum quia ab iisdem causis plerumque oriuntur, et amnesia ingravescens ad amentiam semper ducat.



evidentibus in hominibus sanae mentis  
superveniens.

Amnesia febrifequa, S. sp. 8.

Amentia a quartana, S. sp. 11.

Amnesia cephalalgica, S. sp. 6.

Amnesia plethorica, S. sp. 4.

Amentia rachialgica, S. sp. 10.

Amnesia a venere, S. sp. 1.

Amnesia a pathemate, S. sp. 5.

Amentia a venenis, S. sp. 3.

Amentia a temulentia, S. sp. 7.

Améntia ab ictu, S. sp. 9

Amnesia traumatica, S. sp. 3.

Sequentes SAUVAGESII species in Nofo-  
logia methodica nequaquam recenferi  
debent, cum caufae internae a quibus  
characteres defumuntur, per figna ex-  
terna nequaquam dignofci poffint.

Amentia ferofa, S. sp. 2.

Amentia a tumore, S. sp. 4.

Amentia a hydatidibus. S. sp. 5.

Amentia a ficcitate, S. sp. 7.

Amentia calculosa, S. sp. 12.

## G. LXVI. MELANCHOLIA.

Infania \* partialis sine dyspepsia †.

Melancholia, S. G. 234. L. 71. V. 332. *Sag.*

G. 347. *Boerb.* 1089. *Junk.* 121.

Daemonomania, S. G. 236. *Sag.* 348.

Daemonia, L. 69.

Vefania, L. 70.

Panophobia, L. 75.

Athymia, V. 329.

Delirium melancholicum, *Heffm.* III. 251.

\* Infaniam adesse dicimus, quando rerum relationes omnino falsae mente concipiuntur, ita ut hominis vel pathemata vel actiones praeter rationem excitentur.

† Hypochondriasis et melancholia non semper distingui possunt Si quando autem possint, nullo alio signo quam per dyspepsiam in hypochondriasi semper praesentem, in melancholia saepe absentem rite, quantum video, distinguendi sunt.

· Erotomania, L. 82.

Noſtalgia, S. G. 226. L. 83. *Sag.* G. 338. *Junc.* 125.

Melancholia nervea, Cl. *Lorry* de melancholia, P. I.

Variat pro varietate rerum de quibus homo delirat. Ita eſt

1. Cum hallucinatione de ſtatu corporis fui a levibus cauſis periculoſo ; vel de ſtaturerum ſuarum triſti metuendo.

Melancholia vulgaris, S. ſp. 1.

Melancholia argantis, S. ſp. 4.

Panophobia phrontis, S. ſp. 3.

2. Cum hallucinatione de ſtatu rerum ſuarum jucundo.

Melancholia moria, S. Sp. 5.

Melancholia enthuſiaſtica, S. ſp. 13.

Melancholia faltans, S. ſp. 8.

3. Cum amore vehementi ſine fatyriaſi vel nymphomania.

Melancholia amatoria, S. sp. 2.

Erotomania, L.

4. Cum superstitioso futurorum metu.

Melancholia religiosa, S. sp. 3.

5. Cum averfatione motus et omnium vitae officiorum.

Melancholia atonita, S. sp. 6.

6. Cum inquietudine et ftatus cujufvis impatientia.

Melancholia errabunda, S. sp. 7.

7. Cum taedio vitae.

Melancholia Anglica \*, S. sp. 11.

Melancholia phrontis, S. sp. 14.

8. Cum hallucinatione de fuae fpeciei natura.

\* Apud Anglos fortaffis taedium vitae non femper a morbo pendet.

Melancholia zoantropica, S. sp. 12.

Melancholia hippantropica, S. sp. 9.

Melancholia scytharum, S. sp. 10.

DÆMONOMANIAM nullam veram esse cen-  
seo \*, et nostra sententia species sub hoc  
titulo a SAUVAGESIO recensitae sunt,  
vel,

1. Species melancholiae five maniae, uti

Daemonomania fanatica, S. sp. 5.

Daemonomania Indica, S. sp. 7.

Vel, 2do, Morbi ab adstantibus ad daemo-  
num potentiam falso relati, uti

Daemonomania a vermibus, S. sp. 4.

Daemonomania Polonica, S. sp. 8.

Daemonomania a cardiogmo, S. sp. 9.

Vel, 3tio, Morbi omnino simulati, uti

Daemonomania fagarum, S. sp. 1.

\* Ita censeo, quia daemonum in nostra corpora,  
vel hisce temporibus in mentes nostras, potentiam  
nullam esse pauci jam credunt.

Daemonomania vampirismus, S. sp. 2.

Daemonomania simulata, S. sp. 3.

Vel, 4to, Morbi partim veri, ut No. 2. recensiti, partim simulati, uti

Daemonomania hysterica, S. sp. 6.

## G. LXVII. MANIA.

Infania universalis.

Mania, S. G. 235. L. 68. V. 331. *Sag.* G. 349.

*Boerb.* 1118. *Junck.* 122. *Battie* on madness.

Paraphrosyne, L. 66.

Amentia, L. 67.

Delirium maniacum, *Hoffm.* III. 251.

I. Mania (*mentalis*) omnino a pathemate mentis.

Mania a pathemate, S. sp. 1. Exempla inveniuntur ex melancholia apud *Preysingerum* de diagnosi morborum capitis; ex terrore, apud *Locherum* de mania; ex amore apud *Ephem. Nat. Cur.* Dec. II. A. Obs.; ex ira apud *Hoffman.* III. p. 263.

2. Mania (*corporea*) a vitio corporis evidente.

Variat pro varietate vitii corporis ; hinc

Mania metastatica, S. sp. 4.

ab ulcere siccato *Amat. Lusitan. Cent. II. cur.*  
67.

a resecta plica, *Hoffm. tom. III. p. 263, Ephem.*  
N. Cur. Cent. I. Obs. 35.

a represso herpete, *Locher* de mania.

a menstruis retentis *Schenck. Obs. p. 142.*

a femine retento, *Schenck. ibid.*

a repressa scabie, *Lorry* de melancholia, tom.  
II. P. II. cap. 3.

a graviditate, *Lorry, P. I. cap. 7.*

a parciori lactis et lochiorum fluxu, *Puzos, 3.*  
Mem.

Mania lactea, S. sp. 2.

Mania hysteralgica, S. sp. 8.

Mania ab hemicrania, S. sp. 3.

Mania a venenis, S. sp. 5.

Phrenitis inanitorum, S. sp. 16.

3. Mania (*obscura*) praegresso nullo vel pathemate mentis, vel vitio corporis evidente.

Mania vulgaris, S. sp. 7.

Phrenitis apyreta, S. sp. 10.

Mania periodica, S. sp. 6.

Maniae species symptomatice sunt,

PARAPHROSYNE, S. G. 232. *Sag.* G. 345.

1. Paraphrosyne a venenis,

Paraphrosyne temulenta, S. sp. 1.

Paraphrosyne a datura, S. sp. 2.

Paraphrosyne ab opio, S. sp. 3.

Paraphrosyne a conio, S. sp. 4.

Paraphrosyne magica, S. sp. 5.

2. Paraphrosyne a pathemate, S. sp. 7.

Paraphrosyne hysterica, S. sp. 12.

3. Paraphrosyne febrilis.

Delirium, L. 65. V. 330.

Paraphrosyne febricosa, S. sp. 10.

Paraphrosyne critica, S. sp. 11.

Paraphrosyne calentura, S. sp. 9.

Paraphrosyne puerperarum, S. sp. 8.



## G. LXVIII. ONEIRODYNIA.

In fomno imaginatio vehementior vel molesta.

Somnium, V. 339.

Somnambulismus, S. G. 221. L. 77. *Sag.* G. 333.

Hypnobatafis, V. 340.

Noctambulatio, *Junck.* 124.

Ephialtes, S. G. 138. L. 163. *Sag.* 245.

Incubus, V. 211. *Junck.* 50.

1. Oneirodynia (*activa*) excitans ad ambulationem, et motus varios.

Somnambulismus vulgaris, S. sp. 1.

Somnambulismus catalepticus, S. sp. 2.

2. Oneirodynia (*gravans*) ex sensu ponderis alicujus incumbentis, et pectus praecipue comprimentis.

Ephialtes plethorica, S. sp. 1.

Ephialtes stomachica, S. sp. 2.

Ephialtes hypochondriaca, S. sp. 6.

Ephialtes tertianaria, S. sp. 5.

## 264. GENERA MORBORUM

Ephialtes verminosa, S. sp. 4.

Ephialtes ex hydrocephalo \*, S. sp. 3.

\* Cum hydrocephalus per signa externa non semper dignosci possit, haec species minus apte recensetur; sed ideo apposui, quod ephialtes in iis qui simul anasarca crurum, et hydrothorace vel ascite laborant, ad hydrocephalum utcunque referri possit.

## CL. III. C A C H E X I Æ.

Totius vel magnæ partis corporis habitus  
depravatus ; sine pyrexia primaria vel  
neurosi.

Cachexiae, S. Cl. X. V, Cl. VIII. *Sag.* Cl. III.  
Deformes, L. Cl. X.

## O. I. M A R C O R E S.

Corporis totius macies:

Macies, S. Cl. X. O. I. *Sag.* Cl. III. O. I.  
Emaciantes, L. Cl. X. O. I.

## G. LXIX. T A B E S.

Marcor ; asthenia ; pyrexia hectica:

Tabes, S. G. 275. L. 209. V. 309. *Sag.* G. 100.

Species sunt,

1. Tabes (*purulenta*) ex ulcere externo vel interno, vel ex vomica,

Tabes a vomica, S. sp. 15.

Tabes ulcerosa, S. sp. 12.

Tabes apostematodes, S. sp. 3.

Variat fede ; hinc

Tabes renalis, S. sp. 2.

Tabes hepatica, S. sp. 8.

Tabes a stomacho, S. sp. 14.

Tabes a pericardio, S. sp. 7.

Tabes catarrhalis \*, S. sp. 13.

2. Tabes (*scrophulosa*) in corporibus scrophulosis.

Tabes glandularis, S. sp. 10.

Tabes mesenterica, S. sp. 9.

Scrophula mesenterica, S. sp. 4.

\* Si cum catarrho diuturno adfuerit tabes, cum pyrexia hectica, nihil dubitare ejusmodi tabem catarrhalem ad purulentam referre.

Atrophia infantilis, S. sp. 13.

Atrophia rachitica, S. sp. 8.

Tabes rachialgica, S. sp. 16.

### 3. Tabes (*venenata*) a veneno ingesto.

Tabes a veneno, S. sp. 17.

Atrophia *febrisequa*, S. sp. 16. ad tabem purulentam, vel ad genus atrophiae, pertinet.

## G. LXX. A T R O P H I A.

Marcor et asthenia, sine pyrexia \* hectica.

Atrophia, S. G. 277. L. 210. V. 308. *Sag.* G. 102. *Junck.* 41.

Marasmus, L. 211.

Species sunt,

\* Atrophia fortassis nunquam sine pyrexia, saltem sine pulsu solito frequentiori, adest; sed absentia pyrexiae hecticae, (pag. 80.) fere semper atrophiam a tabe distinguit.

1. Atrophia (*inanitorum*) ex evacuatione nimia.

Atrophia a ptulismo, S. sp. 7.

Atrophia a vomitu, S. sp. 9.

Atrophia ab alvi fluxu, S. sp. 6.

Tabes nutricum, S. sp. 4.

Atrophia nutricum, S. sp. 5.

Atrophia a leucorrhoea, S. sp. 4.

Tabes dorsalis \*, S. sp. 1.

Tabes sudatoria, S. sp. 6.

Tabes a sanguifluxu, S. sp. 2.

Sanguinis inopia Ill. Lieutaud. synopsis. univ.  
med. vol. I. pag. 52.

2. Atrophia (*famelicorum*) a nutrimento deficiente.

Atrophia lactentium, S. sp. 3.

\* An ad atrophiam inanitorum, an ad atrophiam debiliū, pertinet tabes dorsalis, dubium mihi videtur, et ad posteriorem referre mallet.

3. Atrophia (*cacochymica*) a nutrimento corrupto.

Atrophia scorbutica, S. sp. 12.

Tabes syphilitica, S. sp. 11.

Tabes a hydrope, S. sp. 5.

4. Atrophia (*debilium*) a nutritionis functione depravata, praegressa nulla vel evacuatione nimia, vel cacochymia.

Atrophia nervea, S. sp. 1.

Atrophia lateralis, S. sp. 15.

Atrophia senilis, S. sp. 11.

## O. II. INTUMESCENTIÆ.

Totum vel magna corporis pars extrorsum  
tumens.

Intumescætiæ, S. Cl. X. O. II. *Sag.* Cl. III. O.  
II.

Tumidosi, L. Cl. X. O. II.

Seçt. I. *A D I P O S Æ.*

G. LXXI. *P O L Y S A R C I A.*

Corporis pinguedinosa intumescencia mo-  
lesta.

Polyfarcia, S. G. 279. L. 213. V. 540. *Sag.* G.  
106.

Steatites, V. 390.

Species unica,

Polyfarcia adiposa, S. sp. 1.



Sect. II. *FLATUOSÆ.*

## G. LXXII. P N E U M A T O S I S.

Corporis intumescencia tenfa, elástica, sub manu crepitans.

Pneumatosis, S. G. 280. V. 391. *Sag.* G. 107.

Emphysema, S. G. 13. L. 288. V. 392.

Leucophlegmatia, L. 214.

Species sunt,

1. Pneumatosis (*spontanea*) sine causa manifesta.

Emphysema spontaneum, S. sp. 1.

Pneumatosis febrilis, S. species aliquot.

2. Pneumatosis (*traumatica*) a vulnere thoracis.

Pneumatosis a vulnere, S. sp. 2.

Pneumatosis febrilis, S. species aliquot.

3. Pneumatosis (*venenata*) a veneno injecto vel applicato.

Pneumatosis a veneno, S. sp. 1.

4. Pneumatosis (*hysterica*) cum hysteria.

Pneumatosis hysterica, S. sp. 3.

### G. LXXIII. TYMPANITES.

Abdominis intumescencia tensa, elastica, sonora; alvus adstricta; caeterarum partium macies.

Tympanites, S. G. 291. L. 219. V. 316. *Sag.*

G. 118. *Boerb.* 226. *Junck.* 87.

Affectio tympanitica, *Hoffm.* III. 339.

Meteorismus, S. G. 292.

Species sunt,

1. Tympanites (*intestinalis*) cum tumore abdominis saepe inequali, et cum rejectione aëris frequenti, tensionem et dolorem levante.

- Tympanites intestinalis, S. sp. 1.  
 Tympanites enterophysodes, S. sp. 3.  
 Tympanites verminofus, S. sp. 7.  
 Tympanites spasmodicus, S. sp. 5.

- Meteorismus ventriculi, S. sp. 1.  
 Meteorismus abdominis, S. sp. 2.  
 Meteorismus hystericus, S. sp. 3.  
 Meteorismus a manzanilla, S. sp. 4.

2. Tympanites (*abdominalis*) cum refonitu evidentiore, tumore magis aequabili, et emissione flatuum rariori et minus levante.

- Tympanites abdominalis, S. sp. 2.  
 Tympanites asciticus, S. sp. 4.  
 Ascites flatulento-peritoneus, S. sp. 28.  
 Tympanites Stewartii, S. sp. 6.

#### G. LXXIV. P H Y S O M E T R A.

Tumor levis, elasticus, in hypogastrio figuram et sedem uteri referens.

- Physometra, S. G. 290. *Sag.* G. 117.  
 Hysterophyse, V. 317.

Species sunt,

*Phyfometra ficca*, S. sp. 1.

*Tympanites uteri ficca*, *Astruc*, sur les malad.  
des femmes, L. II. cap. 9.

*Phyfometra humida*, S. sp. 2.

*Tympanites uteri humida*, *Astruc*. loc. cit.

### SECT. III. AQUOSÆ SIVE HYDROPE.

#### G. LXXV. ANASARCA.

Corporis totius vel partis ejus intumescen-  
tia mollis, inelastica.

*Anasarca*, S. G. 281. L. 215. V. 313. *Sag.* G.  
108. *Boerb.* 1225. *Hoffm.* III. 322. *Junck.* 87.  
*Monro* on the dropsy, 1765. *Milman*, Animad-  
versiones de hydrope, 1779.

*Phlegmatia*, S. G. 282.

*Angina aquosa*, *Boerb.* 791.

Species sunt,

- I. *Anasarca (serosa)* a retento sero ob e-  
vacuationes solitas suppressas, vel ab  
aucto sero ob ingestam aquam nimiam.

*Anasarca metastatica*, S. sp. 1.

a, *Anasarca periodica*.

b. Anasarca ab adiapneustia.

Phlegmatia lactea, S. sp. 3.

Phlegmatia a menostasia, S. sp. 5.

Anasarca urinosa, S. sp. 11.

Anasarca hydropotarum, S. sp. 10.

2. Anasarca (*oppilata*) a compressione venarum.

Anasarca gravidarum, S. sp. 5.

Phlegmatia gravidarum, S. sp. 4.

Phlegmatia cruralis, S. sp. 9.

Angina Loweriana, S. sp. 2.

Angina oedematosa, Boerb 791.

3. Anasarca (*exanthematica*) post exanthemata, et praecipue post erysipelas, suborta.

Anasarca exanthematica, S. sp. 3.

Phlegmatia exanthematica, S. sp. 10.

Phlegmatia ulcerosa, S. sp. 6.

Phlegmatia Malabarica, S. sp. 7.

Phlegmatia elephantina, S. sp. 8.

Anasarca Americana, S. sp. 7.

## 276 GENERA MORBORUM

4. Anafarca (*anaemia*) a tenuitate sanguinis per haemorrhagiam producta.

Anafarca a fluxu, S. sp. 2.

5. Anafarca (*debilium*) in debilibus a morbis longis, vel ab aliis causis.

Phlegmatia vulgaris, S. sp. 1.

Anafarca a febribus, S. sp. 4.

Anafarca hysterica, S. sp. 2.

Phlegmatia hysterica, S. sp. 2.

Anafarca rachialgica, S. sp. 8.

Phlegmatia Deliensis, S. sp. 11.

Anafarca purulenta, S. sp. 9. vix ad anafarcam referri potest.

## G. LXXVI. HYDROCEPHALUS.

Capitis intumescencia mollis, inelastica, hi-  
antibus cranii futuris.

Hydrocephalus, S. G. 285. L. 216. Boerb. 1217.

Hydrocephalum, V. 384.

Species unica,

Hydrocephalus exterior, S. sp. 2. \*.

G. LXXVII. H Y D R O R A C H I T I S.

Tumor supra vertebrae lumborum, mollis,  
exiguus, hiantibus vertebrae.

Hydrorachitis, S. G. 287. *Morgagn.* de fed. XII.  
9. et seq.

Spinola, L. 289.

Spina bifida, V. 386.

G. LXXVIII. H Y D R O T H O R A X.

Dyspnoea; faciei pallor; pedum oedemata;  
urina parca; decubitus difficilis; subita  
et spontanea ex somno cum palpitatione  
excitatio; aqua in pectore fluctuans.

Hydrothorax, S. 150. V. 311. *Boerh.* 1219.

Species sunt,

Hydrothorax vulgaris, S. sp. 3.

\* Hydrocephalum internum, antea hic recensitum,  
ad Apoplexiam, sub nomine Apoplexiae hydrocephalicae, jam supra retuli.

Hydrothorax febrifequens, S. sp. 4.

Hydrothorax a scabie, S. sp. 9.

Sequentes minus recte recensentur, cum liquidi intus contenti neque natura, neque fons, neque sedes, per signa externa dignosci queat.

Hydrothorax chylofus, S. sp. 1. *Willis*, Pharm. rat. P. I. sect. I. cap. 13.

Hydrothorax hydatidosus, S. sp. 5. *Morg.* de sed. XVI. 33.

Hydrothorax mediastini, S. sp. 6.

Hydrothorax pleurae, S. sp. 7. *Hoffm.* III. p. 337. *Bergeron*, diss. de hydropse pectoris.

Hydrothorax pericardii, S. sp. 8. *Morg.* de sed. XVI. 34. 36. *Senac* de coeur, tom. II. p. 349.

Minus recte a SAUVAGESIO hic recensetur

Hydrothorax ab omento, S. sp. 2.

## G. LXXIX. A S C I T E S.

Abdominis intumescencia tensa, vix elastica, sed fluctuosa.



Afcites, S. G. 288. L. 217. V. 314. *Sag.* G. 115.  
*Boerb.* 1226. *Hoffm.* III. p. 322. *Junck.* 87.  
*D. Monro* on the dropsy, 1765. *Milman*, Ani-  
 madversiones de hydrope, 1779.

Species funt,

1. Afcites (*abdominalis*) cum tumore to-  
 tius abdominis aequali, et cum fluctua-  
 tione fati evidente.

Afcites vulgatiore, S. fp. 1.

Variat ratione caufae.

A. Ab oppilatione vifcerum.

Afcites ab oppilatione, S. fp. 2.

Afcites ab hepate, S. fp. 3.

Afcites a liene, S. fp. 4.

Afcites fcrophulofus, S. fp. 5.

Afcites artificialis, S. fp. 10.

B. A debilitate.

Afcites ab exanthematis, S. fp. 8.

Afcites arthriticus, S. fp. 9.

Afcites febrilis, S. fp. 12.

Afcites ex quartana, *Werhof.*

Afcites fcorbuticus, S. fp. 11.

C. A tenuitate fanguinis.

Afcites a fanguifluxibus, S. fp. 7.

Variat etiam ratione liquidi effufi.

Afcites purulentus, S. fp. 21. \*.

Afcites urinosus, S. fp. 22.

Afcites chylofus, S. fp. 23.

Afcites oleofus, S. fp. 24.

2. Afcites (*faccatus*) cum tumore abdominis, faltem initio, partiali, et cum fluctuatione minus evidente.

Afcites ab ovariis, S. fp. 6.

Afcites ovarii, S. fp. 19.

a. Afcites faccatus.

Hydrometra ovarii, S. fp. 6.

Afcites cruentus, S. fp. 20.

\* De hisce et pluribus aliis afcitis speciebus recensitis idem notandum est ac in pag. 278.

Afcites ftomachi, S. fp. 16.

Afcites omentalis, S. fp. 18.

Afcites intercus, S. fp. 14.

Afcites fanguineo-intercus, S. fp. 26.

Afcites fanguineo-peritonaeus, S. fp. 27.

Afcites purulento-peritonaeus, S. fp. 29.

## G. LXXX. H Y D R O M E T R A.

Hypogaftrii in mulieribus paulatim crescens tumor, uteri figuram referens, preffui cedens fluctuanſve; citra ifchuriam et graviditatem.

Hydrometra, S. G. 289. *Sag.* G. 116. *Boerh.*  
1224.

Species per externa ſigna diſtinguendae vix dari poſſunt; ſed ſequentes ex SAUVAGESIO recensentur.

Hydrometra aſcitica, S. fp. 1.

Hydrometra gravidarum, S. sp. 2.

Hydrometra hydatica, S. sp. 4.

Afcites uterinus, S. sp. 15.

Hydrometra fanguinea, S. sp. 3.

Afcites fanguineo-uterinus, S. sp. 25.

Hydrometra puriformis, S. sp. 5.

## G. LXXXI.    H Y D R O C E L E.

Tumor fcroti non dolens, paulatim crescens, mollis, fluctuans, pellucidus.

Ofcheocele, S. G. 41. V. 388.

Ofcheophyma, *Sag.* G. 44.

Hydrops fcroti, V. 389.

Hydrops testium, *Boerb.* 1227.

Species sunt,

Ofcheocele aquosa, S. sp. 2. *Monro* in *Edinb. Ess.* Vol. V. Art. 21. *Sharp's* Operations and critical inquiry. *Douglas* on the hydrocele. *Pott's* remarks on the hydrocele. *Le Dran*, Operations de Chirurgie. *Bertrandi* in *Mem. de l'Acad. de chirurgie*, Vol. III.

Ofcheocele hydatidosa, S. sp. 3.

Ofcheocele Malabarica, S. sp. 4. *Kempfer*, *Amoen. exot. fasc. III. obs. 7.*

Se&. IV. S O L I D Æ.

G. LXXXII. P H Y S C O N I A.

Tumor quandam abdominis partem potissimum occupans, paulatim crescens, nec sonora, nec fluctuans.

Phyſconia, S. G. 283. V. 325. *Sag.* G. 110.

Hypofarca, L. 219.

Species sunt \*,

Phyſconia hepatica, S. ſp. 1.

Cl. *Cuſſon.* *Bonet.* Sepulchr. de graviditate falſa, obſ. 3. n. 8. 9. 10. *Verduc* Patholog. du rachitis.

a. *Schirrhodea.* G. *Segeri* M. Nat. Cur. D. I. Ann. IV. obſ. 142.

\* Species ſequentes nequaquam ad normam Nofologiae methodicae recensentur, ſed accuratius phyſconiae ſpecies indicare difficile foret, ſaltem plus exegiſſet, quam quo nunc fruor otii. Interim *Cuſſoni* doctiſſimi opus ſummae ad pathologiam utilitatis repetere hic placuit.

b. *Calculosa Bonet*. Sepulchr. de hypochondrii tumore, obf. 5.

c. *Hydatidosa Winckeri* Disp. de hydatidibus, apud *Bonet*. Med. Septent. T. II. pag. 313.

### Phyſconia ſplenica, S. ſp. 2.

a. *Empbraſica Haller*. Disp. pathol. T. IV. diſp. 109. *Tulp*. Obſ. med. lib. II. cap. 30,

b. *Schirrhoudea Bonet*. Sepulchr. de ventris tumore, obf. 34. n. 3,

### Phyſconia renalis, S. ſp. 3.

*Bonet*. Sepulchr. de gravid. falſa, obf. 3. n. 7.

a. *Calculoſa Plater*. Obſ. L. II. p. 449. *River*. cent. IV. obf. 34.

b. *Sarcomatico-cyſtica Haller*. Disp. pathol. diſp. 114.

### Phyſconia uterina, S. ſp. 4.

*Bonet*. Sepulchret. de gravid. falſa, obf. 2. n. 5.  
6. 7.

## Phyfconia ab ovario, S. fp. 5.

*Monro*, Effais d' Edinburgh, tom. VI. Art. 74.  
obf. 1.

## Phyfconia mefenterica, S. fp. 6.

- a. *Hydatidofa Greg. Horftii*, Lib. 5. obf. 33.  
*Tulp.* obf. Lib. II. c. 34.
- b. *Strumofa Bonet.* ex Rudnicio de ventr. tumore, obf. X. n. 15. *Ambr. Pare*, L. VII. c. 21. *Scultet.* Armam. chirurg. obf. 38.
- c. *Schirrodea Marc. Donat.* Hift. med. mir. lib. VII. c. 15. *Claudin.* confult. Sect. II. confult. 134. *Trincavell*, lib. III. conf. 22. *Riolan.* Anthropol. lib. II. c. 26. *Morgagni* de fedib. ep. 39. n. 2.
- d. *Sarcomatica Bonet.* Sepulchr. de falſa gravid. obf. 3. n. 1.
- e. *Steatomatoſa, Barth. Cabrol.* Obf. 33. et 35. *Tulp.* Obf. Lib. II. c. 32. et 33. *J. Lechellii* apud *Bonet.* Med. ſept. T. II. p. 486. Idem Collect. acad. Tom. III. p. 585. *Hierne* Collect. acad. tom. III. p. 226. Obf. 166.
- f. *Fungoſa, Bonet.* Sepulchr. de gravid. falſa, obf. 3.

*Phyfconia intestinalis*, S. fp. 7.

a. *Concreto-glomerata*, Morgagn. de fedib. epift.

39. n. 21. 25.

b. *Sarcomatica*, Fanton. Obf. med. felectiores,  
obf. 11.

*Phyfconia omentalis*, S. fp. 8.

Frid. Reebman Diff. de omento.

*Phyfconia polyfplachna*, S. fp. 9.

a. *Schirrhodea*, Fabr. Hildani cent. II. obf. 45.

b. *Schirrhodea et farcomatica*, Huldenreich, M.  
N. C. D. I. ann. VI. et VII. p. 321.

c. *Schirrhodea et adipofa*, T. Bartholin. cent.  
III. obf. 6.

d. *Hydatidofa*, Volch. Coiter. Obf. anat. p. 117.  
Maur. Cordaei comm. 5. ad lib. priorem,  
*Hippocr.* de muliebr

e. *Hydatidofa et fcirrhodea*, Halleri Difp. pa-  
thol; Tom. V. p. 256.



*Physconia visceralis*, S. sp. 10.

*Bonet.* Sepulchr. de gravid. falsa, obf. 3. Megaloplachnos *Hippocrat. Marc. Donat.* Hist med. mir. lib. VI. c. 2. *Schenck.* ex Garnero de lie-ne, Lib. III. Obf. 9. *Salmuth.* cent. I. obf. 21. *Bonet.* Med. sept. Lib. VII. p. 487. *Bianchi* Hist. hepat. T. I. p. 130.

*Physconia externa lupialis*, S. sp. 11.

*Graham* Transf. philos. compend. V. IX. cap. 4. p. 187.

*Physconia externa scirrhouea*, S. sp. 12.

*Ger. Blas.* Obf. med. VI.

*Physconia externa hydatidosa*, S. sp. 13.

*Bonet.* Sepulchr. de gravid. falsa, obf. 3. § 2. 3. 4. 11. &c. *Achotzii* apud *Schenckium*, Lib. III. de hydropse, obf. 4. et apud *Scholtzium* conf. 339. *Solenandri* conf. 15. sect. V. *Riverii* Obf. communicat. ultim.

Phyſconia ab adipe ſubcutaneo, S. ſp. 14.

a. *Simplex*, Cl. *Lieutaud.* Comp. med. 7.  
*Mich. Fehr.* apud *Bonet.* Med. ſept. T. I. p.  
 636.

b. *Syphilitica*, obſervante celeb. *Fizes.*

Phyſconia ab excrescentia, S. ſp. 15.

### G. LXXXIII. R A C H I T I S.

Caput magnum anterius maxime tumens ;  
 genicula tumida ; coſtae depreſſae ; ab-  
 domen tumidum ; caetera marceſcen-  
 tia.

Rachitis, S. G. 294. L. 212. V. 312. *Sag.* G.  
 120. *Boerh.* 1480. *Höffm.* III. 487. *Zeviani*  
 della rachitide.

Variat,

1. *Simplex* ſine alio morbo.

Rachitis nodosa, S. ſp. 1.

Rachitis Britannica \*, S. sp. 2. *Gliffon* de rachitide.

2. Aliis morbis conjuncta.

Rachitis strumosa, S. sp. 3.

Rachitis Polonica, S. sp. 5.

Rachitis elephantiaca, S. sp. 6.

Neque rachitis *calmucana*, S. sp. 4. neque rachitis *a castratione*, S. sp. 7. pro morbo haberi potest.

\* Minus recte pro diversis speciebus ponuntur rachitis *nodosa* et *Britannica*, cum non differant aliter quam morbus incipiens et confirmatus.

## O. III. IMPETIGINES.

Cachexiae, cutem et externum corpus praecipue deformantes.

Impetigines, S. Cl. X. O. V. *Sag.* Cl. III. O. V.

## G. LXXXIV. SCROPHULA.

Glandularum conglobatarum, praesertim in collo, tumores; labium superius et columna nasi tumida; facies florida, cutis levis; tumidum abdomen.

Scrophula, S. G. 285. V. 367. *Sag.* G. 121.

Struma, L. 284.

Species sunt,

1. Scrophula (*vulgaris*) simplex, externa, permanens.

Scrophula vulgaris, S. sp. 1.

2. Scrophula (*mesenterica*) simplex, interna, cum pallore faciei, inappetentia, tumore abdominis, et foetore foecum infolito.

Scrophula mesenterica, S. sp. 4.

3. Scrophula (*fugax*) simplicissima, et tantum circa collum, plerumque a resorptione ex ulceribus capitis proveniens.

Scrophula fugax, S. sp. 2.

4. Scrophula (*Americana*) cum framboesia conjuncta.

Scrophula Americana, S. sp. 5.

Neque scrophula *periodica*, S. sp. 6. neque scrophula *Moluccana*, S. sp. 8. ad genus scrophulae pertinere mihi videtur.

## G. LXXXV. SYPHILIS.

Morbus contagiosus, post concubitum impurum et genitalium morbum, ulcera tonsillarum ; cutis, praesertim ad marginem capillitii, papulae corymbosae, in crustas et in ulcera crustosa abeuntes ; dolores ostocopi ; exostoses.

Syphilis; S. G. 3086. L. 6. V. 319. *Sag.* G. 126.

Lues venerea, *Boerb.* 1440. *Hoffm.* III. 413. *Junck.* 96. *Astruc* de lue venerea.

Species unica,

Syphilis venerea, S. sp. 6.

Syphilis *Polonica*, S. sp. 2. nequaquam ad hoc genus pertinet, et de Syphilide *Indica*, S. sp. 3. nobis non satis constat, ut pro diversa specie ponatur.

## G. LXXXVI. S C O R B U T U S.

In regione frigida post victum putrescentem, salitum, ex animalibus confectum, deficiente simul materia vegetabili recente ; asthma ; stomacace ; in cute maculae diversicolores, plerumque livescences, praesertim ad pilorum radices.

Scorbutus, S. G. 391. L. 223. V. 318. *Sag.* G. 127. *Boerb.* 1148. *Hoffm.* III. 369. *Junck.* 91. *Lind* on the scurvy. *Hulme* de scorbuto. *Roupe* de morbis navigantium.

Variat gradu.

- a. Scorbutus incipiens.
- b. Scorbutus crescens.
- c. Scorbutus inveteratus.

Variat etiam symptomatibus.

- d. Scorbutus lividus, *Nitzsch*, Theoret. pract. ab *Handl.* des Scharbockes, &c.

*c.* Scorbutus petechialis, *Nitzsch*, *ibid.*

*f.* Scorbutus pallidus, *Nitzsch*, *ibid.*

*g.* Scorbutus ruber, *Nitzsch*, *ibid.*

*b.* Scorbutus calidus, *Nitzsch*, *ibid.*

# LXXXVII.

## 87- ~~G. LXXXVI.~~ ELEPHANTIASIS.

Morbus contagiosus ; cutis crassa, rugosa, aspera, unctuosa, pilis destituta ; in extremis artubus anaesthesia ; facies tuberculis deformis ; vox rauca et nasalis.

Elephantiasis, S. G. 302. V. 321. *Sag. G.* 128.

Elephantia Arabum, V. 322,

Varietates sunt,

Elephantiasis Orientalis, S. sp. 1.

Elephantiasis legitima, S. sp. 2. *Lond. Med. Obs.*  
Vol. I. Art. 19.

Elephantiasis leonina, S. sp. 3.

Elephantiasis Tyria, S. sp. 4.

Elephantiasis Alopecia, S. sp. 5.

Elephantiasis syphilitica, S. sp. 6.

Elephantiasis Javanensis, S. sp. 7.



Elephantiasis Indica, S. sp. 9. \*.

## G. LXXXVIII. L E P R A.

Cutis escharis albis, furfuraceis, rimosis, aspera, aliquando subtus humida, pruriginosa.

Lepra, S. G. 303. L. 262. *Sag.* G. 129.

Lepra Graecorum, V, 320.

Varietates sunt,

Lepra Graecorum, S. sp. 1.

Lepra ichthyosis, S. sp. 2.

Lepra Indica, S. sp. 3.

Lepra Asturiensis, S. sp. 4.

Lepra herpetica, S. sp. 5.

Lepra malum mortuum, S. sp. 6.

## LXXXIX. F R A M B O E S I A.

\* De Elephantiasi, Lepra, Framboesia, et Trichomate, utpote morbis a meipso nunquam visis, amplius statuere non ausus sum.

Fungi, mori, vel rubi idaei fructus referentes, in variis cutis partibus enati.

Framboesia, S. G. 125. *Sag.* G. 125.

Varietates sunt,

Framboesia Guineensis, S. sp. 1. *Edinb. Essays*,  
Vol. VI. Art. 71.

Framboesia Americana, S. sp. 2.

## G. XC.   T R I C H O M A.

Morbus contagiosus, capilli solito crassiores,  
in cirrhos et funiculos inextricabiles  
implicati.

Trichoma, S. G. 311. *Sag.* G. 137.

Plica, L. 313.

Plica sive Rhopalosis, V. 323.

Species sunt,

Trichoma cirrosum, S. sp. 1

Trichoma villosum, S. sp. 2.

## G. XCI. ICTERUS.

Flavedo cutis et oculorum ; faeces albae ;  
urina obscure rubra, immixta colore lu-  
teo tingens.

Icterus, L. 224. V. 306. *Boerb.* 918. *Junck.* 90.

Aurigo, S. G. 306. *Sag. G.* 132.

Cachexia ictérica, *Hoffm.* III. 301.

Species idiopathicae sunt,

1. Icterus (*calculosus*) cum dolore in regio-  
ne epigastrica acuto, post pastum aucto,  
et cum dejectione concretionum biliofa-  
rum.

Aurigo calculosa, S. sp. 9.

2. Icterus (*spasmodicus*) sine dolore, post  
morbos spasmodicos et pathemata men-  
tis.

Aurigo hysterica, S. sp. 13.

Species quaedam, quae a SAUVAGESIO sub titulo  
Auriginis a venenis, recensentur.

3. Icterus (*hepaticus*) sine dolore, post morbos hepatis.

Aurigo hepatica, S. sp. 11.

Aurigo ab obstructione, S. sp. 6.

Aurigo purulenta, S. sp. 7.

4. Icterus (*gravidarum*) sub graviditate oriens, et post partum abiens. *Van Swiet.* ad *Boerb.* Aph. 950.

Aurigo plethorica, S. sp. 5.

5. Icterus (*infantum*) in infantibus haud diu post natales oriens.

Aurigo neophytorum, S. sp. 12.

Icteri sequentes, siquidem recte icteri dicantur\*, symptomatici sunt,

Aurigo febrilis, S. sp. 1.

\* Flavedo cutis oriri potest, vel a bile non, ut solet, excreta, sed in vasa sanguifera excepta, et inde subter cuticulam

*Aurigo febricosa*, S. sp. 8.

*Aurigo accidentalis*, S. sp. 2.

*Aurigo typhodes*, S. sp. 10.

*Aurigo rachialgica*, S. sp. 14.

*Aurigo a venenis*, S. sp. 4.

*Aurigo Indica*, S. sp. 3. five quarundam  
gentium color naturalis, nequaquam pro  
morbo haberi potest.

cuticulam effusa; vel a sero sanguinis saepe flavescente,  
subter cuticulam, ut in ecchymosi, effuso. In quibus-  
dam casibus, an flavedo cutis ab una vel altera illarum  
causarum oriatur, apud medicos non semper constat;  
sed tantum ex prima icterum genuinum, et ab altera  
morbum diversum, quique, quantum fieri possit, di-  
stingui debet, oriri censemus.

## CL. IV. L O C A L E S \*.

Partis, non totius corporis, affectio.

Vitia † S. Cl. I. L. Cl. XI. V. Cl. X. *Sag.* Cl. I.

Plagae, *Sag.* Cl. II.

Morbi organici *Auſtorum.*

\* Fortaffis aliquando ambiguum eſſe poteſt, utrum ad univerſales, vel ad locales, morbi quidam referri debent; de plerisque vero, utri claſſi referendi ſint, ſatis obvium erit; et ex institutione hujus *Localium* claſſis, quamplurimos morbos rectius et facilius, quam in aliorum noſologorum ſyſtematibus, diſponi poſſe contendimus.

† *Vitia* hic dixi, utpote ſub hac claſſe *Localium* comprehenſa; morbos vero multo plures comprehendit hic claſſis, ita ut vox *vitia* pro hujus ſynonymo nequaquam haberi poteſt, et idem de *Plagis* *SAGA-RI* dictum velim.

## O. I. DYSÆSTHESIAE.

Sensus depravati aut deleti, ex organorum  
externorum vitio \*.

Dysaesthesiae, S. CL. VI. O. I. *Sag.* Cl. IX.  
O. I.

## G. XCII. CALIGO.

Visus imminutus vel prorsus, abolitus ob  
repagulum opacum, inter objecta et re-  
tinam, oculo ipso vel palpebris inhae-  
rens.

Caligo, S. G. 153. V. 288. S. G. 259.  
Cataraeta, L. 109.

\* Vereor ne in sequentibus aliquando species  
recensuerim quae characteri ordinis non prorsus  
respondeant, quasdam, scilicet, dysaesthesias quae  
ex organorum externorum vitio non pendeant. Hu-  
jusmodi species quidem aliquando recensui; sed  
paucae omnino sunt, et feci, quia species affines, et  
hic loci expectandas, separare nolui.

Species sunt,

1. Caligo (*lentis*) ob maculam opacam  
pone pupillam.

Cataracta \*, S. G. 152. L. 109. V. 239. *Sag. G.*  
26.

Apud SAUVAGESIUM species sunt, verae  
vel spuriae :

Verae varietates sunt,

Cataracta vera, S. sp. 1.

Glaucoma Woolhoufii.

Cataracta antiglaucoma, S. sp. 2.

Cataracta glaucoma, S. sp. 3

Glaucoma *Maitre Jan* et *St Ives*.

Spuriae varietates sunt,

Cataracta membranacea, S. sp. 4.

Cataracta secundaria, S. sp. 5.

\* Non video quod, cum SAUVAGESIO, *Cataracta*  
pro diverso a *Caligine* genere haberi possit; et judi-  
cent periti, annon ideo recte *Caliginis* characterem  
mutaverim, et *cataractam* pro ejus specie posuerim.



2. Caligo (*corneae*) ob corneam opacam.

Achlys, V. 242.

Variat pro varietate morbi opacitatem facientis.

Caligo a nephelio, S. sp. 5.

Caligo a leucomate, S. sp. 6.

Caligo ceratocete, S. sp. 10.

Caligo a staphylomate, S. sp. 11.

Caligo a pterygio, S. sp. 12.

Caligo hyposphagma, S. sp. 13.

3. Caligo (*pupillae*) ob obstructam pupillam.

Variat pro varietate causae.

Caligo ab ectasi, S. sp. 18.

Amaurosis a synchyfi, S. sp. 6.

Amaurosis a myosi, S. sp. 7.

Caligo a synizefi, S. sp. 19.

Synizefis, V. 240.

4. Caligo (*humorum*) ob vitium vel defectum humoris aquei.

Glaucoma, V. 241.

Variat pro diverso humoris statu.

Caligo hypoaema, S. sp. 15.

Caligo lactea, S. sp. 16.

Caligo a rhytidosi, S. sp. 17.

Ambylopia hydrophthalmica, S. sp. 7.

5. Caligo (*palpebrarum*) ob vitium palpebris inhaerens.

Variat pro varietate vitii palpebrarum.

Caligo a symblepharosi, S. sp. 1.

Caligo ab ancyloblepharo, S. sp. 2.

Caligo a blepharoptosi, S. sp. 3.

Caligo a pacheablephatosi, S. sp. 4.

Caligo a lupia, S. sp. 7.

Caligo a farcomate, S. sp. 8.

Caligo a cancro, S. sp. 9.

## G. XCIII. A M A U R O S I S.

Vifus imminutus vel prorsus abolitus, sine vitio oculi evidente ; plerumque cum pupilla dilatata et immobili.

Amaurosis, S. C. 155. L. 110. V. 238. *Sag. G.*  
261.

Amblyopia, L. 108. V. 236.

Species sunt,

1. Amaurosis (*compressionis*) post causas et cum signis congestionis in cerebro.

Variat pro varietate causae remotae.

Amaurosis pituitosa, S. sp. 2.

Amaurosis scrophulosa, S. sp. 3.

Amaurosis plethorica, S. sp. 4.

Amaurosis intermittens, S. sp. 13.

Amaurosis exanthematica, S. sp. 11.

Amaurosis venerea, S. sp. 10.

Amaurosis traumatica, S. sp. 1.

2. Amaurosis (*atonica*) post causas et cum signis debilitatis.

Amaurosis congenita, S. sp. 5.

Amaurosis exhaustorum, S. sp. 16.

Amaurosis rachialgica, S. sp. 14.

Amaurosis arthritica, S. sp. 17.

Amblyopia absoluta, S. sp. 6.

3. Amaurosis (*spasmodica*) post causas et cum signis spasmi.

Amaurosis a spasmo, S. sp. 8.

Amaurosis hysterica, S. sp. 15.

4. Amaurosis (*venenata*) a veneno ingesto vel applicato.

Amaurosis a narcoticis, S. sp. 12.

Amaurosis foricariorum, S. sp. 9.

#### G. XCIV. D Y S O P I A \*.

Visus depravatus, ita ut non nisi certa luce, vel ad certam distantiam, vel in certa positura, objecta clare videantur.

Amblyopia, S. G. 154. Sag. G. 258.

\* Verbum *Amblyopia*, quo pro hujus generis nomine utitur SAUVAGESIUS, alio sensu intelligunt tum veteres, tum LINNÆUS et VOGELIUS; ideoque hujus generis nomen mutare necessarium duxi.

Species sunt;

1. Dyfopia (*tenebrarum*) in qua non nisi in magna luce objecta videntur.

Amblyopia crepuscularis, S. sp. 1.

2. Dyfopia (*luminis*) in qua non nisi in obscura luce objecta videntur.

Amblyopia meridiana, S. sp. 2.

3. Dyfopia (*diffitorum*) in qua longe distantia non videntur.

Amblyopia diffitorum, S. sp. 3.

Myopia, L. 309.

Myopiafis, V. 515.

4. Dyfopia (*proximorum*) in qua proxima non videntur.

Amblyopia proximorum, S. sp. 4.

Presbytia, L. 308.

5. Dyfopia (*lateralis*) in qua non nisi oblique posita videntur.

Amblyopia lufcorum, S. sp. 5.

## G. XCV. PSEUDOBLEPSIS.

Vifus depravatus, ita ut quae non exiftant homo fe videre imaginatur, vel quae exiftunt aliter videt ac revera fe habeant.

Suffufio, S. G. 217. Sag. G. 329.

Phantasma, L. 73. V. 289.

Species funt,

1. Pseudoblepsis (*imaginaria*) in qua quae non exiftunt confpici videntur.

Variat pro varietate phantasmatis.

a. Suffufio myodes, S. sp. 1.

b. Suffufio réticularis, S. sp. 2.

c. Suffufio fcintillans, S. sp. 3.

Marmaryge, V. 290.

d. Suffusio coloris, S. sp. 4.

Haemalopia.

2. Pseudoblephsis (*mutans*) in qua objecta revera existentia aliquomodo mutata apparent.

Variat pro varia objectorum mutatione.

a. Suffusio metamorphosis, S. sp. 5.

b. Suffusio nutans, S. sp. 7.

c. Suffusio dimidians objecta, S. sp. 6.

d. Suffusio multiplicans.

Diplopia, S. G. 218. Sag. G. 330.

Dysopia, V. 291.

Diplopia iterum variat pro varietate causae remotae.

α. Diplopia pyretica, S. Varietas 1.

β. Diplopia a spasmo, S. Var. 2.

γ. Diplopia a paralyfi, S. Var. 3.

δ. Diplopia ab ancyloblepharo, S. Var. 4.

ε. Diplopia a catarrho, S. Var. 5.

ζ. Diplopia a debilitate, S. Var. 6.

- 7. Diplopia a contusione, S. Var. 8.
- 8. Diplopia a terrore, S. Var. 9.
- 9. Diplopia a temulentia, S. Var. 10.
- \* Diplopia remotorum, S. Var. 7.

## G. XCVI. DYSECOEA.

Auditus imminutus vel abolitus.

Dysecoea, S. G. 158. V. 246. Sag. G. 264.  
 Cophosis, S. G. 160. L. 112. Sag. G. 266.  
 Surditas, V. 247.

Species sunt,

1. Dysecoea (*organica*) ob vitium in organis fonos ad internam aurem transmittentibus.

Variat pro varietate vitii et partis affectae.

- a. Dysecoea monoton seu malcorum, S. sp. 1.
- b. Dysecoea a meatu obstructo, S. sp. 2.  
 Gophosis a meatu, S. sp. 1.



c. Dysecoea a myringae atonia, S. sp. 3.

Cophosis a tympano, S. sp. 4.

d. Dysecoea a myringae duritie, S. sp. 4.

e. Dysecoea a myringa perforata, S. sp. 5.

f. Dysecoea a tympani fistula, S. sp. 6.

g. Dysecoea a hydrotympano, S. sp. 7.

h. Dysecoea a tuba obstructa, S. sp. 8.

Cophosis a tuba, S. sp. 3.

i. Dysecoea syphilitica.

Cophosis syphilitica, S. sp. 5.

Cophosis congenita, S. sp. 8.

2. Dysecoea (*atonica*) sine organorum sonos transmittentium vitio evidente.

Variat pro varietate causae.

a. Cophosis critica, S. sp. 2.

Dysecoea febrilis.

b. Cophosis a comate, S. sp. 7.

c. Cophosis serosa, S. sp. 6.

d. Cophosis a steatmate, S. sp. 9.

## G. XCVII. PARACUSIS.

Auditus depravatus.

Paracusis, S. G. 159. Sag. G. 265.

Syrigmus, S. G. 219. Sag. G. 231.

Species sunt,

1. Paracusis (*imperfecta*) in qua soni ab externis venientes percipiuntur, non autem accurate vel cum solitis conditionibus.

Variat,

- a. Cum auditu gravi.

Paracusis barycoea, S. sp. 1.

- b. Cum auditu nimis sensibili.

Paracusis oxycocæ, S. sp. 2.

- c. Cum sono unico externo a causis internis duplicato.

Paracusis duplicata, S. sp. 3.

- d. Soni quos homo audire velit, nisi sono alio vehementi simul excitato non audiuntur.

Paracusis Willifiana, S. sp. 4.

2. Paracusis (*imaginaria*) in qua soni extrinsecus non existentes ab internis causis excitantur.

Syrigmus, S. G. 219. Sag. G. 231.

Syringmos, L. 72.

Sufurrus, V. 292.

Variat pro varietate soni percepti.

- a. Syrigmus fibilus, S. sp. 4.
- b. Syrigmus sufurrus, S. sp. 5.
- c. Syrigmus bombus, S. sp. 11.

Variat etiam pro varietate causae remotae.

- d. Syrigmus a debilitate, S. sp. 1.
- e. Syrigmus criticus, S. sp. 2.
- f. Syrigmus plethoricus, S. sp. 3.
- g. Syrigmus vertiginosus, S. sp. 10.

- h. Syrigmus cephalalgicus, S. sp. 6.
- i. Syrigmus a ventriculo, S. sp. 7.
- k. Syrigmus catarrhalis, S. sp. 8.
- l. Syrigmus ab oxycocœa, S. sp. 9.

## G. XCVIII.    A N O S M I A.

Olfactus imminutus vel abolitus.

Anosmia, S. G. 156. L. 113. V. 248. *Sag.* 262.

Species sunt,

- 1. Anosmia (*organica*) ob vitium in membrana nares internas investiente.

Variat pro varietate vitii.

- Anosmia catarrhalis, S. sp. 1.
- Anosmia a siccitate, S. sp. 6.
- Anosmia a polypo, S. sp. 3.
- Anosmia ab ozaena, S. sp. 2.
- Anosmia syphilitica, S. sp. 4.
- Anosmia verminosa, S. sp. 5.

2. Anosmia (*atonica*) sine vitio membranae  
narium evidente.

Anosmia paralytica, S. sp. 7.

## G. XCIX. AGEUSTIA.

Gustus imminutus vel abolitus.

Ageustia, S. G. 157. *Sag. G.* 263.

Ageustia, L. 114.

Apogeusis, V. 449.

Species sunt,

1. Ageustia (*organica*) ob vitium in mem-  
brana linguae, a nervis sapida arcens.

Agheustia febrilis, S. sp. 1.

2. Ageustia (*atonica*) sine vitio linguae e-  
vidente.

Agheustia paralytica, S. sp. 2.

## G. C. ANÆSTHESIA.

Tactus imminutus vel abolitus, S. G. 161,  
L. 118. *Sag.* G. 267.

Sequentes species a SAUVAGESIO recensentur, et, cum de iis mihi non satis liqueat, nihil mutare volui.

Anaesthesia a spina bifida, S. sp. 1.

Anaesthesia plethorica, S. sp. 2.

Anaesthesia nascentium, S. sp. 3.

Anaesthesia melancholica, S. sp. 4.

## O. II. D Y S O R E X I Æ\*.

Appetitus erroneus vel deficiens.

Sect. I. *A P P E T I T U S E R R O N E I.*

Morositates, S. G. VIII. O. II. *Sag.* Cl. XIII.

O. II.

Pathetici, L. Cl. V. O. II.

Hyperaesthesiae, V. Cl. VII.

## G. Cl. B U L I M I A.

Appetitus esculentorum majori copia quam  
quae digeri possit.

\* *Morositates* SAUVAGESII! minus recte ad *Vesaniarum* classem referri, supra dixi, et nunc ad locales detuli. Recte, ni fallor, cum dysorexiae fere omnes manifesto partis singularis, potius quam totius corporis, affectiones sint. Nostalgia sola, si quidem revera morbus sit, minime pro locali haberi potest; sed morbum incertum a cacteris dysorexiis separare non bene potui.

Bulimia, S. G. 223. L. 79 Sag. G. 335.

Bulimus, V. 296.

Addephagia, V. 297.

Cynorexia, V. 298.

Species idiopathicae sunt,

1. Bulimia (*belluonum*), sine morbo ventriculi, cibi majorem solita copiam appetens.

Bulimia esurigo, S. sp. 4.

Addephagia, V. 297.

2. Bulimia (*syncopalis*) cibum frequenter appetens, ob sensum famis syncopen imitantis.

Bulimia cardialgica, S. sp. 2.

Bulimus, V. 296.

3. Bulimia (*emetica*) cibum magna copia appetens, et mox per vomitum rejiciens.

Bulimia canina, S. sp. 1.

Cynorexia, V. 298.



Species symptomaticae sunt,

*Bulimia verminosa*, S. fp. 3.

*Bulimia addephagia*, S. fp. 5.

*Bulimia convulforum*, S. fp. 6.

*Bulimia ab acidis*, S. fp. 7.

## G. CII. P O L Y D I P S I A.

Appetitus majoris solita copiae potulentorum.

*Polydipsia*, S. G. 224. L. 80. V: 275. *Sag.* G. 336.

*Polydipsia* fere semper symptomatica est, et variat tantum pro varietate morborum quos comitatur ; hinc

*Polydipsia febrilis*, S. Var. a.

*Polydipsia hydropica*, S. Var. b.

*Polydipsia fluxuum*, S. Var. c.

*Polydipsia a venenis*, S. Var. d.

## G. CIII. P I C A.

Defiderium non efculenti ingerendi.

Pica. S. G. 222. *Sag.* G. 334.

Citta, L. 78.

Allotriophagia, V. 299.

Malacia, V. 300.

Cum de fpeciebus *picae* mihi non fatis liqueat, fequentes ex SAUVAGESIO recenfeo.

Pica infantilis, S. fp. 1.

Pica chlorofiantium, S. fp. 2.

Pica malacia, S. fp. 3.

Pica abfcorbuticorum, S. fp. 4.

Pica voluntaria, S. fp. 5.

## G. CIV. S A T Y R I A S I S.

In maribus effraenis veneris cupiditas.

Satyriasis, S. G. 228. L. 81. *Sag.* G. 340.

Satyriafim pro fpecie maniae habet VOGELIUS.

Species sunt,

Satyriasis (*juvenilis*) cum veneris cupiditate praeter modum vehementi, corpore simul parum perturbato.

Satyriasis neogamorum, S. sp. 5.

2. Satyriasis (*furens*) cum veneris cupiditate effraeni, corpore simul multum perturbato.

Satyriasis acuta, S. sp. 1. *Aretaei Cappad.* Acut, Lib. II. cap. 12.

Satyriasis chronica, S. sp. 2. ad priapismum pertinet; et Satyriasis venerea, S. sp. 3. necnon satyriasis hydrophobica, S. sp. 4. manifesto symptomata est,

G. CV. NYMPHOMANIA.

In foeminis effraene veneris desiderium.

S f

Nymphomania, S. G. 229. 229. *Sag.* G. 341.  
 Satyriasis, L. 81.

Furorem uterinum pro specie maniae habet Vo-  
 GELIUS.

Nymphomaniae species unica est, et gradu  
 tantum varians, hinc

Nymphomania falacitas, S. sp. 1.

Nymphomania furibunda, S. sp. 2.

Nymphomania fervor uteri, S. sp. 3.

Nymphomania pruriginosa, S. sp. 4.

## G. CVI. NOSTALGIA.

In absentibus a patria, vehemens eandem  
 revivendi desiderium.

Nostralgia, S. G. 226. L. 83. *Sag.* G. 338.

Nostralgiam pro specie melancholiae habet VOGELIUS.

Species sunt,

1. Nostralgia (*simplex*) sine alio morbo.

Nostralgia simplex, S. sp. 1.

2. Nostalgia (*complicata*) aliis morbis comitata.

Nostalgia complicata, S. sp. 2.

## Seçt. II. *APPETITUS DEFICIENTES.*

Anepithymiae, S. Cl. VI. O. II *Sag.* IX. O. II.

Privativi, L. Cl. VI. O. III.

Adynamiae, V. Cl. VI.

## G. CVII. *A N O R E X I A.*

Appetitus esculentorum deficiens.

Anorexia, S. G. 162. L. 116. V. 279. *Sag.* G. 268.

Omnis anorexia mihi symptomatice esse videtur, et variat tantum pro varietate morbi quem comitatur. Species quidem omnes, quotquot a SAUVAGESIO fuerant recensitae, ad genus dyspepsiae supra retuli; sed fortassis utile hic erit easdem seorsum, et rectius ordinatas, iterum recensere.

Species sunt,

1. Anorexia (*humoralis*) ab humore ventriculorum gravante.

Anorexia pituitosa, S. sp. 2.

Anorexia biliosa, S. sp. 6.

Anorexia a saburra, S. sp. 9.

2. Anorexia (*atonica*) ob tonum fibrarum ventriculi amissum.

Anorexia paralytica, S. sp. 1.

Anorexia exhaustorum, S. sp. 8.

Anorexia melancholica, S. sp. 5.

Anorexia cachectarum, S. sp. 7.

Anorexia arthritica, S. sp. 12.

Anorexia febrilis, S. sp. 4.

Incertae naturae sunt,

Anorexia plethorica, S. sp. 3.

Anorexia mirabilis, S. sp. 10.

Anorexia neophytorum, S. sp. 11.

Anorexia Stewartiana, S. sp. 13.

## G. CVIII. A D I P S I A.

Appetitus potulentorum suppressio, five fitis  
feriatio.

Adipsia, S. G. 163. L. 117. V. 281. *Sag.* G. 269.

Adipsiam sine alio morbo, qualis est

Adipsia primaria, S. sp. 1.

pro morbo habere nollem; omnemque adip-  
siam pro sympathica, five symptomate  
morbi cujusdam, sensorium commune  
afficientis, habeo; ideoque non ad loca-  
les referendū.

## G. CIX. A N A P H R O D I S I A.

Libidinis defectus, vel veneris impotentia.

Anaphrodisia, S. G. 164. *Sag.* G. 270.

Atechnia, L. 119.

Agnesia, V: 283.

Species verae sunt,

326    GENERA MORBORUM

Anaphrodisia paralytica, S. sp. 1.

Anaphrodisia gonorrhoeica, S. sp. 2.

Species spuriae, sive veneris rite exercendae  
impedimenta, sunt,

Anaphrodisia a mariscis, S. sp. 4.

Anaphrodisia ab urethrae vitio, S. sp. 5. \*.

Pro ficta et falsa habenda est

Anaphrodisia magica, S. sp. 3.

\* Ad dyspermatismi genus pertinet.



## O. III. D Y S C I N E S I Æ.

Motus impediti vel depravati ex organorum vitio.

## G. CX. A P H O N I A.

Vocis plena suppressio, citra coma aut syn-  
copen.

Aphonia, S. G. 166. L. 115. V. 253. *Sag.* G.  
272.

Species sunt,

1. Aphonia (*gutturalis*) a tumefactis faucibus et glottide.

Aphonia catarrhalis, S. sp. 4, Anginosa *Mor-*  
*gagni*.

2. Aphonia (*trachealis*) a compressa trachea.

Aphonia aneurismatica, S. sp. 5.

Aphonia pulmonica, S. sp. 9.

3. Aphonia (*atonica*) a nervis laryngis re-  
fectis.

Aphonia traumatica, S. sp. 6.

Sequentes symptomticae esse videntur,

Aphonia melancholica, S. sp. 1.

Aphonia paralytica, S. sp. 8.

Aphonia temulentorum, S. sp. 3.

Aphonia hysterica, S. sp. 7.

Aphonia ab antipathia, S. sp. 2.

## G. CXI. M U T I T A S.

Verba articulandi impotentia.

Mutitas, S. G. 165. V. 257. Sag. G. 271.

Species sunt,

1. Mutitas (*organica*) ex lingua ablata vel vitiata.

Mutitas elinguium, S. sp. 4.

Mutitas a ficcitate, S. sp. 5.

2. Mutitas (*atonica*) ex nervis linguae lae-  
fis.

Mutitas traumatica, S. sp. 2.

3. Mutitas (*furdorum*) ex furditate conge-  
nita, vel puerilibus annis aborta.

Mutitas furdorum, S. sp. 8.

Sequentes symptomticae sunt,

Mutitas a glossocele, S. sp. 1.

Mutitas a narcoticis, S. sp. 3.

Mutitas spasmodica, S. sp. 6.

Mutitas proaeretica, S. sp. 7.

T t

## G. CXII. PARAPHONIA.

Vocis sonus depravatus.

Paraphonia, S. G. 168.

Cacophonia, *Sag.* G, 274.

Raucedo, L. 146.

Raucitas, V. 252.

Afaphia, V. 250.

Clangor, V. 251.

Leptophonia, V. 254.

Oxyphonia, V. 255.

Rhenophonia, V. 256.

Species sunt,

1. Paraphonia (*puberum*) in qua, circa pubertatis tempus, vox ab acutiori et suavi in graviolem et ingratam mutatur.

Paraphonia *puberum*, S. sp. 1.

2. Paraphonia (*rauca*) in qua, ob siccitatem vel tumorem faucium flaccidum, vox fit rauca et scabra.

Paraphonia catarrhalis, S. fp. 3.

Raucedo, L. 146.

Raucitas, V. 250.

3. Paraphonia (*resonans*) in qua, ob obstructas nares, vox fit rauca, cum fonitu per nares sibilante.

Paraphonia nasalis, S. fp. 2.

Paraphonia a polypo, S. fp. 8.

Rhenophania, V. 256.

4. Paraphonia (*palatina*) in qua, ob deficientem vel divisam uvulam, plerumque cum labio leporino, vox fit rauca, obscura, et ingrata.

Paraphonia gutturalis, S. fp. 5.

Asaphia, V. 250.

5. Paraphonia (*clangens*) in qua vox in acutam, clangentem, et exilem mutatur.

Paraphonia ulcerosa, S. fp. 4.

Paraphonia sibilans, S. fp. 7.

Clangor, V. 251.

Leptophonia, V. 254.

Oxyphonia, V. 255.

6. Paraphonia (*comatosa*) in qua, ob laxatum velum palati et glottidem, fonus inter inspirandum editur.

Paraphonia stertens, S. sp. 6.

## G. CXIII. PSELLISMUS.

Verba articulandi vitium.

Psellismus, S. G. 167. L. 138. Sag. G. 273.

Psellotis, V. 259.

Traulotis, V. 258.

Ischnophonia, V. 260.

Battarismus, V. 261.

Species sunt,

1. Psellismus (*haesitans*) in quo fermonis verba, praesertim prima, non facile pro-

feruntur, et non nisi prima syllaba fac-  
pius repetita.

Pfellismus ischnophonia, S. sp. 1.

Ifschnophonia, V. 201.

Battarismus, V. 261.

2. Pfellismus (*ringens*) in quo sonus literae R semper aspiratur, et quasi geminatur.

Pfellismus rottacismus, S. sp. 2.

Traulotis five blaefitas, V. 258.

3. Pfellismus (*lallans*) in quo sonus literae L fit liquidior, vel loco literae R pronunciatur.

Pfellismus lamdacismus, S. sp. 3.

4. Pfellismus (*emolliens*) in quo literae du-  
rae in molliores mutantur, et litera S  
multum usurpatur.

Pfellismus traulotes, S. sp. 4.

5. Pfellismus (*balbutiens*) in quo, ob linguam magnam vel tumefactam, literae labiales magis audiuntur, et saepe loco aliarum proferuntur.

Pfellismus balbuties, S. sp. 5.

Pfellismus a ranula, S. sp. 11.

6. Pfellismus (*acheilos*) in quo literae labiales vix vel non omnino pronunciari possunt.

Pfellismus mogilalia, S. sp. 6.

7. Pfellismus (*lagostomatum*) in quo, ob divisum palatum, literae gutturales minus recte pronunciantur.

Pfellismus lagostomatum, S. sp. 10.

Pfellismus cotacismus, S. sp. 8.



## G. CXIV. S T R A B I S M U S.

Oculorum axes optici non convergentes.

Strabismus, S. G. 116. L. 304. V. 514. *Sag. G.*  
222.

Species sunt,

1. Strabismus (*hâbitualis*) a consuetudine prava oculo tantum uno utendi.

Strabismus vulgaris, S. sp. 2.

2. Strabismus (*commodus*) ab unius oculi prae altero, debilitate vel mobilitate majori, adeo ut uterque oculus non commode adhibeatur.

Strabismus Buffonii, S. sp. 3.

Strabismus spasmodicus, S. sp. 4.

Strabismus paralyticus, S. sp. 5.

Strabismus catarrhalis, S. sp. 6.

3. Strabismus (*necessarius*) ob mutatum situm vel figuram partium oculi.

Strabismus a luscitate, S. sp. 1.

Strabismus caligantium, S. sp. 11.

Strabismus a crystallino, S. sp. 12.

Strabismus myopum, S. sp. 9.

De Strabismo aequinoctiali mihi non liquet.

Minus recte, ut mihi videtur, ad Strabismum referuntur sequentes.

Strabismus symptomaticus, S. sp. 7.

Strabismus lagophthalmos, S. sp. 8.

## G. CXV. CONTRACTURA.

Artus unius vel plurium contractio diuturna, rigida.

Contractura, S. G. 119. L. 299. *Sag.* G. 225.

Obstipitas, S. G. 11.

Caput obstipum, V. 513.

Digitium, V. 221.

Species sunt;

1. Contractura (*primaria*) a musculis contractis, rigidis.

a. A musculis ab inflammatione rigidis.

Contractura dolorifica, S. sp. 2.

Contractura arthritica, S. sp. 7.

Contractura catarrhalis, S. sp. 8.

Obstipitas catarrhalis, S. sp. 3.

b. A musculis a spasmo rigidis.

Contractura spasmodica, S. sp. 11.

Obstipitas spasmodica, S. sp. 6.

Obstipitas renuens, S. sp. 1.

Obstipitas lateralis, S. sp. 5.

Contractura hypochondriaca, S. sp. 1.

c. A musculis, ob antagonistas paralyticos, contractis.

Contractura paralytica, S. sp. 4.

Contractura rachialgica, S. sp. 5.

Contractura Bohemica, S. sp. 6.

Obstipitas annuens, S. sp. 2.

d. A musculis ab acrimonia irritante contractis.

Contractura scorbutica, S. sp. 3.

2. Contractura (*articularis*) ob artus rigidos.

Contractura anchylofis, S. sp. 9.

Contractura syphilitica, S. sp. 10.

Obstipitas gibbosa, S. sp. 4.

## O. IV. APOCENOSSES.

Fluxus five fanguis, aut humores alii, solito  
uberius profluens, sine pyrexia impe-  
tue fluidorum aucto.

Apocenosfes, V. Cl. II. O. II.

Fluxus, S. Cl. IX. *Sag.* Cl. V.

Morbi evacuatorii, L. Cl. IX.

## G. CXVI. PROFUSIO.

Fluxus sanguinis,

Profusio, L. 239.

Haemorrhagia, V. 81. *Boerh.* 218.

Exfanguifluxibus, a SAUVAGESIO recensitis,  
sequentes, ad hunc locum pertinere vi-  
dentur.

Haemorrhagia passiva, S. sp. 1.

Haemoptysis traumatica, S. sp. 12.

Haematemesis traumatica, S. sp. 3.

Haematuria traumatica, S. sp. 14.

Haematuria violenta, S. sp. 2.

Haemorrhagia ab hirudine, S. sp. 7.

Haemoptysis a hirudine, S. sp. 13.

Haematemesis ab hirudine, S. sp. 4.

## G. CXVII.   E P H I D R O S I S \*.

Sudoris praeter naturam evacuatio.

Ephidrosis, S. G. 258. *Sag.* G. 194.

Sudor, L. 208.

Hydropedesis, V. 121.

Species idiopathica unica est,

Ephidrosis spontanea, S. sp. 1.

\* Ephidrosin minus recte ad morbos locales relatum esse agnosco; cum autem huic morbo nullum in systemate nostro locum idoneum invenerim, ne prorsus omitteretur, hic cum aliis quodammodo affinis morbis evacuatoriis recensui.

Ephidroses symptomaticae variant, pro varietate morbi quem comitantur, et simul pro varietate sudoris eliciti, et quodammodo pro varietate partis maxime sudantis. Hinc

Ephidrosis febrilis, S. sp. 3.

Ephidrosis febricosa, S. sp. 7.

Ephidrosis hectica, S. sp. 5.

Ephidrosis exanthematum, S. sp. 6.

Ephidrosis syncoptica, S. sp. 4.

Ephidrosis scorbutica, S. sp. 2.

Ephidrosis a saburra, S. sp. 18.

Ephidrosis lactea, S. sp. 9.

Ephidrosis mellea, S. sp. 10.

Ephidrosis vinosa, S. sp. 11.

Ephidrosis viridis, S. sp. 12.

Ephidrosis nigra, S. sp. 13.

Ephidrosis lutea, S. sp. 14.

Ephidrosis urinosa, S. sp. 15.

Ephidrosis cruenta, S. sp. 16.

Ephidrosis caerulaea, S. sp. 17.

Ephidrosis acida, S. sp. 19.

Ephidrosis arenosa, S. sp. 20.

Ephidrosis lateralis, S. sp. 8.

## G. CXVIII. EPIPHORA.

Fluxus humoris lachrymalis.

Epiphora, S. G. 259. L. 172. V. 99. *Sag.* G.  
195.

Ex speciebus a SAUVAGESIO recensitis, nulla pro idiopathica haberi potest, nisi

Epiphora frigida, S. sp. 8.

Caeterae omnes symptomaticae sunt,

Epiphora a pathemate, S. sp. 1.

Epiphora ophthalmica, S. sp. 3.

Epiphora calida, S. sp. 9.

Epiphora ex variolis, S. sp. 4.

Epiphora arthritica, S. sp. 12.

Epiphora cruenta, S. sp. 10.

Epiphora ex rhyade, S. sp. 2.

Epiphora ex aegilope, S. sp. 5.

Epiphora ab ectropio, S. sp. 6.

Epiphora ab anchylope, S. sp. 7.

Epiphora sebacea, S. sp. 11.

Epiphora lactea, S. sp. 13.



## G. CXIX. PTYALISMUS.

Fluxus falivae.

Ptyalismus, S. G. 261. L. 176. V. 103. *Sag.* G.  
197.

Si quis ptyalismus idiopathicus fit, pro eo  
habere vellem

Ptyalismum a laxitate, S. sp. 4.

Sequentes omnes symptomticae sunt,

Ptyalismus nauseosus, S. sp. 1.

Ptyalismus hypochondriacus, S. sp. 2.

Ptyalismus gravidarum, S. sp. 14.

Ptyalismus a pyrofi, S. sp. 2.

Ptyalismus Lapponicus, S. sp. 3.

Ptyalismus febrilis, S. sp. 18.

Ptyalismus variolosus, S. sp. 6.

Ptyalismus arthriticus, S. sp. 9.

Ptyalismus phthisicus, S. sp. 10.

Ptyalismus scorbuticus, S. sp. 7.

Ptyalismus catarrhalis, S. sp. 15.

Ptyalismus aphthosus, S. sp. 13.

Ptyalismus a carie, S. sp. 16.

Ptyalismus purulentus, S. sp. 12.

Ptyalismus a calculo, S. sp. 17.

Ptyalismus syphiliticus, S. sp. 19.

Ptyalismus viridis, S. sp. 11.

Ptyalismus urinosus, S. sp. 20.

Ptyalismus mercurialis, S. sp. 5.

## G. CXX. ENURESIS.

Urinae e vesica fluxus involuntarius non dolens.

Enuresis, S. G. 264. L. 195. V. 113. *Sag.* G. 200.

Species sunt,

1. Enuresis (*atonica*) post morbos sphincterem vesicae laedentes.

Enuresis hernioforum, S. sp. 3.

Enuresis puerperarum, S. sp. 5.

Enuresis calculosa, S. sp. 7.

Enuresis a fistula, S. sp. 8.

2. Enuresis (*irritata*) a compressione vel  
irritatione vesicae.

Enuresis gravidarum, S. sp. 4.

Enuresis catamenialis, S. sp. 6.

Enuresis a sparganosi, S. sp. 9.

Symptomatica est,

Enuresis paralytica, S. sp. 2.

Pro morbo non haberi potest

Enuresis infantum, S. sp. 1.

## G. CXXI. G O N O R R H O E A.

Humoris ex urethra, in maribus, cum vel  
absque libidine, praeter naturam fluxus.

Gonorrhoea, S. G. 268. L. 200. V. 118. *Sag.*  
G. 204.

Species sunt,

1. Gonorrhoea (*pura*) in qua, praegresso concubitu impuro nullo, humor puriformis, sine dysuria vel libidine, ex urethra subinde fluit

Gonorrhoea pura, S. sp. 1.

Gonorrhoea benigna *Auſtorum*.

2. Gonorrhoea (*impura*) in qua, poſt concubitum impurum, humor puriformis cum dysuria ex urethra fluit.

Gonorrhoea ſyphilitica, S. sp. 4.

Gonorrhoea maligna *Auſtorum*.

Hujus ſequela eſt,

Gonorrhoea (*mucosa*) in qua, poſt gonorrhoeam impuram, humor mucoſus, cum minima vel nulla dysuria, ex urethra ſubinde fluit.

Anglis, a GLEET.

3. Gonorrhoea (*laxorum*) in qua, humor plerumque pellucidus, sine penis erectione, sed cum libidine, in vigilante, ex urethra subinde fluit.

Gonorrhoea libidinosa, S. sp. 2.

4. Gonorrhoea (*dormientium*) in qua liquor feminalis cum erectione et libidine, in dormientibus, ex somnio libidinoso, ejicitur.

Gonorrhoea oneirogonos, S. sp. 3.

Species spuriae, utpote in quibus ex urethra fluxus non fit.

Gonorrhoea spuria, S. sp. 5. *Astruc*, lib. 3. cap. 3. § 2.

Gonorrhoea balani, S. sp. 6.

## O. V.    E P I S C H E S E S.

Excernendorum suppressiones.

## G. CXXII.    O B S T I P A T I O.

Dejectio faecum nulla vel solito rarior.

Obstipatio, L. 166. V. 128. Sag. G. 221.

Species sunt,

1. Obstipatio (*debilium*) in hominibus laxis, debilibus, et plerumque dyspepticis.
2. Obstipatio (*rigidorum*) in hominibus fibrae rigidae saepe hypochondriacis.
3. Obstipatio (*obstructorum*) cum symptomatis Colicae 1mae, 2daë, 4tae, vel 7mae supra dictae.

## G. CXXIII. ISCHURIA.

Urinae suppressio absoluta.

Ischuria, S. G. 293. L. 167. V. 129. *Sag. G.*  
212. *Home's Clinical experiments*, sect. XV.

Species sunt, .

1. Ischuria (*renalis*) praegresso renum morbo, cum dolore vel molesto gravitatis sensu in regione renum, et sine hypogastrii tumore, vel ad mingendum stimulo.

Variat pro varietate causae ; hinc \*

\* Doctissimi Cussoni Collectanea egregia de ischuria, licet ad leges nosologiae methodicae minus confecta, non prorsus omittenda putavi. Simul autem metuens, ne iis in hoc secundo tomo locus commodus esset, in tomo primo cum systemate SAUAGVESIANO inferui. Cum vero hic specierum ischuriae characteres nosologicos dare volui, ut tota res sub uno conspectu appareret, species Cussoni summatim hic repetere placuit. Loca autem auctorum, in quibus ischuriae varia exempla inveniri possunt, ex primo tomo adhuc petenda sunt.

- a. *Nepritica*, a renum inflammatione, S. sp. 1.
- b. *Neophrolithica*, a renum calculo, S. sp. 2.
- c. *Nephroplethorica*, a plethora, S. sp. 3.
- d. *Lunatica*, *periodica*, S. sp. 4.
- e. *Nephrospastica*, spasmodica, S. sp. 5.
- f. *Nephrelmintica*, verminosa, S. sp. 6.
- g. *Nephrothromboides*, a sanguine congrumato, S. sp. 7.
- h. *Nephropyica*, a renum purulentia, S. sp. 8.
- i. *Nephrophlegmatica*, pituitosa, feu mucosa, S. sp. 9.
- k. *Nephroplegica*, paralytodaea, S. sp. 10.
- l. *Suppleta*, ab alia evacuatione suppleta, S. sp. 11.

2. *Ischuria (ureterica)* praegressio renum morbo, cum doloris vel molestiae sensu in quadam ureteris parte, et sine hypogastrii tumore, vel ad mingendum stimulo.

Variat pro varietate causae ; hinc

- a. *Ureteritica*, inflammatoria, S. sp. 12.
- b. *Ureterolithica*, calculosa, S. sp. 13.
- c. *Ureterothromboides*, a sanguinis grumo, S. sp. 14.



- d. *Ureterophlegmatica*, a pituita, S. sp. 15.
- e. *Ureteropyica*, purulenta, S. sp. 16.
- f. *Ureterostomatica*, ab orificii ureterum inferioris clausura, S. sp. 17.

3. *Ischuria (vesicalis)* cum tumore hypogastrii, dolore ad cervicem vesicae, et frequenti ad mingendum stimulo.

Variat pro varietate causae ; hinc

- a. *Cystitica*, a vesicae inflammatione, S. sp. 18.
- b. *Cystolithica*, a vesicae calculo, S. sp. 19.
- c. *Cystospastica*, a sphincteris vesicae spasmō, S. sp. 20.
- d. *Cystophlegmatica*, a vesicae paralyfi, S. sp. 21.
- e. *Polyurica*, a vesica distenta lotio diutius cohibita, S. sp. 22.
- f. *Cystopyica*, purulenta, S. sp. 23.
- g. *Cystothromboides*, a sanguinis grumo, S. sp. 24.
- h. *Cystophlegmatica*, a muco, S. sp. 25.
- i. *Ectopocystica*, a vesicae ectopia, S. sp. 26.
- k. *Cystoproctica*, ab intestino recto scybalis, calculo, flatibus, inflammatione, abscessu, haemorrhoidibus, turgente, S. sp. 27.

l. *Hystero cystica*, ab utero, S. sp. 28.

m. *Atretarum*, a menstribus in vagina retentis,  
S. sp. 29.

n. *Parodoxa*, S. sp. 30.

4. *Ischuria (urethralis)* cum tumore hypogastrii, frequenti ad mingendum stimulo, et dolore in aliqua parte urethrae.

Variat pro varietate causae ; hinc

a. *Perinaealis*, a perinaei tumore, S. sp. 31.

b. *Urethrolithica*, a calculo urethrae impacto, S.  
sp. 32.

c. *Urethrophlegmatica*, a muco urethram infar-  
ciente, S. sp. 33.

d. *Urethrothromboides*, a sanguinis grumo ure-  
thram opplente, S. sp. 34.

e. *Urethropyica*, a pure urethram obstruente, S.  
sp. 36.

f. *Urethrohymenodes*, a membrana in urethram  
impacta, S. sp. 36.

g. *Urethrelmintica* verminosa, S. sp. 37.

h. *Urethritica*, ab urethrae inflammatione, S. sp.  
38.

i. *Carunculosa*, a morbis ut vocant urethrae, S.  
sp. 39.

- k. *Hydrocelodes*, ab urethrae ruptura in scrotum  
hiante, S. fp. 40.  
l. *Cryptopyca*, a penis intra corpus retractione,  
S. fp. 41.  
m. *Peridesmica*, a vinculo strictiori peni injecto,  
S. fp. 42.  
n. *Phimofica*, a phimosi, S. fp. 42.  
o. *Aspadialis*, ab urethrae clausura, S. fp. 44.

## G. CXXIV. D Y S U R I A.

Dolorifica et quodammodo impedita urinae  
emissio.

Dysuria, S. G. 265. L. 57. V. 164. *Sag.* G. 213.  
*Stranguria Auctorum.*

Species sunt,

1. *Dysuria (ardens)* cum ardore urinae  
sine morbo vesicae evidente.

*Dysuria primaria*, S. fp. 5.

*Dysuria a cantharidibus ingestis vel applicatis.*

Dysuria arfura, S. sp. 7.

Dysuria neonympharum, S. sp. 14.

2. Dysuria (*spasmodica*) a spafmo ex aliis partibus cum vefica communicato.

Dysuria hyfterica, S. sp. 1.

Dysuria rachialgica, S. sp. 11.

Dysuria diabetica, S. sp. 17.

Dysuria nephralgica, S. sp. 3.

3. Dysuria (*compressionis*) a vicinis partibus veficam prementibus.

Dysuria gravidarum, S. sp. 13.

Dysuria a cyftocele, S. sp. 8.

Dysuria ab hyfteroloxia, S. sp. 10.

Dysuria atretarum, S. sp. 16.

4. Dysuria (*phlogiftica*) a vicinis partibus inflammatis.

Dysuria ab hyfteritide, S. sp. 9.

Dysuria haemorrhoidalis, S. sp. 6.

Dysuria venerea, S. sp. 4.

Dysuria a caruncula, S. sp. 5.

5. Dyfuria (*irritata*) cum fignis calculi vesicalis.

Dyfuria calculosa, S. sp. 12.

6. Dyfuria (*mucosa*) cum excretionem muci copiosa.

Glus, L. 200.

Pyuria mucosa, S. sp. 6.

Pyuria viscida, S. sp. 5.

Rarus vesicae morbus, *Hoffm.* T. IV. Consult.

Med. Centur. II. cas. XCIII.

Catarrhus vesicae *Lieutaud.* Syn. p. 272.

Pyuria arthritica, S. sp. 9.

De dyfuria ab infectis, S. sp. 15. mihi non fatis liquet.

## G. CXXV. DYSPERMATISMUS.

Seminis in actu venereo tarda, impedita, et ad generationem insufficiens emissio.

Dyspermatismus, S. G. 260.

Sterilitas, L. 171. *Sag.* G. 211.

Agenesia, V. 283.

Species sunt,

1. Dyspermatismus (*urethralis*) a morbis urethrae, S. sp. 1.
2. Dyspermatismus (*nodosus*) a nodis corporum cavernosorum, S. sp. 2.
3. Dyspermatismus (*praeputialis*) ab angustiori praeputii orificio, S. sp. 3.
4. Dyspermatismus (*mucosus*) a muco urethram infarciēte, S. sp. 4.
5. Dyspermatismus (*hypertonicus*) a validiori penis erectione, S. sp. 5.
6. Dyspermatismus (*epilepticus*) ab epilepsia spasmodica in coitu adveniente, S. sp. 6.
7. Dyspermatismus (*apraetodes*) a genitalium ignavia, S. sp. 7.

8 Dyſpermatifmus (*refluus*) in qua nulla feminis in coitu emiſſio, ob refluxum ejusdem ex urethra in veſicam, S. ſp. 9.

De dyſpermatifmo ſeroſo, S. ſp. 8. mihi non fatis conſtat.

## G. CXXVI. A M E N O R R H O E A.

Menſes tempore quo fluere ſolent, vel ſolito parcioreſ, vel non omnino fluentes, citra graviditatem.

Amenorrhoea, V. 130.

Dyſmenorrhoea, L. 168. *Sag.* G. 218.

Species ſunt,

1. Amenorrhoea (*emanſionis*) in puberibus quibus poſt fluxus tempuſ ſolituſ, menſes, non jam prodierint, et cum ſimul variae affectiones morbidae adſint.

2. Amenorrhoea (*suppressionis*) in adultis, quibus menses, quae jam fluere solebant, suppressae sunt.
3. Amenorrhoea (*difficilis*) in qua menses parcius et cum dolore fluunt.

Menorrhagia difficilis, S. sp. 1.



## O. VI. T U M O R E S.

Partis magnitudo aucta sine phlogosi.

Tumores protuberantes, L.

## G. CXXVII. A N E U R I S M A.

Tumor mollis, pulsans, supra arteriam.

Aneurisma, S. G. 32. L. 282. V. 408. *Sag.* G. 35.

## G. CXXVIII. V A R I X.

Tumor mollis, non pulsans, supra venam.

Varix, S. G. 33. L. 282. V. 407. *Sag.* G. 36.

## G. CXXIX. E C C H Y M O M A.

Tumor diffusus, parum eminens, livescens.

360 G E N E R A M O R B O R U M

Ecchymoma, S. G. 6. V. 451. *Sag.* G. 5.

Sugillatio, L. 230.

G. CXXX. S C H I R R U S.]

Partis, plerumque glandulae, tumor durus,  
non dolens, aegre suppurans.

Schirrus, S. G. 14. L. 283. V. 374. *Sag.* G. 19.  
*Boerb.* 392.

G. CXXXI. C A N C E R.

Tumor schirrodeus dolens, in ulcus mali  
moris abiens.

Cancer, S. G. 20. V. 375. *Boerb.* 492. *Sag.*  
G. 25.

G. CXXXII. B U B O.

Glandulae conglobatae tumor suppurans.

Bubo, L. 271.

Bubo, S. G. 16. V. 368. *Sag.* G. 21.

Parotis, S. G. 17. V. 370. *Sag.* G. 22.

## G. CXXXIII. S A R C O M A.

Extuberatio mollis, non dolens.

Sarcoma, S. G. 23. L. 294. V. 376. *Sag.* G.  
28.

Polypus, V. 377.

Porrus, V. 427.

## G. CXXXIV. V E R R U C A.

Extuberatio durior, scabra.

Verruca, S. G. 25. L. 277. V. 426. *Sag.* G.  
30.

## G. CXXXV. C L A V U S.

Cuticulae crassities dura, lamellata.

Clavus, L. 278. V. 428.

Callus five Tylloma, V. 429.

## G. CXXXVI. L U P I A.

Extuberatio subter cutem mobilis, mollis,  
non dolens.

Lupia, S. G. 37. *Sag.* G. 40.

Atheroma, L. 285.

Encystis, V. 420.

### G. CXXXVII.    G A N G L I O N.

Extuberatio durior, mobilis, tendini insidens.

Ganglion, L. 287. V. 379.

### G. CXXXVIII.    H Y D A T I S.

Vesicula cuticularis humore aqueo plena.

Hydatis, S. G. 34. *Sag.* G. 38.

Phlyctaena, L. 273. V. 442.

### CXXXIX.    H Y D A R T H R U S.

Articulorum, genu potissimum, tumor, parum primo eminens, cuti concolor, dolentissimus, et mobilitatem imminuens.

Hydarthrus, S. G. 38.

Anglis, a WHITE SWELLING.

## G. CXL. E X O S T O S I S.

Tumor durus offi infidens.

Exostosis, S. G. 29. L. 290. V. 417. *Sag. G.*

34.

Hyperostosis, V. 418.

## O. VII. ECTOPIÆ\*,

Pars ex sua fede dimota tumorem faciens.

Ectopiae, S. Cl. I. O. VI. *Sag.* Cl. I. O. VI.

## G. CXLI. HERNIA.

Partis mollis ectopia, cute et aliis integumentis adhuc tecta.

Hernia, L. 291. *Gaub.* Pathol.

## G. CXLII. PROLAPSUS.

Partis mollis ectopia nuda.

Prolapsus, L. 292.

Prolapsus et procidentia, *Gaub.* Pathol.

\* Ectopiarum genera et species, quantum ad pathologiam pertinent, opera solertissimi CUSSONI, enumerata in primo hujus synopsis tomo, pag. 15. et seq. inveniri, et summo cum fructu perlegi possunt.

## G. CXLIII. L U X A T I O.

Os ex sua in juncturis fede dimotum.

Luxatio, *Gaub.* 226. V. 472.

Exarthrema, S. 60. *Sag.* G. 67.

Diafasis, S. 61. *Sag.* G. 68.

Luxatura, L. 236.

## O. VIII. DIALYSES.

Solutio continui visu tactuve manifesta.

Plagae, S. Cl. I. O. VII. *Sag.* Cl. II.

Vitia dialytica et solutiones continui, L. Cl. XI.  
O. II.

Exulcerationes, L. Cl. XI. O. III.

Diffolutiones, V. Cl. X. O. VI.

## G. CXLIV. VULNUS.

Soluta unio recens, cruenta, partis mollis, a corpore duro moto.

Vulnus, S. G. 63. L. 240. V. 465. *Sag.* G. 78.  
*Boerb.* 145.

Punctura, S. G. 64. L. 243. *Sag.* G. 79.

Laceratura, L. 242.

Amputatura, S. G. 70. L. 243. *Sag.* G. 86.

## G. CXLV. ULCUS.

Partis mollis solutio purulenta vel ichorosa.



Ulcus, S. G. 71. L. 249. *Sag.* G. 89,

Exulceratio, S. G. 72. *Sag.* G. 90.

Sinus, S. G. 73. V. 492. *Sag.* G. 92.

Fistula, S. G. 74. L. 254. V. 491. *Sag.* G. 91.

*Boerh.* 413.

Cacoethes, L. 250. V. 485.

Phagedaena, V. 488.

Noma, L. 251. V. 489.

Carcinoma, L. 252. V. 487.

Ozaena, L. 253. V. 500.

Therioma, V. 486.

Sycosis, V. 490.

## G. CXLVI. H E R P E S.

Phlyctænae vel ulcuscula plurima, gregalia, serpentina, dysepuleta.

Herpes, S. G. 7. L. 268. V. 443. *Sag.* G. 11.

## G. CXLVII. T I N E A.

In cute capillata ad radices capillorum, ulcuscula humorem in crustam albam friabilem abeuntem, fundentia.

Tinea, L. 263. V. 497. *Sag.* G. 131.

G. CXLVIII. P S O R A.

Pustulae et ulcuscula pruriginosa, contagiosa, manus male habentia.

Pfora, L. 265.

Scabies, S. G. 304. V. 444. *Sag. G.* 130.

G. CXLIX. F R A C T U R A.

Offis partes a cohaesione in magna fragmenta vi solutae.

Fractura, S. G. 67. L. 235. V. 468. *Sag. G.* 98. *Boerh.* 339.

G. CL. C A R I E S.

Offis exulceratio.

Caries, S. G. 77. L. 255. V. 493. *Sag. G.* 94.

# EMENDANDA ET ADDENDA

in Tomo Secundo.

Page 60. lin. 13. *pro* 699. *lege* 323.

p. 65. l. 7. *post* 20. *adde* Sag. G. 321.

p. 71. l. 16. *post* Typhus *adde* (*petechialis* )

p. 77. l. 12. *post* Typhus *adde* (*icterodes.* )

p. 85. l. 12. *pro* N. *lege* V.

p. 96. l. 11. *post* Cynanche *adde* (*pharyngaea.* )

p. *ead.* l. 19. *post* Cynanche *adde* (*parotidaea.* )

p. 188. l. 3. a fine, *pro* recensetur *lege* invenerit.

p. 109. l. 4. *post* Peritonitis *adde* (*propria* )

p. *ead.* l. 10. *post* Peritonitis *adde* (*omentalis* )

p. 110. l. 1. *post* Peritonitis *adde* (*mesenterica.* )

p. 119. *post* l. 6. *adde*

Lumbago, S. G. 212. Sag. G. 169.

Ischias, S. G. 213. Sag. G. 170.

Pleurodyne, S. G. 148. Sag. G. 254.

p. 137. l. 11. *pro* I. *lege* II.

p. 154. l. 1. *pro* XXXVII. *lege* XXXVI.

p. 156. l. 4. *pro* XXXVIII. *lege* XXXVII.

p. 160. l. 17. *pro* XL. *lege* XXXVIII.

p. 161. *inter* l. 12. *et* 13. *insere* Marisca, S. G. 35.

Sag. G. 37.

p. 163. l. 5. *pro* XLI. *lege* XXXIX.

p. 171. *post* l. 3. *adde* V. CL. II.

A a a

Page *ead.* lin. 4. *pro* XLII. *lege* XL.

p. 177 l. 12. *pro* XLIII *lege* XLI.

p. 182. l. 10. *pro* XLIV. *lege* XLII.

p. 211. l. 5 *pro* nec alius *lege* nec alius.

p. 226. *post* l. ult. *adde* Orthopnoes, S. G. 146. L. 162.

V. 269. *Sag.* G. 253.

p. 250. l. 14. *pro* Heycham *lege* Heytham.

p. 294. l. 5. *pro* LXXVII. *lege* LXXXVII.

p. 300. l. 5. *post* Plagae *adde* S. CL. I. O. VII.

p. 301. *post* l. 5. *adde*

Hallucinationes, S. CL. VIII. O. I. *Sag.* CL. XIII.

O. I.

Privativi, L. CL. VI. O. III.

p. 305. *inter* l. 2. et 3. *insere*

Mydriasis, V. 237.

p. 309. l. 2. *post* Haemalopia *adde* V. 289.

p. 315. l. 6. *pro* Ageustia *lege* Agheustia.

p. 316. l. 2. *post* abolutus *adde*

Anaesthesia, S. G. 161. L. 118. *Sag.* G. 267.

Anodynia, V. 274.

p. 327. *post* l. 3. *adde*

Dyscinesiae, S. CL. VI. O. III. *Sag.* CL. IX. O. III.

p. 331. l. 9. *pro* Rhenophania *lege* Rhenophonia.

p. 348. *post* l. 2. *adde*

Epischeses, V. CL. III.

Suppressorii, L. CL. VIII. O. II.

Suppressiones, *Sag.* Cl. VI.

Page 353. *pro* Cryptopyca *lege* Cryptopyica.

p. 359. l. 3. *post* L. *adde* CL. X O. V.

p. 360. l. 13. *pro* CXXII. *lege* CXXXII.

p. 362. l. 8. *pro* CXXXVII. *lege* CXXXVIII.

p. 365. l. 4. *pro* 236. *lege* 237.

p. 367. *post* l. 10. *insere*

Achor. L. 265. V. 494.

Crusta lactea, V. 494.

# I N D E X

## CLASSIUM ET ORDINUM.

*Numeri post literas S. L. V. et Sag. paginas tomi primi; post C. paginas tomi secundum, indicant.*

**A** DYNAMIÆ, V. 183. C. 197. et 323.

**A** Aerifluxus, S. 63. Sag. 297.

Agitatorii, L. 110.

Alvi fluxus, S. 59. Sag. 291.

Alvi fluxus non sanguinolenti, S. 60. Sag. 292.

Alvi fluxus sanguinolenti, S. 59. Sag. 291.

Anepithymiae, S. 43. Sag. 316. C. 323.

Anhelationes, S. 39. Sag. 310.

Anhelationes oppressivae, S. 40.

Anhelationes suppressivae, Sag. 311.

Apocenosæ, V. 166. C. 339.

Cachexiae, S. 65. V. 194. Sag. 271. C. 265.

Cachexiae anomalaë, S. 81. Sag. 280.

Clonici generales, S. 37. Sag. 307.  
Clonici partiales, S. 35. Sag. 305.  
Comata, S. 46. Sag. 319. C. 182.  
Concretiones, V. 224.  
Continentes, L. 90. C. 68.  
Continuae, S. 26. V. 151. Sag. 337. C. 66.  
Constrictorii, L. 116.  
Critici, L. 90. C. 44.  
Cystides, S. 13. Sag. 254.

Debilitates, S. 42. Sag. 314.  
Decolores, L. 124.  
Defectivi, L. 105. C. 197.  
Deformationes, L. 136.  
Deformes, L. 122. C. 263.  
Deformitates, V. 230. Sag. 263.  
Deliria, S. 56. Sag. 347. C. 253.  
Dialyses, C. 366.  
Dialytica, L. 126.  
Diffolutiones, V. 218. C. 366.  
Dolores, S. 48. V. 171. Sag. 283.  
Dolorosi, L. 97.  
Dolorosi extrinseci, L. 99.

Dolorosi intrinseci, L. 97.

Dysaesthesiae, S. 42. Sag. 314. C. 301.

Dyscinesiae, S. 44. Sag. 316. C. 327.

Dyforexiae, C. 317.

Ectopiae, S. 14. Sag. 256. C. 364.

Efflorescentiae, S. 8. Sag. 248.

Emaciantes, L. 122. C. 263.

Epischeses, V. 170. C. 348.

Evacuatorii, L. 117. C. 339.

Exacerbantes, L. 91. C. 46.

Exanthemata, Sag. 322. C. 130.

Exanthematicae, S. 29. V. 154. C. 131.

Exanthematici, L. 87. C. 131.

Excrefcentiae, S. 11. Sag. 252.

Extuberantiae, V. 212.

Exulcerationes, L. 128. C. 366.

Febres, S. 26. V. 149. Sag. 337. C. 44.

Fluxus, S. 58. Sag. 290. C. 339.



- Haemorrhagiae, V. 164. C. 153.  
Hallucinationes, S. 54. Sag. 342.  
Humoralia, L. 125.  
Hydropes, C. 274.  
Hydropes partiales, S. 66. Sag. 274.  
Hyperaesthesiae, V. 191. C. 317.  
  
Icteriae, S. 80. Sag. 279.  
Ideales, L. 101. C. 253.  
Imaginarii, L. 102.  
Impetigines, S. 79. Sag. 277. C. 290.  
Inflammationes, V. 201.  
Intermittentes, S. 28. V. 149. L. 90. Sag.  
340. C. 45.  
Intumescuntiae, S. 65. Sag. 272. C. 270.  
  
Leipopsychiae, S. 45. Sag. 318. C. 197.  
Locales, C. 300.  
  
Macies, S. 65. Sag. 271. C. 265.  
Maculae, S. 7. L. 138. V. 216. Sag. 247.  
Marcores, C. 265.  
Mentales, L. 101.

Morositates, S. 55. Sag. 344. C. 317.

Motorii, L. 109. C. 209.

Neuroses, C. 181.

Paranoiae, V. 199. C. 253.

Pathetici, L. 102. C. 317.

Phlegmasiae, S. 29. Sag. 329. C. 82.

Phlogistici, L. 93. C. 83.

Phymata, S. 9. Sag. 250.

Plagae, S. 23. Sag. 265. C. 300. et 366.

Privativi, L. 107. C. 301. et 323.

Procidentiae, L. 135.

Profluvia, V. 164. C. 171.

Pustulae et Papulae, V. 214.

Pyrexiae, C. 43.

Quietales, L. 105.

Remittentes, S. 27. Sag. 339. C. 45.

Sanguifluxus, S. 58. Sag. 290. C. 153.

- Scabies, L. 130.  
Serifluxus, S. 61. Sag. 295.  
Solutiones, Sag. 263.  
Soporosi, L. 106. C. 182.  
Spasmi, S. 34. V. 177. Sag. 303. C. 209.  
Spastici, L. 109.  
Suffocatorii, L. 113.  
Suppressiones, Sag. 299.  
Supprefforii, L. 113.  
  
Tonici generales, S. 35. Sag. 304.  
Tonici partiales, S. 34. Sag. 303.  
Tubera, S. 78. Sag. 276.  
Tumidosi, L. 123. C. 270.  
Tumores, V. 202. C. 359.  
  
Vefaniae, S. 54. Sag. 342. C. 252.  
Vitiae, S. 7. L. 125. V. 201. Sag. 247. C.  
300.

# INDEX GENERUM.

- A**BORTIO, V. 97 C. 39  
 Abortus, S. 245 L. 204 *Sag.* 180 C. 39  
 Abscessus, L. 232 V. 354 C. 7  
 Acatapofis, V. 149  
 Achlys, V. 242 C. 92  
 Achor, L. 265 V. 494 C. 145  
 Acrochordon, V. 426  
 Acyefis, V. 282  
 Addephagia, V. 297 C. 101  
 Adiapneustia, *Sag.* 210  
 Adipsia, S. 163 L. 117 V. 281 *Sag.* 269 C. 108  
 Adynamia, V. 225  
 Aedopsophia, S. 273 *Sag.* 208  
 Aegilops, V. 499  
 Aestus volaticus, V. 220  
 Agalaxis, V. 133  
 Agenesia, V. 283 C. 109, 125  
 Ageustia, L. 114 C. 99  
 Agheustia, S. 157 *Sag.* 263 C. 99  
 Aglaetatio, L. 170 *Sag.* 214  
 Aglutitio, L. 164  
 Agomphyasis, V. 482  
 Agrypnia, S. 238 L. 130 V. 286 *Sag.* 351  
 Algor, S. 191 *Sag.* 150  
 Allotriophagia, V. 299 C. 103  
 Alopecia, S. 312 L. 315 V. 525 *Sag.* 138  
 Amatoria, V. 17  
 Amaurosis, S. 155 L. 110 V. 238 *Sag.* 261 C. 93

- Amblyopia, S. 154 L. 108 V. 236 *Sag.* 258 C. 93, 94  
 Ambustio, *Sag.* 97  
 Amenorrhoea, V. 130 C. 126  
 Amentia, S. 233 L. 67 V. 337 *Sag.* 346 C. 65, 67  
 Amnesia, S. 237 *Sag.* 350 C. 65  
 Amphemerina, S. 84 L. 20 *Sag.* 321 C. 3  
 Amputatio, *Sag.* 86  
 Amputatura, S. 70 L. 241 C. 144  
 Anacatharsis, S. 262 *Sag.* 198 C. 40  
 Anaesthesia, S. 161 L. 118 *Sag.* 267 C. 100  
 Anaphrodisia, S. 164 *Sag.* 270 C. 109  
 Anapleuris, V. 478  
 Anasarca, S. 281 L. 215 V. 313 *Sag.* 108 C. 75  
 Anatrope, V. 280  
 Anchyloblepharon, V. 504  
 Anchyloglossum, V. 507  
 Anchylomerisma, *Sag.* 76  
 Anchylops, V. 364  
 Anchylosis, L. 286 V. 508  
 Aneurisma, S. 32 L. 281 V. 408 *Sag.* 35 C. 127  
 Angina, S. 147 L. 46 V. 49 *Sag.* 217 C. 10  
 ——— convulsiva, V. 196  
 Angone, V. 196  
 Anhelatio, L. 157  
 Anoia, V. 337  
 Anodynia, V. 284 C. 100  
 Anorexia, S. 162 L. 116 V. 279 *Sag.* 268 C. 107, 45  
 Anosmia, S. 156 L. 113 V. 248 *Sag.* 262 C. 98  
 Anthrax, S. 19 L. 272 V. 353 *Sag.* 24 C. 7  
 Antipathia, S. 225 L. 88 V. 285 *Sag.* 337

- Anxietas, S. 187 L. 89 V. 134 *Sag.* 146  
 Apella, L. 311 V. 546 *Sag.* 73  
 Apepsia, V. 276 C. 45  
 Aponia, S. 166 L. 115 V. 253 *Sag.* 272 C. 118  
 Aphtha, S. 100 L. 9 V. 501 *Sag.* 298 C. 35  
 Aphthosa, V. 44 C. 35  
 Apnoea, V. 265  
 Apogeusis, V. 249 C. 99  
 Apogeusia, V. 294  
 Apomyttosis, S. 127 *Sag.* 234  
 Apoplexia, S. 182 L. 101 V. 229 *Sag.* 288 C. 42  
 Apoplectica, V. 72  
 Apostema, S. 39 *Sag.* 42 C. pag. 86  
 Apofyrma, V. 477  
 Aquula, V. 445  
 Archoptoma, V. 395  
 Arctura, L. 261  
 Ardor, S. 192. *Sag.* 151  
 Argemon, V. 498  
 Aridura, S. 278 L. 227 *Sag.* 104  
 Artetiscus, V. 554  
 Arthritis, S. 183 L. 60 V. 139 *Sag.* 142 C. 24  
 Arthrocece, S. 78 L. 256 *Sag.* 95 C. 7  
 Arthrodynia, C. p. 122  
 Arthropuosis, C. 25  
 Afaphia, V. 250 C. 112  
 Ascites, S. 288 L. 217 V. 314 *Sag.* 115 C. 79  
 Asphyxia, S. 175 L. 95 V. 275 *Sag.* 281 C. 44  
 Astodes, V. 27  
 Asthenia, S. 172 L. 92 V. 223 *Sag.* 278

- Asthma, S. 145 L. 161 V. 268 *Sag.* 252 C. 55  
 Atecnia, L. 119 C. 109  
 Atheroma, L. 285 V. 420 C. 136  
 Athymia, V. 329 C. 66  
 Atochia, V. 172  
 Atonia, L. 120 C. 43  
 Atreta, L. 312 V. 549  
 Atrophia, S. 277 L. 210 V. 308 *Sag.* 102 C. 70  
 Attritio, V. 475  
 Aurigo, S. 306 *Sag.* 132 C. 91

## B

- Bacchia, L. 270 *Sag.* 9 C. 7.  
 Balbuties, V. 259  
 Batrachus, V. 80.  
 Battarismus, V. 261 C. 113  
 Beriberia, S. 137 L. 140 *Sag.* 244  
 Blaefitas, V. 258  
 Blepharoptosis, S. 43 *Sag.* 46  
 Blepharotis, V. 342  
 Blestrismus, V. 135  
 Boa, V. 446  
 Bombus, V. 302  
 Borborigmus, L. 123  
 Bronchocele, S. 28 V. 369  
 Bubo, S. 16 L. 271 V. 368 *Sag.* 21 C. 132  
 Bubonoccele, V. 396 *Sag.* 58  
 Bulimia, S. 223 L. 79 *Sag.* 335 C. 101  
 Bulimus, V. 296 C. 101  
 Bullofa, V. 41 C. 34

## C

- Cachexia, L. 221 V. 304  
 Cacoethes, L. 250 V. 485 C. 145  
 Cacophonia, *Sag.* 274 C. 112  
 Cacositia, L. 87  
 Caligo, S. 153 V. 288 *Sag.* 259 C. 92  
 Callus, V. 429 C. 135  
 Calvities, V. 529  
 Cancer, S. 20 V. 375 *Sag.* 25 C. 131  
 Canities, V. 525  
 Capistrum, V. 208 C. 49  
 Caput obstipum, V. 513 C. 115  
 Carcinoma, S. 296 L. 252 V. 487 *Sag.* 122 C. 145  
 Cardialgia, S. 202 L. 48 V. 157 *Sag.* 160 C. 45  
 Cardiognmus, S. 201 V. 152 *Sag.* 159  
 Carditis, S. 111 V. 54 *Sag.* 302 C. 13  
 Carebaria, V. 144  
 Caries, S. 77 L. 255 V. 493 *Sag.* 94 C. 150  
 Carphologia, S. 125 L. 135 V. 330 *Sag.* 231  
 Carus, S. 181 L. 100 V. 231 *Sag.* 287 C. 42  
 Cataclasis, V. 202  
 Catalepsis, S. 176 L. 129 V. 230 *Sag.* 282 C. 42  
 Cataphora, S. 180 L. 99 V. 232 *Sag.* 286 C. 42  
 Cataplexis, V. 137  
 Cataracta, S. 152 L. 109 V. 239 *Sag.* 260 C. 92  
 Catarrhalis, V. 73  
 Catarrhexis, V. 91  
 Catarrhus, S. 186 V. 98 *Sag.* 145 C. 40  
 ——— suffocativus, V. 270  
 Catoche, V. 230



- Catochus, S. 123 L. 128 V. 183 *Sag.* 229 C. 48  
Causos, V. 20  
Cedma, V. 168  
Celfa, V. 303  
Cephaloea, S. 194 V. 141 *Sag.* 153  
Cephalalgia, S. 193 L. 40 V. 140 *Sag.* 152  
Cephalitis, S. 109 *Sag.* 310 C. 9  
Cercosis, V. 535  
Cerion, V. 496  
Chemosis, V. 46 C. 8  
Chilon, V. 366  
Chiragra, V. 139  
Chlorosis, S. 309 L. 222 V. 305 *Sag.* 135 C. 47  
Cholera, S. 253 L. 186 V. 110 *Sag.* 188 C. 60  
Cholerica, L. 190 V. 28 C. 61  
Cholosis, V. 536  
Chorea, L. 139 V. 193 C. 51  
Chylaria, V. 117  
Cicatrix, L. 317 V. 509  
Cillofis, V. 203  
Cinclefis, V. 201  
Cionis, V. 150  
Cirfocele, V. 409  
Citta, L. 78 C. 103  
Clamor, V. 206  
Clangor, V. 251 C. 112  
Claudicatio, S. 131 *Sag.* 238  
Clavus, L. 278 V. 142 428 C. 135  
Clitorismus, L. 298  
Clunefia, V. 167 C. 7  
Cocyta, L. 257

- Coeliaca, S. 255 L. 189 V. 109 *Sag.* 190 C. 61  
Coilima, V. 373  
Colica, S. 204 L. 50 V. 160 *Sag.* 162 C. 59  
Coloboma, V. 534  
Colpocele, *Sag.* 61  
Colpoptosis, *Sag.* 53  
Coma, V. 232 C. 42  
Combustura, L. 245 C. 7  
Condyloma, S. 24 L. 293 V. 378 *Sag.* 29  
Contraclura, S. 119 L. 299 *Sag.* 225 C. 115  
Contusio, S. 66 V. 480 *Sag.* 83  
Contusura, L. 238  
Convulsio, S. 128 L. 142 V. 191 *Sag.* 235 C. 50  
Cophosis, S. 160 L. 112 *Sag.* 266 C. 96  
Coryza, S. 260 L. 174 V. 100 *Sag.* 196 C. 40  
Crampus, S. 120 V. 194 *Sag.* 226  
Crepitus, L. 194  
Cripforchis, V. 551  
Crithe, V. 434  
Cruſta lactea, V. 495 C. 145  
Cyasma, V. 461  
Cynanche, S. 110 L. 33 *Sag.* 300 C. 10  
Cynorexia, V. 298 C. 101  
Cyphosis, V. 512  
Cyrtonia, V. 405  
Cyflotia, V. 71  
Cystirrhagia, V. 93 C. 39  
Cystitis, S. 108 L. 31 V. 66 *Sag.* 309 C. 20  
Cystocele, S. 56 V. 404  
Cystoptosis, V. 394

## D

- Dacryoma, V. 506  
 Dactylion, V. 510  
 Daemonia, L. 69 C. 66  
 Daemonomania, S. 236 *Sag.* 348 C. 66  
 Decimana, V. 9 C. 2  
 Delirium, V. 330 L. 65  
 Deuteria, V. 132  
 Diabetes, S. 263 L. 197 V. 115 C. 62 *Sag.* 199  
 Diabrosis, V. 481  
 Diachalasis, V. 474  
 Diaphora, V. 278 C. 45  
 Diaphragmitis, *Sag.* 304 C. 11  
 Diaria, L. 11 C. 4  
 Diarrhoea, S. 254 L. 187 V. 105 *Sag.* 189 C. 61  
 Diastrasis, S. 61 *Sag.* 68 C. 143  
 Digitium, L. 227 V. 221 *Sag.* 173 C. 115  
 Dionysiscus, V. 553  
 Diplopia, S. 218 *Sag.* 330 C. 95  
 Distortio, L. 302  
 Distrix, V. 526  
 Diuresis, V. 114 C. 62  
 Duplicana, L. 18 C. 1, 2  
 Dyscoeca, S. 158 V. 246 *Sag.* 264 C. 96  
 Dysenteria, S. 248 L. 191 V. 107 *Sag.* 183 C. 41  
 Dyslochias, L. 169 V. 131 *Sag.* 215  
 Dyshaemorrhoids, *Sag.* 220  
 Dysmenorrhoea, L. 168 V. 170 *Sag.* 218 C. 126

- Dyfodia, S. 274 V. 125 *Sag.* 209  
 Dyfopia, V. 291 C. 94  
 Dyspepsia, V. 277 C. 45  
 Dyspermatismus, S. 269 C. 125  
 Dysphagia, S. 199 *Sag.* 216  
 Dyspnoea, S. 144 L. 160 V. 267 *Sag.* 251 C. 56  
 Dystocia, S. 208 V. 171 *Sag.* 219  
 Dysuria, S. 265 L. 57 V. 164 *Sag.* 213 C. 124

## E

- Ecchymoma, S. 6 V. 451 *Sag.* 5 C. 129  
 Eclampsia, S. 133 V. 189 *Sag.* 240 C. 53  
 Ecphyse, V. 124  
 Ecplexis, V. 334  
 Ecstasis, S. 177 V. 333 *Sag.* 283 C. 42  
 Ecthymma, V. 475  
 Ecthymata, V. 360  
 Ectropium, L. 296 V. 518  
 Eilema, V. 161  
 Elcosis, S. 313 *Sag.* 139  
 Elephantia Arabum, V. 322 C. 87  
 Elephantiasis, S. 304 V. 321 *Sag.* 128 C. 87  
 Elodes, V. 21  
 Elytrocele, V. 402  
 Emphysema, S. 13 L. 228 V. 392 *Sag.* 18 C. 72  
 Empyema, S. 151 L. 159 V. 358. *Sag.* 257 [C. p.  
 107  
 Encanthis, V. 430  
 Encauma, V. 450

- Encaufis, V. 158, 347, C. 7  
 Encephalocele, S. 57 V. 383 *Sag.* 63  
 Encystis, V. 420 C. 136  
 Enteritis, S. 105 L. 29 V. 57. *Sag.* 307 C. 16  
 Enterocoele, S. 50  
 ———— ovularis, V. 400  
 Enthusiasmus, V. 335  
 Entropium, V. 519  
 Enuresis, S. 264 L. 195 V. 113 *Sag.* 200 C. 120  
 Ephelis, S. 3 L. 325 V. 438 *Sag.* 3  
 Ephemera, S. 79 C. 4  
 Ephialtes, S. 138 L. 163 *Sag.* 245 C. 68  
 Ephidrosis, S. 258 *Sag.* 194 C. 117  
 Epiala, V. 19  
 Epidosis, *Sag.* 75  
 Epilepsia, S. 134 L. 143 V. 188 *Sag.* 241 C. 53  
 Epinyctis, S. 8 V. 441 *Sag.* 12  
 Epiphlogisma, V. 176  
 Epiphora, S. 259 L. 172 V. 99 *Sag.* 195 C. 118  
 Epiplocele, S. 51  
 Epiploitis, S. 106 *Sag.* 308 C. 14  
 Epistaxis, V. 82 C. 36  
 Episthotonos, V. 182 C. 48  
 Epulis, V. 363  
 Erotomania, L. 82 C. 66  
 Errana, L. 19 C. 2  
 Erratica, S. 90 C. 2 *Sag.* 327  
 Erysipelacea, V. 68 C. 26  
 Erysipelas, S. 97 L. 10 V. 343 *Sag.* 296 C. 26, 7  
 Erythema, S. 11 *Sag.* 16 C. 7

- Eschara, S. 76 L. 280 V. 483 *Sag.* 93  
 Esoche, V. 439  
 Effera, S. 99. *Sag.* 297  
 Exania, S. 47 *Sag.* 50  
 Exarthrema, S. 60 *Sag.* 67 C. 143  
 Excoriatio, S. 65 *Sag.* 82  
 Excoriatura, L. 246  
 Exoche, V. 440  
 Exocyste, S. 48  
 Exocystis, *Sag.* 51  
 Exomphalus, S. 40 *Sag.* 43  
 Exoneirofis, V. 120  
 Exophthalmia, S. 42 *Sag.* 45  
 Exostosis, S. 29 L. 290 V. 417 *Sag.* 34 C. 140  
 Expectoratio, L. 178 C. 40  
 Exulceratio, S. 72 *Sag.* 90 C. 145

## F

- Fatuitas, V. 336 C. 65  
 Favus, V. 496  
 Fissura, S. 68 V. 469 *Sag.* 99  
 Fistula, S. 74 L. 254 V. 491 *Sag.* 91 C. 145  
 Flatulentia, S. 272 L. 165 V. 127 *Sag.* 207 C. 45  
 Flemen, V. 425  
 Fletus, L. 149  
 Fractura, S. 67 L. 235 V. 468 *Sag.* 98 C. 149  
 Framboesia, S. 299 *Sag.* 125 C. 89  
 Frigeraria, *Sag.* 318

- Frigus, V. 185  
Fungus, V. 423  
Furor uterinus, V. 331  
Furunculus, S. 18 V. 352 *Sag.* 23 C. 7

## G.

- Galactia, L. 206 V. 122  
Galactirrhoea, S. 270 *Sag.* 205  
Galbulus, V. 559  
Galiancon, V. 558  
Ganglion, L. 287 V. 379 C. 137  
Gangraena, S. 314 L. 233 V. 327 *Sag.* 140. C. p.  
87  
Gastrica, L. 49  
Gastritis, S. 104 L. 28 V. 56 *Sag.* 306 C. 15  
Gastrocele, S. 52 V. 410 *Sag.* 54  
Gastrodynia, S. 203 *Sag.* 161 C. 45  
Gelasmus, V. 210  
Gibber, L. 300 V. 512  
Gibbositas, S. 30 *Sag.* 70  
Glaucoma, V. 241 C. 92  
Glossiagra, V. 138  
Glossocele, V. 197  
Glossocoma, V. 198  
Glus, L. 199 V. 117 C. 124  
Gonagra, V. 139  
Gongrona, V. 371  
Gonorrhoea, S. 268 L. 200 V. 118 *Sag.* 204 C. 121  
Grando, V. 435

- Gravedo, L. 42 V. 126 C. 40  
 Graviditas, S. 284 L. 220 *Sag.* 111  
 Gryposis, V. 537  
 Gutta rosea, S. 4 C. 7  
 ——— rosea, V. 437 C. 7

## H

- Haemalopia, V. 289 C. 95  
 Haemataporia, *Sag.* 103  
 Haematemefis, S. 242 L. 184 V. 89 *Sag.* 177 C. 39  
 Haematopedefis, V. 95  
 Haematuria, S. 243 L. 198 V. 92 *Sag.* 178 C. 39  
 Haemeropathos, *Sag.* 13  
 Haemodia, V. 146  
 Haemoptoe, V. 83 C. 37  
 Haemoptysis, S. 240 L. 179 V. 84 *Sag.* 175 C. 37  
 Haemorrhagia, S. 239 L. 173 V. 81 *Sag.* 174 C. 36,  
 116  
 Haemorrhoidalis, V. 75  
 Haemorrhoids, S. 247 L. 192 *Sag.* 182 C. 38  
 Hætica, S. 83 L. 24 V. 80 *Sag.* 320 C. p. 80  
 Hemalopia, V. 245  
 Hemerolopia, V. 244  
 Hemicrania, S. 195 L. 41 V. 143 *Sag.* 154  
 Hemiplegia, S. 170 L. 103 V. 228 *Sag.* 276 C. 43  
 Hemitritæa, L. 23 C. 1  
 Hepatalgia, S. 205 *Sag.* 163  
 Hepatica, L. 51  
 Hepatirrhoea, S. 246 V. 90 *Sag.* 181 C. 61  
 Hepatitis, S. 113 L. 35 V. 38 *Sag.* 312 C. 17



- Hepatizon, L. 323  
 Hepatocele, S. 53 V. 411  
 Hermaphroditus, V. 552  
 Hernia, L. 291 C. 141  
 Herpes, S. 7 L. 268 V. 443 *Sag.* 11 C. 146]  
 Hidroa, S. 10 V. 446  
 Hieranosos, L. 144 V. 190 C. 50  
 Hieropyr, V. 344 C. 7  
 Himantosis, V. 151  
 Hippos, L. 137 V. 199  
 Hirfuties, L. 314 V. 524 *Sag.* 77  
 Hordeolum, S. 27 L. 276 V. 434 *Sag.* 32 C. 7  
 Horror, V. 186  
 Humoraria, *Sag.* 317  
 Hydarthrus, S. 38 *Sag.* 41 C. 139  
 Hydatis, S. 34 *Sag.* 37 C. 138  
 Hydrenterocele, V. 406  
 Hydroa, *Sag.* 15  
 Hydrocele, V. 388 C. 81  
 Hydrocephalum, V. 384 C. 76  
 Hydrocephalus, S. 285 L. 216 V. 384 *Sag.* 112  
     C. 76  
 Hydrociftis, V. 315  
 Hydrometra, S. 289 *Sag.* 116 C. 80  
 Hydromphalos, S. 387  
 Hydropedefis, V. 121 C. 117  
 Hydrophobia, S. 231 L. 86 V. 30 *Sag.* 343 C. 64  
 Hydrophthalmia, V. 385  
 Hydrops scroti, V. 389 C. 81  
 Hydrorachitis, S. 287 *Sag.* 114 C. 77

- Hydrothorax, S. 150 V. 311 *Sag.* 256 C. 78  
 Hygrofirfocele, V. 414  
 Hypercatharsis, V. 123  
 Hyperarterifcus, V. 557  
 Hyperostosis, V. 418 C. 140  
 Hypnobatafis, V. 340 C. 68  
 Hypochondriasis, S. 220 L. 76 V. 218 *Sag.* 332  
     C. 46  
 Hypogastrocele, V. 403  
 Hypophasis, V. 234  
 Hypopyon, V. 356  
 Hypofarca, L. 218 C. 82  
 Hypospydiacos, V. 547  
 Hypostaphyle, S. 44 *Sag.* 47  
 Hysteralgia, S. 209 L. 55 V. 169 *Sag.* 166  
 Hysteria, S. 135 L. 126 V. 219 *Sag.* 242 C. 63  
 Hysteritis, L. 38 V. 67 C. 21  
 Hysterocele, S. 55 V. 413  
 Hysteroloxia, S. 58 *Sag.* 65  
 Hysterophyse, V. 315 C. 74  
 Hysteroptosis, S. 49 V. 393 *Sag.* 52

## I.

- Ictericodes, V. 32  
 Icterus, L. 244 V. 306 C. 91  
 Ileus, S. 252 V. 162 *Sag.* 187 C. 59  
 Iliaca, L. 185 C. 59  
 Illofis, V. 200

- Impetigo, V. 462  
 Incubus, V. 211 C. 68  
 Inflammatio, L. 231 *Sag.* 20 C. 7  
 Intertrigo, L. 247 V. 502 C. 7  
 Ionthos, V. 436  
 Ischias, S. 213 V. 138 *Sag.* 170 C. 22  
 Ischiatocele, V. 401  
 Ischiocele, *Sag.* 60  
 Ischnophonia, V. 260 C. 113  
 Ischnotis, V. 541  
 Ischuria, S. 293 L. 167 V. 129 *Sag.* 212 C. 123  
 Judicatoria, *Sag.* 316

## L.

- Labarium, L. 309  
 Labium leporinum, V. 522  
 Laceratura, L. 242 C. 144  
 Lactea, V. 76  
 Lagocheilos, V. 552  
 Lagophthalmia, L. 305 V. 516  
 Lagoftoma, L. 310 *Sag.* 72  
 Languor, L. 91  
 Laparocele, *Sag.* 56  
 Lassitudo, S. 188 L. 9 V. 222. *Sag.* 147  
 Leiopodes, V. 545  
 Leipothymia, S. 173 L. 93 V. 273 C. 44  
 Leipyria, V. 24  
 Lenta, L. 14. V. 79 C. 6

## D d d

- Lentigo, L. 324 V. 455  
 Leontiasis, S. 297 *Sag.* 123  
 Lepra, S. 303 L. 262 *Sag.* 129 C. 88  
 ——— Arabum, V. 321  
 ——— Graecorum, V. 320 C. 88  
 Leptophonia, V. 254 C. 112  
 Lethargus, S. 179 L. 98 V. 22 *Sag.* 285 C. 42  
 Leuce, V. 460  
 Leucoma, S. 1 *Sag.* 1  
 Leucophlegmatia, L. 214 C. 72  
 Leucorrhoea, S. 267 L. 201 V. 119 *Sag.* 202. C. 39  
 Leucorrhoeis, V. 112 C. 38, 61  
 Lichen, V. 462  
 Lienteria, S. 256 L. 188 V. 108 *Sag.* 191 C. 61  
 Lipothymia, *Sag.* 279  
 Lippitudo, L. 266  
 Lithiasis, V. 165  
 Lochiorrhoea, *Sag.* 203  
 Lordosis, S. 31 L. 301 V. 512 *Sag.* 71  
 Loxarthrus, S. 62 *Sag.* 69  
 Lumbago, S. 212 V. 138 *Sag.* 169 C. 22  
 Lupia, S. 37 *Sag.* 39 C. 136  
 Luxatio, V. 472 C. 143  
 Luxatura, L. 237 C. 143  
 Lyngodes, V. 26

## M.

- Macropnoea, V. 266  
 Madarosis, V. 530

- Malacia, V 300 C. 103  
 Malacosteon, V. 523  
 Malis, S. 298 *Sag.* 124  
 Mania, S. 235 L. 68 V. 331 *Sag.* 349 C. 67  
 Marasmus, L. 211 C. 70  
 Marisca, S. 35 *Sag.* 37 C. 38  
 Marmaryge, V. 290. C. 95  
 Mastodynia, S. 210 V. 153 *Sag.* 167 C. 71  
 Mediaстина, V. 52 C. 11  
 Melaena, S. 249 *Sag.* 184  
 Melanchlorus, V. 307  
 Melancholia, S. 234 L. 71 V. 332 *Sag.* 347 C. 66  
 Melasicterus, S. 307 *Sag.* 133  
 Melasma, L. 322 V. 451  
 Meliceris, V. 420  
 Menorrhagia, S. 244 L. 202 V. 96 C. 39  
 Menstrua, V. 11  
 Merocele, V. 399 *Sag.* 57  
 Mesenteritis, V. 60 C. 14  
 Meteorismus, S. 292 *Sag.* 119 C 73  
 Metritis, S. 107 *Sag.* 315 C. 21  
 Metrorrhagia, *Sag.* 179 C. 39  
 Miliaria, C. 31  
 Miliaris, S. 95 L. 7. V. 37 *Sag.* 295 C. 31  
 Mola, L. 205 V. 560  
 Monstrositas, V. 539  
 Morbilli, V. 453 C. 30  
 Morbillofa, V. 36 C. 30  
 Morosis, L. 106 V. 336 C. 65  
 Morphocà, L. 319  
 Morfura, L. 244

- Morfus, *Sag.* 81  
 Morta, L. 1 C. 34  
 Mutitas, S. 165. V. 257 *Sag.* 271 C. 111  
 Mydriasis, V. 237 C. 93  
 Myocilites, V. 63  
 Myopia, L. 309 C. 94  
 Myopiasis, V. 515 C. 94  
 Myositis, *Sag.* 301 C. 22  
 Myrmecium, L. 279 V. 426

## N.

- Naevus, S. 5 L. 318 V. 538 *Sag.* 4  
 Natta, L. 288  
 Nausea, S. 250 L. 182 V. 159 *Sag.* 185 C. 45  
 Nebula, V. 464  
 Necrosis, S. 315 *Sag.* 141  
 Nefrendis, V. 555  
 Nephralgia, S. 207 *Sag.* 165  
 Nephritica, L. 56  
 Nephritis, S. 115 L. 37 V. 65 *Sag.* 314 C. 19  
 Noma, L. 251 V. 489 C. 145  
 Nonana, V. 8 C. 2  
 Nostalgia, S. 226 L. 83 V. 332 *Sag.* 338 C. 106, 66  
 Nyctalopia, L. 306 V. 243  
 Nymphomania, S. 229 *Sag.* 341 C. 105  
 Nyctagmus, S. 124 *Sag.* 230

## O.

- Oblivio, L. 107 V. 338 C. 65  
Obstipatio, L. 166 V. 128 *Sag.* 221 C. 122  
Obstipitas, S. 118 V. 128 *Sag.* 224 C. 115  
Octana, V. 7 C. 2  
Odaxismus, V. 147  
Odontalgia, S. 198 L. 45 V. 145 *Sag.* 157 C. 23  
Odontirrhoea, V. 86  
Oedema, S. 12 L. 229 V. 382 *Sag.* 17  
Oesophagismus, V. 217  
Omentitis, V. 61 C. 14  
Omphalocele, V. 398 *Sag.* 55  
Oneirodynia, C. 68  
Onychia, V. 346  
Onyx, V. 355  
Operatio, *Sag.* 85  
Ophiafis, V. 529  
Ophthalmia, S. 196 L. 43 V. 341 *Sag.* 155 C. 8  
Ophthalmites, V. 47 C. 8  
Ophthalmorrhagia, V. 88  
Opisthotonos, V. 181 C. 48  
Opodeocele, *Sag.* 59  
Orgasmus, L. 133  
Orthopnoea, S. 146 L. 162 V. 269 *Sag.* 253 C. 56  
Oscedo, S. 140 V. 263 *Sag.* 247  
Oscheocele, S. 41 V. 397 C. 81  
Oscheophyma, *Sag.* 44 C. 81  
Oscitans, V. 31  
Oscitatio, L. 151

- Osteocopus, V. 176  
 Ostocopus, S. 184 L. 61 *Sag.* 143  
 Otalgia, S. 197 L. 44 V. 148 *Sag.* 156 C. 7  
 Otitis, V. 48  
 Otoplatos, V. 102  
 Otopuosis, V. 101  
 Otorrhoea, S. 271 L. 171 V. 87 *Sag.* 206  
 Oxyphonia, V. 255 C. 112  
 Ozaena, L. 253 V. 500 C. 145

## P.

- Paedarthrocace, V. 419 C. 7  
 Palpitatio, S. 130 L. 132 V. 213 *Sag.* 237 C. 54  
 Panaritia, V. 70  
 Pancreatica, V. 64  
 Pandiculatio, S. 126 L. 152 V. 264 *Sag.* 233  
 Panophobia, S. 227 L. 75 *Sag.* 339 C. 66  
 Papula, S. pag. 8. L. 275 *Sag.* 7. C. 7  
 Paracentesis, *Sag.* 88  
 Paracusis, S. 159 *Sag.* 265 C. 97  
 Paracyifis, V. 326  
 Paraglossa, S. 45 V. 365 *Sag.* 48  
 Paralysis, S. 169 L. 104 V. 226 *Sag.* 275 C. 43  
 Paraphymosis, V. 349 C. 7  
 Paraphonia, S. 168 C. 112  
 Paraphrenesis, S. 102 L. 26 C. 11  
 Paraphrenitis, V. 55 C. 11  
 Paraphrosyne, S. 232 L. 66 V. 330. *Sag.* 345 C. 67  
 Paraplegia, L. 102 V. 227 *Sag.* 277 C. 43



- Paraplexia, S. 171 C. 43  
Paronychia, S. 21 L. 258 V. 345 *Sag.* 26 C. 7  
Parorchidium, S. 59 *Sag.* 66  
Parotis, S. 17 V. 370 *Sag.* 22 C. 132  
Parturitio, L. 203  
Parulis, V. 362 C. 7  
Pavor, V. 339  
Pelada, V. 529  
Pelioma, V. 451  
Pemphigus, S. 93 *Sag.* 291 C. 34  
Pemphingodes, V. 43  
Periadyxia, V. 155  
Pericarditis, V. 53 C. 13  
Perinaeocele, *Sag.* 62  
Peripneumonia, S. 112 L. 34 V. 51 *Sag.* 311 C. 11  
Peritonitis, V. 62 C. 14  
Peritonoeorixia, *Sag.* 64  
Pernio, L. 259 V. 350 C. 7  
Pertussis, C. 57  
Pestilentialis, V. 33 C. 27  
Pestis, S. 91 L. 2 *Sag.* 289 C. 27  
Petechia, L. 5 V. 452 C. 35  
Petechialis, V. 38  
Phagedaena, V. 488 C. 145  
Phalacrotis, V. 528  
Phalangosis, V. 533  
Phantasma, L. 73 V. 287 C. 95  
Phimosis, S. 22 L. 297 V. 348 *Sag.* 27 C. 7  
Phlegmatia, S. 282 *Sag.* 109 C. 75  
Phlegmone, S. 15 L. 39 V. 351 *Sag.* 299 C. 7  
Phlogosis, V. 220 C. 7

- Phlyctaena, S. pag. 9 L. 273 V. 442 *Sag.* 8 C.  
138
- Phlyxacion, V. 450
- Phoenigmus, S. 308 *Sag.* 134
- Phoxos, V. 511
- Phrenismus, V. 45 C. 9
- Phrenitis, S. 101 L. 25 V. 18 *Sag.* 303 C. 9, 6
- Phricasmus, *Sag.* 239
- Phricodes, V. 25
- Phthiriasis, S. 310 V. 324 *Sag.* 136
- Phthifis, S. 276 L. 208 V. 310 *Sag.* 101. C. p. 158
- Phygethlon, V. 357
- Phyma, V. 359
- Physconia, S. 283 V. 325 *Sag.* 110 C. 82
- Phyfocele, V. 416
- Phyfocephalus, S. 286 *Sag.* 113
- Phyfometra, S. 290 *Sag.* 117 C. 74
- Pica, S. 222 V. 301 *Sag.* 334 C. 103
- Pinnula, V. 432
- Piptonychia, V. 484
- Pituitaria, V. 111 C. 61
- Pityriasis, V. 476
- Pladarotis, V. 431
- Plancus, V. 545
- Plautus, . 545
- Plethora, L. 225 *Sag.* 105
- Pleuritica, L. 53
- Pleuritis, S. 103 L. 27 V. 50 *Sag.* 305 C. 11
- Pleurodyne, S. 148 V. 50 *Sag.* 254 C. 22
- Plica, L. 313 V. 323 C. 90
- Plicatio, V. 470

- Pneumatosis, S. 280 V. 391, 156 *Sag.* 107 C. 72  
 Pneumonia, C. 11  
 Pneumonica, L. 54  
 Pnigma, V. 270  
 Podagra, V. 175 C. 24  
 Podagrica, V. 69 C. 24  
 Polydipsia, S. 224 L. 80 V. 295 *Sag.* 336 C. 102  
 Polymerisma, *Sag.* 74  
 Polypus, V. 377 C. 133  
 Polyfarcia, S. 279 L. 213 V. 540 *Sag.* 106 C. 71  
 Porrigio, V. 476  
 Porrus, V. 427 C. 133  
 Presbytia, L. 307 C. 94  
 Pressura, L. 260  
 Priapismus, S. 121 L. 122 V. 173 *Sag.* 227  
 Proctalgia, S. 214 *Sag.* 171 C. 7  
 Proctica, L. 59 V. 107  
 Proctitis, L. 30 C. 7  
 Proctorrhoea, *Sag.* 193  
 Profusio, L. 239 C. 116  
 Prolapsus, L. 292 C. 142  
 Proptoma, S. 46 *Sag.* 49  
 Pruritus, S. 190 L. 64 V. 136 *Sag.* 149  
 Psellismus, S. 167 L. 138 *Sag.* 273 C. 113  
 Psellotis, V. 259 C. 113  
 Pseudoblephs, C. 95  
 Psophos, V. 177  
 Pfora, L. 265 V. 320 C. 148  
 Pforiasis, V. 174  
 Psyrdracia, S. 9 V. 442 *Sag.* 14

E c c

- Pterygium, S. 26 L. 295 V. 433 *Sag.* 31  
 Ptilosis, V. 531  
 Ptofis, V. 235  
 Ptyalismus, S. 261 L. 176 V. 103 *Sag.* 197 C. 119  
 Pudendagra, S. 215 L. 59 V. 168 *Sag.* 172  
 Punctura, S. 64 L. 243 *Sag.* 79 C. 144  
 Puorrhoea, V. 106  
 Puoturia, V. 116  
 Purpura, S. 96 V. 449 *Sag.* 292 C. 35  
 ——— scorbatica, V. 443  
 Pustula, S. pag. 8 L. 274 *Sag.* 6 C. 7  
 Pyrosis, S. 200 *Sag.* 158 C. 58  
 Pyuria, S. 266 *Sag.* 201

## Q

- Quartana, S. 89 L. 17 V. 3 *Sag.* 326 C. 2  
 ——— duplex, V. 13  
 ——— triplex, V. 14  
 Quintana, V. 4 C. 2  
 Quotidiana, S. 87 L. 15 V. 1 *Sag.* 324 C. 3  
 ——— continua, V. 15

## R.

- Rabies, L. 85 *Sag.* 344  
 Rachialgia, S. 211 *Sag.* 168 C. 59  
 Rachitis, S. 294 L. 212 V. 312 *Sag.* 120 C. 83  
 Rachosis, V. 503  
 Ranula, V. 380  
 Raphania, L. 145 V. 192 C. 52

- Raucedo, L. 146 C. 40, 112  
 Raucitas, V. 252 C. 40, 112  
 Renchus, V. 271  
 Rhagas, L. 248. S. 75 V. 467 *Sag.* 96  
 Rhenophonia, V. 256 C. 112  
 Rheuma, S. 149, *Sag.* 255 C. 40  
 Rheumatica, V. 74  
 Rheumatismus, S. 185 L. 62 V. 138 *Sag.* 144 C. 22  
 Rhicnosis, V. 542  
 Rhochmos, V. 272  
 Rhoeas, V. 520  
 Rhopalosis V. 323 C. 90  
 Rhyffemata, V. 521  
 Rigor, S. 132 L. 141 V. 187  
 Rifus, L. 148  
 ——— fardonicus, V. 210  
 Rodatio, V. 532  
 Ronchus, V. 272  
 Rubeola, S. 94 L. 4 *Sag.* 293 C. 30  
 Ruetus, L. 181 V. 215  
 Ruminatio, V. 216  
 Ruptura, S. 69 L. 239 V. 466 *Sag.* 84

## S.

- Saniodes, V. 550  
 Sarcocele, V. 415  
 Sarcoma, S. 23 L. 294 V. 376 *Sag.* 28 C. 133  
 Sardiasis, L. 125 V. 209  
 Satyriasis, S. 228 L. 81 V. 331 *Sag.* 340 C. 104, 105

- Scabies, S. 304 V. 444 *Sag* 130 C. 148  
 Scarlatae, V. 454  
 Scarlatina, S. 98 V. 39 *Sag*. 294 C. 32  
 Scelotyrbe, S. 136 V. 195. *Sag*. 243 C. 51  
 Schirrhus, S. 14 L. 283 V. 374 *Sag*. 19 C. 130  
 Sclopetoplaga, *Sag*. 80  
 Scoliosis, V. 512  
 Scorbutus, S. 301 L. 223 V. 318 *Sag*. 127 C. 86  
 Scotomia, L. 111  
 Screatius, L. 177  
 Scrophula, S. 295 V. 367 *Sag*. 121 C. 84  
 Seifis, V. 512  
 Seline, V. 463  
 Septana, V. 6 C. 2  
 Serpigo, L. 467 V. 443  
 Sextana, V. 5 C. 2  
 Singultus, S. 141 L. 153 V. 212. *Sag*. 248  
 Sinus, S. 73 V. 492. *Sag* 92 C. 145  
 Siriasis, V. 34 C. 9  
 Soda, L. 47 V. 154 C. 45, 58  
 Somnambulismus, S. 221 L. 77 *Sag*. 333 C. 68  
 Somnium, V. 339 C. 68  
 Somnolentia, L. 96 V. 233  
 Spanopogon, V. 556  
 Sparganosis, V. 372  
 Spasma, V. 479  
 Spasmus, L. 121  
 ——— oesophagi, V. 217  
 ——— cynicus, V. 209  
 ——— maxillae inferioris, V. 208.  
 Sphacelismus, L. 32 C. 9

- Sphacelus, L. 234 V. 328 C. p. 87  
Spina bifida, V. 386 C. 77  
Spinola, L. 289 C. 77  
Splenalgia, S. 206 *Sag.* 164  
Splenica, L. 52  
Splenitis, S. 114 L. 36 V. 59 *Sag.* 313 C. 18  
Splenocoele, S. 54 V. 412  
Staphyloma, S. 36 V. 421 *Sag.* 40  
Staphylofis, V. 422  
Steatites, V. 390 C. 71  
Steatoma, V. 420  
Sterilitas, L. p. 104. *Sag.* 211 C. 125  
Sternutatio, S. 139 L. 154 V. 204 *Sag.* 246  
Stertor, S. 143 L. 156 V. 271 *Sag.* 250  
Stigma, V. 457  
Stomacace, S. 241 L. 175 V. 85 *Sag.* 176 C. 39  
Strabismus, S. 116 L. 304 V. 514 *Sag.* 222 C. 114  
Stranguria, L. 196 V. 163  
Stridor, L. 136  
Struma, L. 284 C. 84  
Stupiditas, V. 336 C. 65  
Stupor, S. 189 L. 105 *Sag.* 148  
Stymatosis, V. 94  
Subluxatio, V. 473  
Subsultus, L. 134 *Sag.* 232  
Sudamen, L. 321  
Sudamina, V. 446  
Sudor, L. 207 C. 117  
Suffocatio, L. 158  
—— hystERICA, V. 196  
Suffusio, S. 217 *Sag.* 329 C. 95

- Sugillatio, L. 230 C. 129  
 Suppuratoria, V. 78  
 Surditas, V. 247 C. 96  
 Suspirium, L. 150 V. 262  
 Sufurrus, V. 292  
 Sutura, *Sag.* 87  
 Sycofis, V. 490 C. 145  
 Syncopalis, V. 29  
 Syncope, S. 174 L. 94 V. 274 *Sag.* 280 C. 44  
 Synizesis, V. 240 C. 92  
 Synocha, S. 80 L. 12 C. 4  
 Synochus, S. 81 L. 13 V. 16 C. 4 et 6  
 Syphilis, S. 300 L. 6 V. 319 *Sag.* 126 C. 85  
 Syrigmos, S. 219 *Sag.* 331 C. 97  
 Syringmos, L. 72

## T

- Tabes, S. 275 L. 209 V. 309 *Sag.* 100 C. 69  
 Talpa, V. 420  
 Tarantismus, S. 230 L. 84 V. 193 *Sag.* 342  
 Tenesmus, S. 257 L. 193 V. 166 *Sag.* 192  
 Terminthus, V. 381 C. 7  
 Tertiana, S. 88 L. 16 V. 2 *Sag.* 325 C. 1  
 ——— duplex, V. 12  
 Testudo, V. 420  
 Tetanus, S. 122 L. 127 V. 180 *Sag.* 228 C. 48  
 Tetartophya, S. 86 L. 22 *Sag.* 323 C. 2  
 Therioma, V. 486 C. 145  
 Thlasis, V. 471  
 Tinea, S. 305 L. 263 V. 497 *Sag.* 131 C. 147



- Toius, V. 424  
Torpor, V. 224  
Tortura, L. 303  
Trachelophyma, *Sag.* 33  
Traulotis, V. 258 C. 113  
Tremor, S. 129 L. 131 V. 184 *Sag.* 236 C. p. 195  
Trichiafis, L. 316 V. 517  
Trichoma, S. 311 *Sag.* 137 C. 90  
Trismus, S. 117 L. 124 V. 207 *Sag.* 223 C. 49  
Tritaeophya, S. 85 *Sag.* 322 C. 1  
Tritaeus, L. 21 C. 1  
Tuffis, S. 142 L. 155 V. 205 *Sag.* 249 C. 40  
Tylloma, V. 429 C. 135  
Tympanites, S. 291 L. 219 V. 316 *Sag.* 118 C. 73  
Typhomania, S. 178 L. 97 V. 23 *Sag.* 284 C. 42  
Typhus, S. 82 *Sag.* 319 C. 5

## V

- Vaga, V. 10 C. 2  
Valgus, V. 544  
Varicella, V. 42, 448 C. 29  
Variola, S. 92 L. 3 V. 447 *Sag.* 290 C. 28  
Variolofa, V. 35 C. 28  
Varix, S. 33 L. 282 V. 407 *Sag.* 36 C. 128  
Varus, S. p. 9 L. 269 V. 436 et 543 *Sag.* 10 C. 7  
Verruca, S. 25 L. 277 V. 426 *Sag.* 30 C. 134  
Vertigo, S. 216 L. 74 V. 293 *Sag.* 328  
Vefania, L. 70 C. 66  
Vibex, L. 320 V. 458  
Vitiligo, S. 2 V. 459 *Sag.* 2

- Ulcus, S. 71 L. 249 C. 145 *Sag.* 89  
Vociferatio, L. 147  
Volatica, L. 63 V. 178 C. 22  
Vomica, L. 180 V. 104 C. p. 106  
Vomitus, S. 251 L. 183 V. 214 *Sag.* 186 C. 45  
Uredo, L. 8 C. 33  
Urorrhoeas, V. 548  
Urticaria, V. 361, 456 C. 33  
Urticata, V. 40 C. 33  
Vulneraria, V. 77  
Vulnus, S. 63 L. 240 V. 465 *Sag.* 78 C. 144

## X

- Xirafia, V. 527

## Z

- Zoster, V. 344

# C A T A L O G U S

Morborum a nobis omifforum, quos omiffiffe fortaffis non oportebat. *Vide Prolegomena, pag. xxi.*

Aglaftatio, L.

Agalaxis, V.

Alopecia

Anchylops

Ægilops

Anchylofis, L.

Anchylofis, V.

Angina, S. et L.

Antipathia

Beriberia

Cardiogmus

Cephalaea

Cephalalgia

Distortio

Dysphagia

Aglutitio

Acatapofis

Oefophagifmus

Dystocia

Parturitio et alii gravidarum et parturientium morbi

Elcofis

Effera

Hemicrania

- Leucorrhoea ex vitio locali  
Lithiasis in organis uropoeticis, et in aliis corporis  
partibus  
Malis  
    Coccyta, L.  
Melaena  
Melasicterus  
    Melanchlorus, V.  
Myocoilites  
Necrosis  
Odaxismus  
    Dentitio et alii infantum morbi  
Paralysis partis singularis ex vitio musculorum  
Physocephalus  
Pnigma  
Catarrhus suffocativus *Auct.*  
Pyuria  
    Puoturia  
Sterilitas utriusque sexus  
    Acyifis, V.  
Stymatosis  
Tarantismus  
Venena  
Vermes.

# I N D E X

Specierum Sauvagesii, quae in systemate nostro sub nominibus genericis non inveniuntur.

*Numeri indicant paginam.*

- Amaurosis a myosi, 303.
- Amaurosis a synchysi, 303.
- Amblyopia hydrophthalmica, 304
- Amphimerina anginosa, 97.
- Amphimerina biliosa, 56.
- Amphimerina cardiaca, 53.
- Amphimerina catarrhalis, 172
- Amphimerina epiala, 54.
- Amphimerina hemitritaeus, 49.
- Amphimerina humorosa, 54.
- Amphimerina hungarica, 55.
- Amphimerina paludosa, 56.
- Amphimerina peripneumonica, 102.
- Amphimerina phricodes, 54.
- Amphimerina pseudohemitritaeus, 49.
- Amphimerina semiquartana, 61.
- Amphimerina semiquintana, 53.
- Amphimerina spasmodica, 62.
- Amphimerina syncopalis, 54.
- Amphimerina tussiculosa, 173. et 231.
- Angina spasmodica, 213.
- Aphonia paralytica, 193.

- Arthritis rheumatica, 128.  
Ascites flatulento-peritonaeus, 273.  
Ascites sanguineo-uterinus, 282.  
Ascites uterinus, 282.  
Asphyxia a carbone, 187.  
Asphyxia congelatorum, 188.  
Asphyxia flatulenta, 189.  
Asphyxia foricariorum, 187.  
Asphyxia a fumis, 186,  
Asphyxia hysterica, 191.  
Asphyxia immerforum, 189.  
Asphyxia a mephitide, 187.  
Asphyxia a musto, 187.  
Asphyxia a pathemate, 187.  
Asphyxia sideratorum, 188.  
Asphyxia spinalis, 184.  
Asphyxia suspenforum, 189.  
Asthenia a hydrocephalo, 186.  
Asthma catarrhale, 227.  
Asthma febricosum, 230.  
Asthma a gibbo, 228.  
Asthma metallicum, 229.  
Asthma pneumodes, 227.  
Asthma a polypo cordis, 229.  
Asthma pulverulentorum, 229.  
Atrophia febrifequa, 267.  
Atrophia infantilis, 267.  
Atrophia rachitica, 267.

## C.

- Cardialgia inflammatoria, 111.  
Cardialgia sputatoria, 232.  
Catarrhus Bellinfulanus, 97.  
Cephalaea febricosa, 64.  
Cephalalgia catarrhalis, 173.  
Cephalalgia inflammatoria, 91.  
Cephalalgia intermittens, 64.  
Cholera sicca auriginosa, 237.  
Convulsio Indica, 211.  
Convulsio a nervi punctura, 213.  
Convulsio raphania, 213.  
Convulsio ab ustilagine, 218.

## D.

- Diarrhoea carnosæ, 179.  
Dysenteria a catharticis, 180.  
Dysenteria a mesenterii vomica, 243.  
Dysenteria Parisiaca, 180.  
Dysenteria scorbutica, 343.

## E.

- Eclampsia febricosa, 50.  
Eclampsia typhodes, 217.  
Enteritis mesenterica, 110.  
Ephemera Britannica, 77.

- Ephemera dichomene*, 63.  
*Ephemera fudatoria*, 77.  
*Epilepsia febricosa*, 50.  
*Erysipelas ambustio*, 85.  
*Erysipelas symptomaticum*, 86.  
*Erysipelas a vespis*, 86.

## H.

- Hepatalgia apostematosa*, 115.  
*Herpes Zoster*, 134.  
*Hydrometra ovarii*, 280.  
*Hysteralgia febricosa*, 64.  
*Hysteria febricosa*, 50.

## I.

- Ischias ex abscessu*, 129.  
*Ischias intermittens*, 64.

## L.

- Lumbago apostematosa*, 129.  
*Lumbago ab arthrocace*, 129.  
*Lumbago psoadica*, 129.

## M.

- Menorrhagia difficilis*, 358.



- Miliaris nautica*, 74.  
*Miliaris purpurata*, 74.  
*Miliaris sudatoria*, 78.  
*Mutitas a glossolyfi*, 193.

## N.

- Nephralgia arenosa*, 117.  
*Nephralgia arthritica*, 117.  
*Nephralgia calculosa*, 117.  
*Nephralgia febricosa*, 64.  
*Nephralgia purulenta*, 117.  
*Nephralgia rheumatica*, 119.

## O.

- Ophthalmia febricosa*, 64.  
*Orthopnoea hysterica*, 225.  
*Orthopnoea spasmodica*, 225.

## P.

- Phrenitis apyreta*, 262.  
*Phrenitis inanitorum*, 261.  
*Pleuritis hepatica*, 114.  
*Pleuritis periodica*, 51.  
*Pleuritis splenica*, 116.  
*Pleurodyne parapleuritis*, 104.  
*Pleurodyne verminosa*, 106.

*Pleurodyne vomica*, 106.

*Pydracia a vespis*, 86.

*Pyuria arthritica*, 355.

*Pyuria mucosa*, 355.

*Pyuria viscida*, 355

Q.

*Quotidiana deceptiva*, 53.

*Quotidiana epileptica*, 50.

*Quotidiana soporosa*, 49.

S.

*Scarlatina anginosa*, 146.

*Scelotyrbe festinans*, 215.

*Scelotyrbe verminosa*, 215.

*Scrophula mesenterica*, 266.

*Splenalgia suppuratoria*, 116.

*Synocha catarrhalis*, 173.

*Synocha dysenteriodes*, 80.

*Synocha miliaris*, 79.

*Synochus hiemalis*, 70.

*Synochus pleuritica*, 70. et 105.

*Synochus rheumatizans*, 70.

*Synochus scorbutica*, 71.

## T.

- Tabes dorsalis, 268  
Tabes a hydrope, 269.  
Tabes nutricum, 268.  
Tabes a sanguifluxu, 268.  
Tabes sudatoria, 268.  
Tabes syphilitica, 269.  
Tetanus febricosus, 50.

## V.

- Variola lymphatica, 138.



















